Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ФГБУ «ДВНИГМИ»)

УДК 574.632 574.633

№ государственной регистрации АААА-А20-120042190045-6

Инв. №

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБУ «ДВНИГМИ»

Е.А. Горшков

«19» декабря 2022 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

МЕТОДЫ БИОИНДИКАЦИИ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРУКТУРНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК БЕНТОСНЫХ СООБЩЕСТВ) ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ МОРСКОЙ СРЕДЫ: РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДОННОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО СТРУКТУРЕ
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЖИВОТНЫХ ВНУТРИ СООБЩЕСТВ МАКРОЗООБЕНТОСА

(промежуточный)

4.6.2

Ответственный исполнитель
доктор биол. наук:

А.В. Мощенко

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Отв. исполнитель,
вед. науч. сотр.,
д-р биол. наук

19.12.2022
подпись, дата

А. В. Мощенко
(введение, раздел 1–5,
заключение)

Исполнители:

Вед. науч. сотр.,
канд. биол. наук

19.12.2022
подпись, дата

Т. А. Белан
(раздел 1)

Научный сотр.

19.12.2022
подпись, дата

Б. М. Борисов
(раздел 1)

Нормоконтроль

подпись, дата

С. А. Шабалин

РЕФЕРАТ

Отчет 131 с., 1 кн., 27 рис., 13 таб., 62 источн., 1 прил.: 3 таб.

МОНИТОРИНГ, ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, МАКРОЗООБЕНТОС, ФИЗИЧЕСКИ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ СООБЩЕСТВА, ГРАНИЧНЫЕ КРИТЕРИИ

Объект исследования – сообщества макрозообентоса залива Петра Великого.

Цель исследования – разработать метод оценки экологического состояния донного населения по структуре взаимосвязей животных внутри сообществ макрозообентоса.

В ходе выполнения НИР произведено вычисление показателя экологического стресса ($ПЭС$) 10 способами и среди этих вариантов, по коэффициенту детерминации от средней объясненной дисперсии (MEV), выявлен наиболее эффективный метод его определения, которым является выбор максимального значения данного параметра среди всех вариантов расчетов ($ПЭС_{амх}$). Применение процедуры классификации, основанной на теории нечетких множеств, позволило выделить шесть экологических типов сообществ донных животных. Тип ВВ объединяет биологически сбалансированные или почти сбалансированные сообщества, тип РС – физически контролируемые. Между ними располагаются типы SD, MD, D и HD, включающие сообщества с разной степенью разбалансировки – от легкого до сильного дисбаланса: слабо и умеренно разбалансированные, разбалансированные и сильно разбалансированные. Для всех этих групп определены императивные факторы среды, обуславливающие их дифференциацию, описаны изменения их состава по отношению к загрязнению и эвтрофикации, а также изменения количественных характеристик в ряду ВВ → РС.

Все эти процедуры позволили разработать метод, предназначенный для мониторинга экологического статуса макрозообентоса и степени повреждения мест его обитания. Метод базируется на математической модели перехода сообществ донных животных от «биологически сбалансированного» к «физически контролируемому» состоянию. Нелинейность этой зависимости (логистическая функция) дает возможность установления граничных критериев или критических уровней состояния сообществ макрозообентоса (степени повреждения местообитания или состояния среды). Первый из них ($ПЭС_{амх} = 15\%$) следует считать «заданным значением» (target value), то есть уровнем, к которому необходимо стремиться, чтобы восстановить функциональные свойства осадков для жизни животных, второй ($ПЭС_{амх} = 36\%$) – «значением коррекции» (intervention value) – уровнем, когда такие свойства сильно снижены, представляют опасность и требуют вмешательства со стороны человека.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
1 Материалы и методы исследований.....	10
1.1 Используемые данные, отбор и обработка проб.....	10
1.2 Анализ данных.....	13
1.3 Статистический анализ.....	16
1.4 Алгоритм процедуры нелинейного оценивания.....	17
2 Определение <i>ПЭС</i> различными способами и выявление наиболее эффективного варианта его вычисления.....	20
3 Зависимость <i>ПЭС</i> от <i>MEV</i> и критические уровни состояния сообществ макрозообентоса.....	23
4 Сообщества макрозообентоса разного экологического статуса и их свойства	26
4.1 Классификация сообществ макрозообентоса и факторы их дифференциации	26
4.2 Изменения состава сообществ по отношению к императивным факторам.....	36
4.3 Изменения общих характеристик обилия и экологических индексов.....	40
4.4 Причины смены экологического типа сообществ.....	46
5 Метод оценки экологического состояния донного населения и особенности его применения.....	54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	71
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	75
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	81

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения:

Абиотические факторы

<i>Al</i>	— Суммарное содержание алевритов (частицы 0,1–0,01 мм)
<i>Angle</i>	— Угол внутреннего трения грунта (градусы)
<i>AP</i>	— Суммарное содержание алевропелитов (частицы <0,1)
<i>C_{орг}</i>	— Органический углерод (содержание <i>C_{орг}</i> – мг/г)
<i>Dpth</i>	— Глубина, м
<i>Force_r</i>	— Сила взмучивания (г/м ²)
<i>GrF_i</i>	— Факторы и их значения, полученные в результате процедуры R-факторного анализа содержания гранулометрических фракций, <i>i</i> – номер фактора
<i>GrL_i</i>	— Нагрузки факторов, полученные в результате процедуры Q-факторного анализа содержания гранулометрических фракций, <i>i</i> – номер нагрузки
<i>H_r</i>	— Энтропия гранулометрического распределения
<i>Herm</i>	— «Герметичность» грунта (с)
<i>KURT</i>	— Коэффициент эксцесса гранулометрического распределения
<i>MEAN</i>	— Средний размер частиц донных отложений, мм
<i>MeF_i</i>	— Факторы и их значения, полученные в результате процедуры R-факторного анализа концентраций металлов, <i>i</i> – номер фактора
<i>O₂</i>	— Содержание растворенного кислорода, мл/л
<i>Pl</i>	— Суммарное содержание пелитов (частицы <0,01 мм)
<i>PoF_{i(n)}</i>	— Факторы и их значения, полученные в результате процедуры R-факторного анализа концентраций всех загрязнителей, <i>i</i> – номер фактора, <i>n</i> – общее число экстрагированных факторов
<i>Psa</i>	— Суммарное содержание псаммитов (частицы 0,1–1 мм)
<i>Pse</i>	— Суммарное содержание псефитов (частицы >1 мм)
<i>SD</i>	— Среднеквадратическое отклонение гранулометрического распределения
<i>SKEW</i>	— Коэффициент асимметрии гранулометрического распределения
<i>TPF_{chem}</i>	— Общий уровень химического загрязнения донных отложений
<i>Total_w</i>	— Интенсивность общего водообмена в придонном слое (усл. ед.)
<i>Wave</i>	— Величина вертикальной составляющей водообмена (усл. ед.)

Биотические характеристики

<i>A</i>	— Плотность поселения (экз./м ²)
<i>AMBI</i>	— Биотический индекс степени повреждения морской среды
<i>B</i>	— Биомасса (г/м ²)
<i>e</i>	— Индекс выравненности Пиелу
<i>H</i>	— Индекс видового разнообразия Шеннона-Винера
<i>M-AMBI</i>	— Индекс состояния донного населения
<i>R</i>	— Упрощенный индекс Маргалефа
<i>Si</i>	— Индекс доминирования Симпсона
<i>SR</i>	— Индекс видового богатства Маргалефа
<i>W</i>	— Статистика Кларка
<i>TPF_{bio}</i>	— Индекс <i>TPF_{bio}</i>

ВВЕДЕНИЕ

Мониторинг морской среды должен включать наблюдения как за факторами воздействия (загрязнениями), так и за состоянием элементов биосферы (откликами живых организмов на эти воздействия), за изменением их структурных и функциональных показателей [1, 2]. Оценка экологического состояния акватории может производиться, как на основе изучения изменений состава (например, наличия или отсутствия видов-индикаторов), обилия и структуры донного населения вдоль градиента загрязнения, так и анализа сообществ макрозообентоса, который относится к многомерным (multivariate) методам мониторинга [3, 4]. Залог успеха последнего – ясное и четкое представление того, что следует считать сообществом и возможность их простого и оперативного выделения.

В последнее время в практике мониторинга окружающей среды за рубежом наметилась тенденция к разработке показателей, снижающих стоимость и время, необходимое для получения результатов оценки ее качества. При определении большинства гидробиологических показателей основные временные затраты приходится на таксономический анализ – дефиниции найденных животных до как можно более низкого, желательно видового, уровня, что занимает несколько недель, а то и месяцев. Авторами [5, 6] была показана возможность разработать метод оценки состояния морской среды на основе структуры взаимосвязей внутри сообществ донных животных, который не требует столь детальных таксономических исследований.

Известно, что при сильной изменчивости абиотических факторов именно они будут оказывать решающее влияние на состав группировок донной фауны – такие биотопы заняты «физически контролируемые сообществами». Свидетельством о наличии некоего общего внешнего лимитирующего фактора может быть сильная положительная связь индивидуальных характеристик обилия видов с общими для сообщества показателями [7, 8]. Очевидно, доля видов с такими связями может служить некой характеристикой силы этого внешнего воздействия, ответной реакции системы организмов на резкие изменения факторов окружающей среды – своего рода показателем «экологического стресса» (далее ПЭС). По мере уменьшения изменчивости таких факторов на первое место выходят биотические отношения, и в биотопах с относительно стабильными условиями среды развиваются «биологически сбалансированные» группировки. Они отличаются от физически контролируемых сообществ тем, что первые составлены из видов, одинаково реагирующих на данные градиенты абиотических условий, вторые – из видов, взаимно адаптированных к сосуществованию.

Для выделения сообществ макрозообентоса был разработан алгоритм, представляющий последовательность процедур и тестов, необходимых и достаточных для

оперативного выделения сообществ макрозообентоса и статистического доказательства справедливости получаемой классификации [9, 10]. Применение этого алгоритма при анализе донной фауны (экспедиции 1992–2019 гг.) позволило выделить 34 сообщества макрозообентоса и выявить императивные факторы среды, ответственные за их формирование. Данный алгоритм даже в самых сложных ситуациях показывал «устойчивые» результаты, которые подтверждаются с позиций статистики. Это дало возможность использовать характеристики обилия и структуры ассоциаций донных животных для последующих процедур, направленных на поиск граничных критериев для определения классов состояния морской среды.

В результате корреляционного анализа зависимостей биологических параметров (плотности поселения, биомассы, индексов состояния донной фауны *AMBI* и *M-AMBI*, видового богатства Маргалёфа, разнообразия Шеннона-Винера, выравненности Пиелу, статистики Кларка) от факторов среды была определена зависимость *ПЭС* от средней суммарной объясняемой дисперсии переменных (*MEV*) для 18 сообществ макрозообентоса [9]. Эта зависимость имеет *S*-образную форму с точками начала и окончания линейного роста, приуроченными к *ПЭС* ~15 и 30 %. Указанные уровни следует рассматривать как граничные критерии состояния сообществ макрозообентоса. При благоприятных условиях среды *ПЭС* не превышает 15 % (первый критический уровень), а сообщества донной фауны находятся в близком к «биологически сбалансированному» состоянию. Величины *ПЭС* в диапазоне 15–30 % говорят об усилении влияния лимитирующих факторов, но это воздействие не является «разрушающим». Значения *ПЭС*, превышающие 30 % (второй критический уровень) свидетельствуют об экстремальном ухудшении условий среды обитания и переходе сообществ в иное – «физически контролируемое» – состояние.

Отчетливая зависимость *ПЭС* от *MEV* и высокая степень детерминации предиктором зависимой переменной, выявленные при выполнении НИР в 2020 г., позволяют разработать метод оценки экологического состояния донного населения по структуре взаимосвязей животных внутри сообществ макрозообентоса. Однако до недавнего времени препятствием к этому являлась недостаточная репрезентативность данных. Следует подчеркнуть, что эта проблема является субстанциональной для подавляющего большинства морских (и не только) синэкологических и гидробиологических исследований, что обусловлено крайней трудоемкостью и высокой ценой отбора проб и их обработки, длительностью полного цикла определения пойманных животных и т.п. Именно поэтому в работах такого рода широко используются процедуры моделирования, а подтверждение или опровержение «работоспособности» моделей проверяется по мере накопления натуральных данных [в качестве обзора – 11, 12].

Ситуация с малой репрезентативностью данных была исправлена при помощи интерполяции значений биологических параметров и факторов среды посредством обработки соответствующих файлов решетки (*.grid), получаемых при построении карт распределений этих показателей в среде Surfer [13]. В ходе выполнения НИР в 2021 г. были собраны и систематизированы данные по факторам среды и характеристикам бентоса (съёмки 1992–2019 гг., 9 полигонов). С целью экстракции параметров фракционного состава обработаны карты грунтов (2 полигона). Определены зависимости содержания органического углерода ($C_{орг.}$) для мористых и внутренних районов зал. Петра Великого (предикторы – доля частиц тонких фракций и уровень химического загрязнения). Полученные результаты экстраполированы на акватории, где $C_{орг.}$ не определяли (3 полигона). На основе этих данных создан и обработан 901 файл решетки для получения модельных значений факторов среды и биотических характеристик. Для оценки MEV выполнен множественный пошаговый регрессионный анализ зависимостей модельных биотических параметров от факторов среды (208 моделей).

Эти вычисления полностью подтвердили результаты расчетов 2020 г. [9] и высокую адекватность натуральных и модельных исследований. Зависимость $ПЭС$ от средней объясненной дисперсии MEV также описывалась S -образной кривой с точками начала и окончания линейного роста, приуроченными $ПЭС \sim 15$ и 30% (I и II критические уровни или граничные критерии состояния сообществ макрозообентоса). Существенной связи индексов, характеризующих общий уровень загрязнения, степень нарушения местообитания, экологического состояние бентоса с $ПЭС$ и MEV , как и для реальных данных, не было выявлено. Основное отличие от оценки на основе реальных данных состояло в более широком диапазоне MEV .

Необходимо отметить, что вычисление $ПЭС$ в процессе выполнения НИР 2020 и 2021 гг. осуществляли как долю видов, чьи индивидуальные показатели обилия (биомасса и плотность поселения) сильно связаны с их общими для сообщества величинами (коэффициент корреляции при округлении $r = 0,7$ и более) с последующим усреднением его значений для обеих этих характеристик. На самом же деле существует как минимум десять подобных «простых» способов определения $ПЭС$ (см. далее). Кроме того, зависимости $ПЭС$ от MEV можно рассматривать как некие диаграммы рассеяния, которые позволяют разделить найденные сообщества макрозообентоса на группы, сменяющие друг друга по мере увеличения объясненной дисперсии параметров обилия и экологических индексов. Выделение таких групп даст возможность вычленить их основные черты, которые будут полезны для экспресс-анализа донной фауны в процессе экологического мониторинга морской среды.

Таким образом, результаты выполнения НИР в 2020 и 2021 г [10, 11] определили цель настоящего исследования – разработать метод оценки экологического состояния донного населения по структуре взаимосвязей животных внутри сообществ макрозообентоса. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1) Произвести вычисление *ПЭС* различными способами и выявить среди этих вариантов расчетов наиболее эффективный показатель (на основе определения коэффициента детерминации от *MEV*);

2) Смоделировать зависимость этого варианта *ПЭС* от *MEV*, определить доверительные границы модели и установить критические уровни состояния сообществ макрозообентоса методами математического анализа;

3) Выделить и описать группы сообществ, полученных на основе модельной диаграммы рассеяния;

4) Описать искомый метод и особенности его применения.

1 Материалы и методы исследований

1.1 Используемые данные, сбор и обработка проб

Материалом для анализа послужили данные, полученные в 1992–2019 гг. экспедициями ФГБУ «ДВНИГМИ» и ННЦМБ «ДВО РАН». Были исследованы заливы Амурский, Уссурийский, Посыета, Стрелок, бухты Золотой Рог, Диомид, Улисс, Рифовая и Патрокл, пролив Босфор Восточный, а также притуманганская* акватория до южного участка ДВГМЗ включительно (всего 262 станции; рис. 1.1–1.2).

Рисунок 1.1 – Районы работ на акватории зал. Петра Великого в разные годы

* К северу от устья реки Туманной, Туманган – корейское название этой реки.

Рисунок 1.2 – Районы работ на акватории зал. Петра Великого в разные годы

Пробы грунта отбирали дночерпателем Ван-Вина (0,11 м², 1–4 пробы); на каждой станции часть верхнего слоя осадков (2–3 см) одной из проб замораживали для последующего измерения концентраций загрязняющих веществ (далее – ЗВ, все съемки), органического углерода (C_{орг.}; экспедиции 1996, 2001, 2005, 2016, 2018 и 2019 гг.) и определения гранулометрического состава (1996, 2001, 2005, 2006, 2007, 2018 и 2019 гг.). В 1992–1993 и 2016 гг. грунты описывали визуально (мелкий песок, заиленный песок, ил и т.п.). Для биологического анализа грунт промывали на сите с ячейей 1 мм и фиксировали макробентос 4 %-м буферным раствором формальдегида.

Содержание всех исследованных ЗВ (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, фенолы, хлорированные и общие углеводороды) измеряли в лаборатории мониторинга загрязнения морских вод ФГБУ «Приморское УГМС» по стандартным методикам Росгидромета [14]. Содержание $C_{орг}$ в донных отложениях анализировали методом окисления смесью $K_2Cr_2O_7 - H_2SO_4$ с колориметрическим окончанием в ННЦМБ «ДВО РАН» [15, 16]. Гранулометрический состав изучали комбинацией ситового метода и метода А-22 в ФГБУН «ТОИ ДВО РАН» [17, 18]. Определяли фракции <0.005, 0.005–0.01, 0.01–0.05, 0.05–0.1, 0.1–0.25, 0.25–0.5, 0.5–1, 1–2, 2–5, 5–10 и >10 мм (далее соответственно р13, р12, р11, а2, а1, ps3, ps2, ps1, gr3, gr2, gr1, pb). Таксономическая принадлежность макрозообентоса установлена сотрудниками ФГБУ «ДВНИГМИ» и ННЦМБ «ДВО РАН». Животных, определенных до вида или более высокого таксономического ранга, подсчитывали и взвешивали с точностью до 0,01 г после обсушивания на фильтровальной бумаге; полученные данные пересчитывали на 1 м² площади дна.

Данные по гранулометрическому составу донных отложений 2016 г., учитывая относительный консерватизм его характеристик, были получены на основе собственных результатов 2001, 2018 и 2019 гг. путем экстраполяции последних на ближайшие станции искомой съемки. Для проверки и коррекции эти данные сопоставляли с результатами визуального определения и картами осадков, которые представлены в работах О.В. Дударева с коллегами и Н.И. Григорьевой [19, 20]. Полученные таким образом параметры были применены ранее при изучении сообществ макрозообентоса и распределения животных вдоль градиента концентраций органического углерода [21, 22].

Для бухты Рифовой, заливов Стрелок и Посъета с этой целью использовали сами карты грунтов, опубликованные в указанных выше работах. Рисунки сканировали, переносили в программу Surfer, совмещали с картой-схемой расположения станций и считывали типы грунтов в точках реального опробования. Фракционный состав каждого типа осадков заимствовали из книги Ф.Р. Лихта и др. [23]. Для выявления зависимостей концентраций органического углерода от других измеряемых характеристик среды и, в частности, от общего уровня химического загрязнения осадков и содержания частиц тонких фракций (алевритов и пелитов, <0,1 мм), как наиболее вероятных параметров с высоким уровнем детерминации, также использовали результаты собственных наблюдений.

Интерполяцию точек виртуального опробования (15–20 точек) для исследованных полигонов осуществляли в пределах каждого сообщества, выделенного авторами ранее, и для которого был вычислен показатель экологического стресса (число станций или проб не менее 6) [9]. Файлы решетки (*.grd) для значений биологических параметров и факторов среды рассчитывали на основе реальных данных методом кригинга в среде

Surfer для каждого полигона в целом. Извлечение интерполированных значений производили при помощи программы PointsInGrid, разработанной главным специалистом ФГБУ «ДВНИГМИ» А.В. Шишигиным. Такая процедура, в целом, соответствует методу рандомизации на основе подбора функции (кригинг) с параметрами, которые соответствуют результатам натурных наблюдений [9].

1.2 Анализ данных

Данные о фракционном составе донных отложений использовали для вычисления среднего размера зерен, среднего квадратичного отклонения, нормированной энтропии, коэффициентов асимметрии и эксцесса (соответственно m , SD , $ENTR$, $SKEW$ и $KURT$). Классификация грунтов произведена по Ф.Р. Лихт и др. [23]. Для характеристики общего уровня загрязнения применяли индекс:

$$TPF_{chem} = (PNC + PNE + Pb + Cu + SDDT) / 5 \quad (1.1)$$

где PNC, PNE, Pb, Cu и SDDT — 5-ранговые оценки ($\ln$ -масштаб) содержания углеводов, фенолов, свинца, меди, суммы ДДТ и его метаболитов [24]. Эти элементы и соединения относятся к приоритетным ЗВ, а их набор для залива Петра Великого был определен методами факторного анализа. Степень антропогенного нарушения бентоса оценивали методом, который основан на зависимости изменений индекса Шеннона-Винера для двустворчатых моллюсков (H_b') от TPF_{chem} . Показатели этих нарушений — величины ERL_q и ERM_q ($TPF = 2.8$ и 3.2), которые ограничивают область прогрессивной деградации — почти линейного падения H_b' . Вычисление параметров гранулометрических распределений и TPF производили при помощи программ Granulometry и TrfCalc, разработанных одним из авторов в среде STATISTICA.

Кроме того, уровень химического загрязнения оценивали при помощи индекса TPF_{bio} , разработанного авторами при выполнении НИР в прошлом году [25]:

$$TPF_{bio} = (\sum(Opt_i)) / N \quad (1.2)$$

где Opt_i — усредненная координата оптимума по TPF_{chem} для групповой встречаемости и плотности каждого таксона; N — число найденных таксонов на станции.

Для количественной характеристики макрозообентоса использовали биомассу (B), плотность поселения (A , далее — плотность), число видов на станции или в пробе (R , упрощенный индекс Маргалефа), индексы видового богатства Маргалефа (SR), разнообразия Шеннона-Винера (H'), выравненности Пиелу (e) и доминирования Симпсона (Si). Эти показатели подсчитывали по формулам:

$$H' = -\sum (p_i \times (\log_2 p_i)) \quad (1.3)$$

$$e = H / \log_2 R \quad (1.4)$$

$$SR = (R-1) / \log_2 A \quad (1.5)$$

$$Si = \sum (p_i / A)^2 \quad (1.6)$$

где p_i – доля вида i от общей плотности.

Для описания размерно-возрастного состава применяли W -статистику Кларка, которая вычисляется как суммарная ранговая разность значений биомассы и численности:

$$W = \sum_{i=1}^R (B_i - A_i) / [50 \times (R - 1)] \quad (1.7)$$

Она изменяется от -1 до $+1$; ее величина стремится к -1 в полностью разрушенных и к $+1$ в ненарушенных сообществах. Вычисления всех перечисленных биотических характеристик выполняли при помощи ППП PRIMER 5.0.

Кроме того, использовали индексы *AMBI* (AZTI Marine Biotic Index) и *M-AMBI* [27, 28]. Первый, по замыслу авторов, должен характеризовать степень нарушения мест обитания донного населения по отношению к загрязнению, и определяется по сумме удельных плотностей 5 групп видов, по-разному чувствительных к содержанию $C_{орг}$:

$$AMBI = [(0 \times \%GI) + (1,5 \times \%GII) + (3 \times \%GIII) + (4,5 \times \%GIV) + (6 \times \%GV)] / 100 \quad (1.8)$$

где GI-GV — группы видов. Вторым показателем, *M-AMBI*, или многомерный (Multivariate) *AMBI*, описывает экологическое состояние бентоса и рассчитывается на основе процедуры факторного анализа по индексам *AMBI*, H' и R и предназначен для описания экологического состояния донного населения. Для вычисления этих индексов существует программное обеспечение, свободно распространяемое в интернете [29]. Следует отметить, что индекс *AMBI*, по определению, должен характеризовать скорее уровень эвтрофикации, чем загрязнения.

Значения всех используемых индексов сами по себе малопонятны, особенно для неспециалиста. Поэтому, предлагается использовать их вербальные оценки (таблица 1.1). Для индексов Пиелу и Симпсона они разработаны на основе шкалы классификации осадков по степени сортировки слагающих их частиц. Естественно, формулировки вида «идеально сортированный» были заменены на выражения, соответствующие значению этого индекса в экологических исследованиях, в данном случае – на «абсолютно не выровненное» (распределение видов по рангам) или «доминирование не выражено». Для вербальной характеристики видового богатства и разнообразия, величины индексов Маргалефа и Шеннона-Винера, полученные в наших исследованиях на акватории зал.

Петра Великого, были ранжированы в логарифмическом масштабе (ln) и каждому рангу были присвоены соответствующие названия. Подобная процедура была выполнена и для статистики Кларка с учетом диапазона его теоретических и натуральных значений.

Таблица 1.1 – Шкалы для классификации сообществ по экологическим и биотическим показателям (индексы Пиелу, упрощенный Маргалефа, Шеннона-Винера и статистика Кларка – по [9], $AMBI$ и $M-AMBI$ – по [28, 29], Маргалефа и Симпсона – новые данные)

Диапазон	Вербальная характеристика
Индекс Пиелу, e	
0–0,1	Абсолютно не выровненное
0,1–0,25	Не выровненное
0,25–0,5	Плохо выровненное
0,5–0,75	Умеренно выровненное
0,75–0,9	Выровненное
0,9–1,0	Идеально выровненное
Индекс видового разнообразия Шеннона-Винера, H'	
0–1,34	Очень бедное
1,35–1,80	Бедное
1,81–2,43	Умеренно разнообразное
2,44–3,27	Разнообразное
3,28 и более	Очень разнообразное
Упрощенный индекс видового богатства Маргалефа, R	
1–2	Очень бедное
3–5	Бедное
6–11	Умеренно богатое
12–24	Богатое
25 и более	Очень богатое
Индекс видового богатства Маргалефа, SR	
0,00–0,18	Очень бедное
0,19–1,26	Бедное
1,27–4,52	Умеренно богатое
4,53–8,07	Богатое
8,08 и более	Очень богатое
Индекс доминирования Симпсона, S_i	
0–0,1	Доминирование не выражено
0,1–0,25	Слабое доминирование
0,25–0,5	Умеренное доминирование
0,5–0,75	Отчетливое доминирование
0,75–0,9	Сильное доминирование
0,9–1,0	Абсолютное доминирование
Статистика Кларка, W	
-1,000÷-0,064	Выраженное доминирование мелких животных
-0,064÷-0,032	Слабое доминирование мелких животных
-0,033–0,032	Доминирование мелких или крупных животных не выражено
0,033–0,119	Слабое доминирование крупных животных
0,120–1,000	Выраженное доминирование крупных животных
Индекс $AMBI$: классификация нарушений (повреждений) местообитания	
0,0–1,2	Ненарушенное

Продолжение таблицы 1.1

Диапазон	Вербальная характеристика
>1,2–3,3	Слегка нарушенное
>3,3–5,0	Умеренно нарушенное
>5,0–6,0	Сильно нарушенное
>6,0	Биота отсутствует
Индекс <i>M-AMBI</i> : состояние донного населения	
>0,77	Высокий статус
>0,53–0,77	Хороший статус
>0,39–0,53	Умеренный статус
>0,2–0,39	Обедненный статус
≤0,2	Плохой статус

Показатель экологического стресса *ПЭС* вычисляли как долю видов, чьи индивидуальные показатели обилия (биомасса и плотность поселения) сильно связаны с их общими для сообщества величинами (коэффициент корреляции при округлении $r = 0,7$ и более). Определение *ПЭС* выполнено на основе следующих способов вычисления r и последующих операций:

aa – корреляцией индивидуальной плотности таксонов (A_i) с общей плотностью (A_t);

bb – корреляцией индивидуальной биомассы таксонов (B_i) с общей биомассой (B_t);

m – усреднением вариантов aa и bb для каждого сообщества;

mx – выбором максимальной величины из вариантов aa и bb для каждого сообщества;

ab – корреляцией $A_i - B_i$;

ba – корреляцией $B_i - A_i$;

mc – усреднением вариантов ab и ba для каждого сообщества;

ctx – выбором максимальной величины из вариантов ab и ba для каждого сообщества;

tm – усреднением вариантов aa , bb , ab и ba для каждого сообщества;

$atmx$ – выбором максимальной величины из вариантов aa , bb , ab и ba для каждого сообщества.

Для определения критических уровней состояния сообществ макрозообентоса использовали кривизну модельных кривых, которую вычисляли по формуле:

$$K = y''(x)/(1 + y'^2)^{3/2} \quad (1.9)$$

где y' и y'' – первая и вторая производные уравнений регрессии. Максимум K соответствует точке перегиба кривой, а начало ее роста после достижения минимума – о замедлении роста *ПЭС* и начале выхода зависимости на плато. Вычисление кривизны производили при помощи программы CurvLogF, разработанной одним из авторов для логистических моделей в среде STATISTICA.

1.3 Статистический анализ

При статистической обработке использовали стандартные процедуры и тесты, предлагаемые программой STATISTICA и средой R [30, 31]:

- 1) Тест Шапиро-Уилка для проверки соответствия распределения данных нормальному паттерну (проверяется нулевая гипотеза H_0 – распределение соответствует нормальному) и алгоритм Бокса-Кокса для их трансформации;
- 2) Тесты Крускала-Уоллиса и Манна-Уитни — непараметрические аналоги однофакторного дисперсионного анализа и t -критерия Стьюдента для независимых переменных (нулевая гипотеза H_0 — влияние фактора не приводит к сдвигу распределений относительно друг друга и два распределения идентичны);
- 3) Тест Фридмана — непараметрический аналог однофакторного дисперсионного анализа для зависимых переменных (нулевая гипотеза H_0 — влияние фактора не приводит к сдвигу распределений относительно друг друга);
- 4) Линейный регрессионный анализ с вычислением коэффициента корреляции (r), параметров регрессии (b_i) и их статистической оценкой (ANOVA и проверка нулевой гипотезы $H_0: r = 0$ – влияние фактора «модель» отсутствует, $b_i=0$);
- 5) Нелинейное оценивание с вычислением доверительных границ модели;
- 6) Классификационные построения с использованием теории нечетких множеств;
- 7) Канонический анализ соответствий (ССА – canonical или constrained correspondence analysis).

Нелинейное моделирование производили методом рандомизации (100 повторений; алгоритм приведен ниже) на основе подбора сигмоидальной функции [32] с параметрами, соответствующими таковым комбинированных данных (*ПЭС* – реальные данные, *MEV* – виртуальные). Кроме того, на предварительном этапе этой процедуры использовали алгоритмы Квази-Ньютона, Симплекс, Хука-Дживза, Розенброка (начальное вычисление коэффициентов модели), Гаусса-Ньютона и Левенберга-Марквардта (статистическая оценка коэффициентов и ANOVA).

Для классификации сообществ применяли процедуру, основанную на теории нечетких множеств (далее НМ; метрика — эвклидово расстояние) [33]. Этот метод использует коэффициент разделения Данна и предполагает, что каждый объект принадлежит к нескольким кластерам сразу, но «притягивается» к ним с разной силой [34]. Предварительно, для определения приблизительного количества групп, использовали различные варианты кластерного анализа — методы Варда, одиночной и полной связи, метрики — эвклидово расстояние и его квадрат, манхэттенское расстояние, коэффициент корреляции [35]. Статистическую значимость разбиения на группы оценивали на основе

пермутационного теста ANOSIM с вычислением общей статистики R (нулевая гипотеза H_0 — агломерация отсутствует) [3, 34].

Ведущие факторы среды, определяющие формирование сообществ макрозообентоса, выявляли методом канонического анализа соответствий с последовательным удалением незначимых параметров на основе применения теста перестановок (пошаговая процедура на основе информационного критерия Акаике AIC) и дисперсионного анализа [9, 10]. Для визуализации использовали процедуру неметрического многомерного шкалирования (NMDS).

1.4 Алгоритм процедуры нелинейного оценивания

1) Создаем сигмоидальную функцию:

```
sigmoid <- function(x, lower_asymptote, carrying_capacity,
  growth_rate, time_max) {return(lower_asymptote+
+((carrying_capacity-lower_asymptote)/(1+exp(-growth_rate*(x-
-time_max)))))} (1.10)
```

2) Вводим область определения сигмоида по оси абсцисс:

```
x <- min:max, (1.11)
```

где min и max – минимальное и максимальное значения предиктора.

3) Задаем параметры сигмоида:

```
y <- sigmoid(min:max, m1, m2, m3, m4)+rnorm(max, m5, m6) (1.12)
```

где m_1 – m_4 – «стартовые» значения для коэффициентов a , b , c и d (см. выражение 1.9), m_5 – среднее значение для реальных данных, m_6 – характеристика изменчивости результатов измерений (в нашем случае использована средняя величина модуля остатков); величины m_1 – m_6 получаем на предварительном этапе моделирования.

4) Выполняем моделирование и получаем коэффициенты модели:

```
m.s <- nls(y~a+((b-a)/(1+exp(-c*(x-d)))), start=list(a=min(y),
b=max(y), c=1, d=round(median(x))), trace=TRUE), m.s (1.13)
```

5) Строим график функции:

```
plot(y~x, type="p", pch=22, bg="yellow", xlim=c(min1, max1),
ylim=c(min2, max2), xlab="Название оси абсцисс", ylab="Название
оси ординат") (1.14)
```

```
lines(x, fitted(m.s), lty=1, lwd=2, col="red") (1.15)
```

где pch и bg – тип и цвет символа точки на графике, $xlim$ и $ylim$ – желаемые

области определения для предиктора и предиката, lty, lwd и col – тип, толщина и цвет модельной кривой (подробнее см. [31]).

6) Выводим, если требуется, полученные данные на дисплей:

```
list(x), list(y) (1.16)
```

7) Добавляем 95 % доверительные границы:

```
conf <- confint(m.s.) (1.17)
```

```
lines(x, sigmoid(min1:max1, conf[1, 1], conf[2, 1], conf[3, 1],  
conf[4, 1]), lty=2, lwd=1, col="blue") (1.18)
```

```
lines(x, sigmoid(min1:max1, conf[1, 2], conf[2, 2], conf[3, 2],  
conf[4, 2]), lty=2, lwd=1, col="blue") (1.19)
```

Пример выполнения команд (1.10)–(1.19) представлен на рисунке 1.4, по [31].

Красная линия – модель; штриховая синяя – доверительные границы; области определения x и y равны соответственно 0–100 и 0–50

Рисунок 1.4. – Пример выполнения команд (1.10)–(1.19)

9) Получаем коэффициенты для кривых доверительных границ:

```
list(conf) (1.20)
```

10) Выводим полученные данные в буфер обмена:

```
ddd <- edit(data.frame(y)), ddd (1.21)
```

```
write.table(ddd, "clipboard", sep="\t", col.names=NA) (1.22)
```

2 Определение ПЭС различными способами и выявление наиболее эффективного варианта его вычисления

При разных вариантах вычисления показатель экологического стресса варьировал в пределах 1,1–51,1 %, а диапазон изменения средних величин этого параметра составил от $14,6 \pm 2,3$ до $22,7 \pm 2,5$ % соответственно у $ПЭС_{ba}$ и $ПЭС_{амх}$ (рисунок 2.1, таблица 2.1). Как ни странно, эти различия значимы с позиций статистики (результаты теста Фридмана: вероятность справедливости $H_0 p = 0,000$).

Mean, *SE* и *Conf. Interval* – соответственно среднее значение, ошибка репрезентативности и доверительный интервал

Рисунок 2.1 – Вариации показателя экологического стресса (ПЭС) в зависимости от способа вычисления

Наибольший процент объясненной дисперсии (предиктор MEV , $R^2 = 93,7$ %) был получен при использовании предиката $ПЭС_{амх}$ (таблица 2.2). Этот вариант вычисления показателя экологического стресса является наиболее «биологичным»: донные животные, как впрочем, и любые другие, весьма разнообразны по своим размерам, и совершенно необязательно, что их плотность сильно связана именно с общей плотностью, а не с общей биомассой и наоборот.

Таким образом, наилучшие результаты дает вычисление показателя экологического стресса на основе выбора максимального значения среди всех возможных вариантов расчетов, и именно такой вариант определения этого показателя следует использовать для разработки искомого метода.

Таблица 2.1 – Результаты вычисления ПЭС различными способами

Акватория	Год	№	Сообщество	MEV, %	Варианты вычисления ПЭС									
					ПЭС _{aa}	ПЭС _{bb}	ПЭС _m	ПЭС _{mx}	ПЭС _{ab}	ПЭС _{ba}	ПЭС _{mc}	ПЭС _{cmx}	ПЭС _{tm}	ПЭС _{amx}
Зал. Стрелок и бух. Рифовая	1992	1	I. " <i>L. longifolia</i> "* + <i>O. sarsii</i>	60,3	11,6	14,5	13,0	14,5	10,5	10,5	10,5	10,5	11,8	14,5
		2	II. <i>A. pacifica</i>	90,7	17,8	15,6	16,7	17,8	15,6	8,9	12,2	15,6	14,4	17,8
Зал. Посыета	1993	3	I. <i>O. sarsii</i> + <i>A. fissa</i>	46,4	11,0	6,0	8,5	11,0	6,0	11,0	8,5	11,0	8,5	11,0
		4	II. " <i>L. longifolia</i> " + <i>M. chinensis</i>	68,4	6,7	15,6	11,1	15,6	13,3	2,2	7,8	13,3	9,4	15,6
		5	III. " <i>L. longifolia</i> " + <i>M. sarsi</i>	67,9	7,2	10,1	8,6	10,1	11,9	3,4	7,6	11,9	8,1	11,9
		6	IV. <i>A. insignis</i>	88,0	13,8	20,7	17,2	20,7	20,7	6,9	13,8	20,7	15,5	20,7
К северу от устья реки Туманной	1996	7	I. " <i>L. longifolia</i> " + <i>E. cordatum</i>	86,7	7,5	15,1	11,3	15,1	7,4	1,1	4,3	7,4	7,8	15,1
		8	IV. <i>A. macrocephala</i>	83,6	15,9	7,0	11,5	15,9	12,8	12,1	12,4	12,8	11,9	15,9
Прибрежье Владивостока	2001	9	I. " <i>L. longifolia</i> " + <i>S. bassi</i>	80,8	13,7	7,6	10,7	13,7	3,8	15,3	9,5	15,3	10,1	13,7
		10	II. " <i>L. longifolia</i> " + <i>O. sarsii</i>	85,1	2,4	16,4	9,4	16,4	4,8	3,0	3,9	4,8	6,7	16,4
		11	III. <i>P. argentata</i> + <i>Macoma</i> sp.	94,6	35,0	9,2	22,1	35,0	1,3	27,3	14,3	27,3	18,2	35,0
		12	IV. <i>A. pacifica</i>	97,9	39,4	44,0	41,7	44,0	33,3	41,7	37,5	41,7	39,6	44,0
Северная часть зал. Амурского	2005	13	II. " <i>L. longifolia</i> "	86,7	9,2	3,1	6,2	9,2	7,6	13,6	10,6	13,6	8,4	13,6
		14	III. <i>A. pacifica</i> + <i>P. harmeri</i>	89,3	20,0	22,0	21,0	22,0	21,8	2,6	12,2	21,8	16,6	22,0
Пр-в Босфор Восточный	2006–2007	15	I. <i>D. cardalia</i>	86,7	18,3	9,7	14,0	18,3	7,8	17,6	12,7	17,6	13,4	18,3
		16	IV. <i>S. armiger</i> + <i>O. sarsii</i>	83,8	11,5	7,1	9,3	11,5	10,7	8,7	9,7	10,7	9,5	11,5
Прибрежье Владивостока	2016	17	I. <i>A. pacifica</i> + <i>C. capitata</i>	97,6	46,2	38,5	42,3	46,2	38,5	46,2	42,3	46,2	42,3	46,2
		18	II. <i>O. sarsii</i> + <i>M. scarlatoi</i>	92,0	32,5	20,0	26,3	32,5	20,0	20,0	20,0	32,5	23,1	32,5
		19	III. <i>O. sarsii</i> + " <i>L. longifolia</i> "	66,9	9,5	13,0	11,0	13,0	11,6	9,3	10,5	11,6	10,9	13,0
		20	IV. <i>P. harmeri</i>	95,2	28,0	32,0	30,0	32,0	32,0	28,0	30,0	32,0	30,0	32,0
		21	V. <i>M. sarsi</i>	95,5	51,1	17,8	34,4	51,1	45,0	17,5	31,3	45,0	32,8	51,1
Прибрежье Владивостока	2018	22	II. " <i>L. longifolia</i> "	92,7	22,2	29,6	25,9	29,6	27,8	22,2	25,0	27,8	25,5	29,6
		23	IV. <i>O. sarsii</i> + <i>A. insignis</i>	77,1	7,7	13,7	10,7	13,7	12,8	6,8	9,8	12,8	10,3	13,7

* Комплекс видов рода *Lumbrineris* [21].

Продолжение таблицы 2.1

Акватория	Год	№	Сообщество	MEV, %	Варианты вычисления ПЭС, %									
					ПЭС _{aa}	ПЭС _{bb}	ПЭС _m	ПЭС _{mx}	ПЭС _{ab}	ПЭС _{ba}	ПЭС _{mc}	ПЭС _{cmx}	ПЭС _{tm}	ПЭС _{amx}
Прибрежье Владивостока	2019	24	I. " <i>L. longifolia</i> " + <i>O. sarsii</i>	81,9	11,0	12,0	11,5	12,0	11,0	11,9	11,5	12,0	11,5	12,0
		25	II. " <i>L. longifolia</i> " + <i>M. scarlatoi</i>	88,2	11,7	1,3	6,5	11,7	3,9	15,6	9,7	15,6	8,1	15,6
		26	III. <i>A. pacifica</i>	97,9	40,5	43,2	41,9	43,2	47,4	15,8	31,6	47,4	36,7	47,4
Статистические характеристики			<i>m</i>	83.9	19.3	17.1	18.2	22.1	16.9	14.6	15.7	20.7	17.0	22.7
			<i>SE</i>	2.5	2.7	2.3	2.3	2.5	2.6	2.3	2.1	2.5	2.2	2.5
			<i>Min</i>	46.4	2.4	1.3	6.2	9.2	1.3	1.1	3.9	4.8	6.7	11.0
			<i>Max</i>	97.9	51.1	44.0	42.3	51.1	47.4	46.2	42.3	47.4	42.3	51.1

Примечание. Полные наименования сообществ приведены в таблице А.1; MEV – средняя объясненная дисперсия по [9, 13], *m*, *Min*, *Max* – среднее, минимальное и максимальное значение, *SE* – ошибка репрезентативности.

Таблица 2.2 – Некоторые результаты моделирования зависимостей ПЭС от MEV

№	Параметр	r^2	<i>F</i>	<i>p</i>
1	ПЭС _{aa}	0,885	146	0,000
2	ПЭС _{bb}	0,740	64,1	0,000
3	ПЭС _m	0,927	274	0,000
4	ПЭС _{mx}	0,920	285	0,000
5	ПЭС _{ab}	0,723	50,9	0,000
6	ПЭС _{ba}	0,714	46,8	0,000
7	ПЭС _{mc}	0,894	169	0,000
8	ПЭС _{cmx}	0,910	231	0,000
9	ПЭС _{tm}	0,929	275	0,000
10	ПЭС_{amx}	0,937	377	0,000

Примечание: *r* – коэффициент корреляции, *F* – критерий Фишера, *p* – вероятность справедливости H_0 – влияние фактора «модель» отсутствует; жирным шрифтом выделен наилучший результат.

3 Зависимость ПЭС от MEV и критические уровни состояния сообществ макрозообентоса

Зависимость показателя экологического стресса от средней объясненной дисперсии весьма отчетлива, и для выбранного варианта определения ПЭС вариации предиктора, как уже было отмечено, объясняют почти 94 % изменчивости этого показателя (рисунок 3.1). Наибольшая кривизна модельной кривой приходится на 85,4 % MEV, а начало ее роста после достижения минимума (начало выхода на плато) – почти точно на 94 %, что соответствуют ПЭС_{амх} в 15 и 36 % (рисунок 3.1, 3.2). Совершенно очевидно, что эти уровни для сообществ макрозообентоса являются «критическими» и могут рассматриваться как граничные критерии для оценки классов состояния морской среды.

Градиентная заливка маркеров (а) – соотношение вкладов естественных и антропогенных факторов; цифры – номера сообществ; r – коэффициент корреляции, F – критерий Фишера, p – вероятность справедливости H_0 – влияние фактора «модель» отсутствует, штриховые линии – доверительные границы (на диаграммах приведены статистики для моделей, полученных при помощи алгоритмов МНК); а и б – реальные данные по [6, 9]; в и г – MEV – модельные, ПЭС – натурные по [13, данный Отчет]

Рисунок 3.1 – Зависимость показателя экологического стресса от средней объясненной дисперсии и граничные критерии для оценки классов состояния морской среды (римские цифры)

При «докритическом» уровне связь индивидуальных характеристик обилия с общей биомассой и плотностью поселения низка, поскольку морская среда благоприятна

и не оказывает существенного влияния на агломерацию животных – сообщества макрозообентоса «биологически сбалансированы» или, по крайней мере, стремятся к такому состоянию. Однако, учитывая относительно высокий уровень объясняемой дисперсии (в среднем, во всех случаях >50 %), следует заметить, что в нашей выборке (до 60 м) явно отсутствуют биологически сбалансированные сообщества в понимании К.Н. Несиса [7] и, вероятно, следует говорить лишь о степени такой сбалансированности или физической контролируемости.

Рисунок 3.2 – Изменение кривизны модельной кривой вдоль градиента *MEV*

В промежутке между I и II критическими уровнями косные факторы начинают оказывать на сообщества донной фауны заметное воздействие, агломерация животных возрастает ($ПЭС_{амх} \sim 15\text{--}36\%$) и, при дальнейшем росте внешнего давления, группировки макрозообентоса переходят в иное – «физически контролируемое» – состояние ($ПЭС_{амх} > 36\%$), что говорит о наличии некоего общего внешнего лимитирующего фактора. Необходимо подчеркнуть, что лимитирующий фактор – это совершенно не обязательно степень антропогенного воздействия (к примеру, уровень загрязнения): сообщество *Maldane sarsi* (V, съемка 2016 г.) имеет высокий $ПЭС_{амх}$ из-за влияния терригенного стока, причиной усиления которого вряд ли является деятельность человека (если не рассуждать о глобальных климатических изменениях и парниковом эффекте).

В ЕС, США и Канаде выделяют две степени загрязнения почв и осадков [36, 37]. Первая – т.н. «заданное значение» (target value) – это уровень, к которому следует стремиться, чтобы восстановить функциональные свойства почвы (осадка) для жизни людей, растений и животных. Вторая – «значение коррекции» (intervention value) – уровень, когда такие свойства сильно снижены или представляют опасность. Основу такому

делению положила обзорная работа Е.Р. Лонга с соавторами [38], которые ввели понятие таких показателей (пороговых или граничных критериев) как *ERL* и *ERM* (effect range-low и effect range-medium). Первый отделяет минимальный уровень воздействия, когда эффекты редки, и концентрации ЗВ не оказывают заметного влияния на видовой состав и структуру донного населения. Между *ERL* и *ERM* лежит область постепенного роста проявления таких воздействий; после *ERM* эти эффекты почти облигатны. Подобное деление для морских акваторий Канады и США выполнили Дж. Бойд с коллегами [39], определив *TEL* и *PEL* (threshold и probable effects levels). Вводимые нами граничные критерии по смыслу соответствуют заданному значению и величине коррекции (соответственно I и II критические уровни), а также показателям указанных авторов и исполнителей данного Отчета (*ERL_q* и *ERM_q*; [40, 41]). В этом отношении логично именовать их как *CERL* и *CERM* (community effect range-low и community effect range-medium).

Преимущество предлагаемых критериев заключается в отсутствии необходимости точного таксономического определения видов макрозообентоса, достаточно чтобы одни и те же виды были обозначены идентичными символами (например, просто цифрами). Это повышает оперативность получения заключений об экологическом состоянии морской среды. Известно, что полная видовая идентификация, необходимая для вычислений индексов *TPF_{bio}*, *AMBI* и *M-AMBI* занимает много недель, а то и месяцев. К недостаткам следует отнести репрезентативность выборки: желательно, чтобы число станций или, в крайнем случае, проб, включенных в сообщество, было не менее семи, что в реальных условиях иногда оказывается недостижимым. В то же время вычисление индексов *TPF_{bio}*, *AMBI* и *M-AMBI* возможно для любого числа станций и даже отдельных проб.

Таким образом, в результате корреляционного анализа зависимостей биологических параметров, включая характеристики обилия и экологические индексы, от факторов среды и определения суммарной объясняемой дисперсии этих показателей были получены два граничных критерия состояния сообществ макрозообентоса [9, 13]. При благоприятных условиях среды *ПЭС* не превышает 15 % (первый критический уровень)*, а сообщества донной фауны находятся в состоянии, близком к «биологически сбалансированному». Величины *ПЭС* в диапазоне 15–36 % говорят об усилении влияния неких лимитирующих факторов (не обязательно антропогенных), но это воздействие не является «разрушающим». Значения *ПЭС*, превышающие 36 % (второй критический уровень) свидетельствуют об экстремальном ухудшении условий среды обитания и переходе сообществ в иное – «физически контролируемое» – состояние.

* Исключение – группировка «*Lumbrineris longifolia*» + *Maetra chinensis*, локализованная в прибрежье открытой части притуманганской акватории (съемка 1993 г.); объяснение этого «выброса» будет дано в разделе 5.

4 Сообщества макрозообентоса разного экологического статуса и их свойства

Выделенные сообщества весьма разнообразны и изменчивы, что относится как к их таксономическому составу, так и структуре [9, 13]. Количественные характеристики видов и более крупных таксонов, найденных в этих агломерациях, представлены в приложении (таблица 1.А). В настоящем отчете рассматриваются 26 группировок макрозообентоса и, чтобы снизить размерность и, таким образом, упростить дальнейший анализ, необходимо классифицировать эти ассоциации по отношению к их экологическому состоянию.

4.1 Классификация сообществ макрозообентоса и факторы их дифференциации

Применение процедуры НМ позволяет выделить шесть групп сообществ донных животных (рисунок 4.1, таблица 4.1), приуроченных к следующим районам исследованной акватории:

- I – Бухте Рифовой, открытой мористой, прибрежной мористой и полуоткрытой частям залива Посьета, а также к открытым районам Амурского и Уссурийского заливов (соответственно съемки 1992, 1993 и 2001 гг.; номера сообществ в таблицах 4.1, 4.3, 4.4: 1, 3, 4, 5 и 19);
- II – Амурскому и северной части Уссурийского залива, северной и северо-западной области кута Амурского залива, центральной и устьевой части бухты Патрокл, открытым районам Амурского и Уссурийского заливов, а также к восточному побережью полуострова Муравьева-Амурского и пролива Босфор Восточный (съемки 2001, 2005, 2006, 2018 и 2019 гг.; 9, 13, 16, 23 и 24);
- III – Прибрежной и центральной частям притуманганской акватории, а также ее мористой области, Уссурийскому и Амурскому заливам, восточной части пролива Босфор Восточный и восточному побережью Амурского залива (съемки 1996, 2001 и 2019 г.; 7, 8, 10 и 25);
- IV – Внутренней части залива Стрелок, кутовым частям бухт и самой закрытой области залива Посьета, центральной и южной частям кута Амурского залива, побережью острова Русский (съемки 1992, 1993, 2005 и 2007 гг.; 2, 6, 14 и 15);
- V – Проливу Босфор-Восточный, бухте Улисс и восточному побережью Амурского залива, побережью полуострова Эгершельда и центральной северной части Амурского залива, внутренним областям Амурского и Уссурийского заливов (съемки 2001, 2016 и 2018 гг.; 11, 18, 20 и 22);
- VI – Бухтам Золотой Рог и Диомид, а также к внутренним акваториям Амурского и Уссурийского заливов (съемки 2001, 2016 и 2019 гг.; 12, 17, 21 и 26).

Арабскими числами обозначены группировки донных животных (таблица 2.1), римскими – выделенные экологические типы (а) и критические уровни состояния сообществ (в); R – частные значения статистики, p – вероятность справедливости H_0 – агломерация отсутствует, N – число перестановок

Рисунок 4.1 – Нечеткая классификации сообществ макрозообентоса, частные результаты процедуры ANOSIM и положение группировок на графике зависимости $PЭC_{амх}$ от MEV (соответственно а-в); компоненты объясняют 76,4 % дисперсии точек; глобальная статистика $R = 0,878$, $p = 0,001$

Таблица 4.1 – Результаты нечеткой классификации сообществ макрозообентоса – степень принадлежности станций к выделенным кластерам (экспоненциальный вес — 1,3)

Сообщество	№	Кластер/экологический тип сообщества					
		I	II	III	IV	V	VI
<i>O. sarsii</i> + " <i>L. longifolia</i> "	19	0,987	0,011	0,002	0,000	0,000	0,000
" <i>L. longifolia</i> " + <i>O. sarsii</i>	1	0,977	0,012	0,008	0,002	0,000	0,000
" <i>L. longifolia</i> " + <i>M. sarsi</i>	5	0,969	0,027	0,003	0,001	0,000	0,000
<i>O. sarsii</i> + <i>A. fissa</i>	3	0,888	0,066	0,025	0,014	0,004	0,002
" <i>L. longifolia</i> " + <i>M. chinensis</i>	4	0,857	0,046	0,082	0,014	0,001	0,000
" <i>L. longifolia</i> " + <i>O. sarsii</i>	24	0,002	0,994	0,004	0,001	0,000	0,000
" <i>L. longifolia</i> " + <i>S. bassi</i>	9	0,001	0,992	0,007	0,000	0,000	0,000
<i>S. armiger</i> + <i>O. sarsii</i>	16	0,005	0,976	0,017	0,002	0,000	0,000
<i>O. sarsii</i> + <i>A. insignis</i>	23	0,017	0,958	0,023	0,002	0,000	0,000
" <i>L. longifolia</i> "	13	0,003	0,812	0,177	0,007	0,000	0,000
" <i>L. longifolia</i> " + <i>M. scarlatoi</i>	25	0,000	0,001	0,996	0,003	0,000	0,000
<i>A. macrocephala</i>	8	0,000	0,003	0,996	0,001	0,000	0,000
" <i>L. longifolia</i> " + <i>E. cordatum</i>	7	0,000	0,004	0,994	0,002	0,000	0,000
" <i>L. longifolia</i> " + <i>O. sarsii</i>	10	0,000	0,002	0,994	0,004	0,000	0,000
<i>A. insignis</i>	6	0,000	0,000	0,002	0,997	0,000	0,000
<i>A. pacifica</i> + <i>P. harmeri</i>	14	0,000	0,001	0,005	0,991	0,003	0,000
<i>D. cardalia</i>	15	0,000	0,002	0,049	0,948	0,000	0,000
<i>A. pacifica</i>	2	0,000	0,003	0,059	0,937	0,001	0,000
<i>P. harmeri</i>	20	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
<i>O. sarsii</i> + <i>M. scarlatoi</i>	18	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
" <i>L. longifolia</i> "	22	0,000	0,000	0,000	0,002	0,997	0,001
<i>P. argentata</i> + <i>Macoma</i> sp.	11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,995	0,004
<i>A. pacifica</i>	26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
<i>A. pacifica</i> + <i>C. capitata</i>	17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
<i>A. pacifica</i>	12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,999
<i>M. sarsi</i>	21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,998

Примечание. Полные наименования сообществ приведены в таблице А.1; жирным шрифтом выделены экспоненциальные веса для сообществ основного кластера, жирным курсивом – дополнительного (>0,05).

Очевидно, учитывая величины $ПЭС_{амх}$ и MEV и опираясь на используемую нами терминологию, группа I должна объединять биологически сбалансированные или почти сбалансированные сообщества, группа VI – физически контролируемые. Между ними располагаются группы II–V, включающие сообщества с разной степенью разбалансировки – от легкого до сильного дисбаланса: слабо и умеренно разбалансированные, разбалансированные и сильно разбалансированные (далее – экологические типы сообществ макрозообентоса, соответственно BB, SD, MD, D, HD и PC).

Биологически сбалансированные или почти сбалансированные сообщества характеризуются низкими величинами показателя экологического стресса и средней объясненной дисперсии (соответственно < 15,6 % и <70 %, таблица 4.2). У слегка разбалансированных группировок $ПЭС_{амх}$ имеет примерно те же значения (в среднем – даже слегка ниже), тогда как MEV заметно повышается и варьирует в пределах 77–87 % (в среднем – 82,1 %). Далее, на фоне постепенного роста объясненной дисперсии, продолжается и увеличение показателя экологического стресса, причем если в ряду ВВ, SD → D переход происходит постепенно, то от D к HD и, затем, от HD к PC инкременты $ПЭС_{амх}$ возрастают в разы и становятся саккадическими.

Таблица 4.2 – Статистические характеристики MEV и $ПЭС_{амх}$ у экологических типов сообществ

Тип	MEV				$ПЭС_{амх}$			
	m	SE	Min	Max	m	SE	Min	Max
ВВ	62,0	4,7	46,4	68,4	13,2	0,9	11,0	15,6
SD	82,1	1,8	77,1	86,7	12,9	0,5	11,5	13,7
MD	85,9	1,1	83,6	88,2	15,7	0,3	15,1	16,4
D	88,7	1,0	86,7	90,7	19,7	1,2	17,8	22,0
HD	93,6	0,9	92,0	95,2	32,3	1,3	29,6	35,0
PC	97,2	0,7	95,5	97,9	47,2	1,7	44,0	51,1

Примечание. Экологические типы сообществ: ВВ – биологически сбалансированные или почти сбалансированные, SD, MD, D и HD соответственно слабо и умеренно разбалансированные, разбалансированные и сильно разбалансированные, PC – физически контролируемые; m , Min , Max – среднее, минимальное и максимальное значение, SE – ошибка репрезентативности.

В выделенные типы вошли сообщества, локализованные на самых разных участках исследованной акватории. Однако с увеличением номера этих групп и, соответствующего роста MEV (рисунок 4.1), в их составе начинают преобладать ассоциации из областей, расположенных все ближе и ближе к Владивостоку – основному источнику загрязнения залива Петра Великого [42–44]. Необходимо подчеркнуть, что сообщества, приуроченные примерно к одним и тем же областям исследованных акваторий, но опробованные в разные годы, часто попадают в разные группы и, кроме того, не всегда имеют одни и те же титульные виды (и не только титульные; таблица А.1). Примерами этому могут служить сообщества внутренних частей Амурского и Уссурийского заливов, их открытых районов, но наиболее примечательны в этом отношении группировки пролива Босфор Восточный и сопредельных акваторий (таблица 4.3, А.1). Причины этих изменений будут рассмотрены в разделе 4.4.

Состав, структура и состояние зообентоса акваторий вблизи Владивостока определяются, прежде всего, уровнем химического загрязнения и особенностями придонного

Таблица 4.3 – Выделенные экологические типы сообществ и императивные факторы среды, определяющие их дифференциацию (по [9])

Тип	№	Год	Акватория	Сообщество	Факторы
BB	1	1992	Бух. Рифовая и зал. Стрелок	I. " <i>L. longifolia</i> " + <i>O. sarsii</i>	<i>PoF</i> , <i>AP</i>
	3	1993	Открытая часть зал. Посьета	I. <i>O. sarsii</i> + <i>A. fissa</i>	<i>TPF_{chem}</i> , <i>AP</i>
	4	1993	Прибрежье открытой части притуманганской акватории	II. " <i>L. longifolia</i> " + <i>M. chinensis</i>	<i>TPF_{chem}</i> , <i>AP</i>
	5	1993	Переходная область между открытой и закрытой частями зал. Посьета	III. " <i>L. longifolia</i> " + <i>M. sarsi</i>	<i>TPF_{chem}</i> , <i>AP</i>
	19	2016	Открытые районы Амурского и Уссурийского заливов	III. <i>O. sarsii</i> + " <i>L. longifolia</i> "	<i>TPF_{chem}</i> / <i>PoF</i> ₁ , <i>O</i> ₂ , <i>MeF</i> ₂
SD	9	2001	Амурский залив и северная часть Уссурийского залива	I. " <i>L. longifolia</i> " + <i>S. bassi</i>	<i>MeF</i> ₂ , <i>C_{орг}</i>
	13	2005	Северная и северо-западная часть кута Амурского залива	II. " <i>L. longifolia</i> "	<i>C_{орг}</i> , <i>MEAN</i> , <i>GrF</i> ₂
	16	2006	Центральная и устьевая часть бух. Патрокл	IV. <i>S. armiger</i> + <i>O. sarsii</i>	<i>TPF_{chem}</i> , <i>GrL</i> ₁ , <i>GrL</i> ₃
	23	2018	Открытые районы Амурского и Уссурийского заливов	IV. <i>O. sarsii</i> + <i>A. insignis</i>	<i>Dpth</i> , <i>C_{орг}</i>
	24	2019	Восточное побережье п-ва Муравьева-Амурского и пр-ва Босфор Восточный	I. " <i>L. longifolia</i> " + <i>O. sarsii</i>	<i>TPF_{chem}</i> , <i>Dpth</i> , <i>O</i> ₂ , <i>GrF</i> ₁
MD	7	1996	Прибрежная и центральная части притуманганской акватории	I. " <i>L. longifolia</i> " + <i>E. cordatum</i>	<i>MEAN</i> , <i>C_{орг}</i>
	8	1996	Мористая часть притуманганской акватории	IV. <i>A. macrocephala</i>	<i>MEAN</i> , <i>C_{орг}</i>
	10	2001	Уссурийский и Амурский заливы	II. " <i>L. longifolia</i> " + <i>O. sarsii</i>	<i>MeF</i> ₂ , <i>C_{орг}</i>
	25	2019	Восточная часть пр-ва Босфор Восточный и побережье Амурского залива	II. " <i>L. longifolia</i> " + <i>M. scarlatoi</i>	<i>TPF_{chem}</i> , <i>Dpth</i> , <i>O</i> ₂ , <i>GrF</i> ₁
D	2	1992	Зал. Стрелок	II. <i>A. pacifica</i>	<i>PoF</i> , <i>AP</i>
	6	1993	Кутовые части бухт и самая закрытая область зал. Посьета	IV. <i>A. insignis</i>	<i>TPF_{chem}</i> , <i>AP</i>
	14	2005	Центральная и южная части кута Амурского залива	III. <i>A. pacifica</i> + <i>P. harmeri</i>	<i>C_{орг}</i> , <i>MEAN</i> , <i>GrF</i> ₂
	15	2007	Прибрежье о-ва Русский	I. <i>D. cardalia</i>	<i>TPF_{chem}</i> , <i>GrL</i> ₁ , <i>GrL</i> ₃
HD	11	2001	Пр-в Босфор-Восточный, бух. Улисс, восточное побережье Амурского залива	III. <i>P. argentata</i> + <i>Macoma</i> sp.	<i>MeF</i> ₂ , <i>C_{орг}</i>
	18	2016	Пр-в Босфор Восточный и устье бух. Улисс	II. <i>O. sarsii</i> + <i>M. scarlatoi</i>	<i>TPF_{chem}</i> / <i>PoF</i> ₁ , <i>O</i> ₂ , <i>MeF</i> ₂
	20	2016	Прибрежье п-ва Эгершельда и центральная северная часть Амурского залива	IV. <i>P. harmeri</i>	<i>TPF_{chem}</i> / <i>PoF</i> ₁ , <i>O</i> ₂ , <i>MeF</i> ₂
	22	2018	Внутренние области Амурского и Уссурийского заливов	II. " <i>L. longifolia</i> "	<i>Dpth</i> , <i>C_{орг}</i>

Продолжение таблицы 4.3

Тип	№	Год	Акватория	Сообщество	Факторы
РС	12	2001	Бухты Золотой Рог и Диомид	IV. <i>A. pacifica</i>	$MeF_2, C_{орг}$
	17	2016	Бухты Золотой Рог и Диомид	I. <i>A. pacifica</i> + <i>C. capitata</i>	$TPF_{chem}/PoF_1, O_2, MeF_2$
	21	2016	Внутренние акватории Амурского и Уссурийского заливов	V. <i>M. sarsi</i>	$TPF_{chem}/PoF_1, O_2, MeF_2$
	26	2019	Бухты Золотой Рог и Диомид	III. <i>A. pacifica</i>	$TPF_{chem}, Dpth, O_2, GrF_1$

Примечание. Полные наименования сообществ приведены в таблице А.1; условные обозначения факторов среды – см. «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ».

Таблица 4.4 – Сообщества макрозообентоса и некоторые характеристики среды в метрах их обитания (по [9])

Тип	№	Сообщество	Глубина, м	TPF_{chem} , усл. ед.	Содержание $C_{орг}$, мг/г	Доля частиц <0,1 мм, %*	Тип грунта (выделен преобладающий тип)
ВВ	1	I. " <i>L. longifolia</i> " + <i>O. sarsii</i>	28 (8-42)	1,4 (1,3-1,8)	1,24 (0,81-2,42)	30,7 (16,3-71,9)	Пески мелкие , алевриты песчаные
	3	I. <i>O. sarsii</i> + <i>A. fissa</i>	28 (6-42)	1,5 (1,0-2,0)	1,42 (0,81-3,10)	37,6 (16,3-98,5)	Пески мелкие , миктиты пелитовые, пелиты
	4	II. " <i>L. longifolia</i> " + <i>M. chinensis</i>	11 (5-18)	1,3 (1,0-2,3)	1,30 (0,67-3,10)	33,1 (11,7-98,5)	Пески мелкие и алевритовые, пелиты
	5	III. " <i>L. longifolia</i> " + <i>M. sarsi</i>	12 (7-22)	1,7 (1,3-2,3)	2,26 (1,10-3,09)	67,1 (25,8-98,0)	Пески мелкие, алевриты песчаные и пелитовые , миктиты пелитовые
	19	III. <i>O. sarsii</i> + " <i>L. longifolia</i> "	23 (12-38)	2,6 (1,8-3,8)	1,13 (0,11-3,47)	54,0 (6,9-88,0)	Алевриты песчаные , пески мелкие, миктиты алевритовые и пелитовые
	В среднем			$21,5 \pm 1,3$ (5,0–42,0)	$1,7 \pm 0,1$ (1,0–3,2)	$1,50 \pm 0,10$ (0,11–3,47)	$44,7 \pm 3,6$ (6,9–98,5)
SD	9	I. " <i>L. longifolia</i> " + <i>S. bassi</i>	18 (6-35)	2,4 (1,8-3,6)	2,87 (1,73-5,37)	90,6 (71,3-99,6)	Миктиты алевритовые , алевриты пелитовые и песчаные, пелиты алевритовые, пелиты
	13	II. " <i>L. Longifolia</i> "	5 (1-8)	2,4 (2,0-2,6)	1,51 (0,39-1,85)	91,3 (26,7-99,5)	Пелиты алевритовые , алевриты пелитовые, пески мелкие
	16	IV. <i>S. armiger</i> + <i>O. sarsii</i>	22 (7-30)	2,8 (2,4-3,2)	2,08 (1,18-3,21)	33,1 (5,8-79,7)	Пески мелкие , алевритовые и гравийные, миктиты алевритовые, пелиты алевритовые

Продолжение таблицы 4.4

Тип	№	Сообщество	Глубина, м	TPF, усл. ед.	C _{орг} , мг/г	Доля частиц <0,1 мм, %*	Тип грунта (выделен преобладающий тип)
SD	23	IV. <i>O. sarsii</i> + <i>A. insignis</i>	24 (12-42)	2,4 (2,0-3,4)	1,36 (0,15-2,29)	42,4 (6,9-82,9)	Пески мелкие и алевритовые, алевриты песчаные, миктиты алевритовые
	24	I. " <i>L. longifolia</i> " + <i>O. sarsii</i>	21 (15-30)	3,2 (2,2-3,8)	2,34 (0,96-4,65)	61,1 (21,9-84,3)	Алевриты пелитовые и песчаные, миктиты алевритовые и песчаные, пески мелкие и алевритовые
	В среднем		<u>17,0±1,2</u> (0,7-43,0)	<u>2,7±0,1</u> (1,8-3,8)	<u>2,11±0,13</u> (0,15-5,37)	<u>66,8±4,0</u> (5,8-99,6)	Пески мелкие и алевритовые, алевриты пелитовые, пелиты алевритовые
MD	7	I. " <i>L. longifolia</i> " + <i>E. cordatum</i>	14 (7-26)	1,3 (1,0-2,0)	0,39 (0,04-1,20)	9,3 (0,7-48,7)	Пески мелкие и алевритовые
	8	IV. <i>A. macrocephala</i>	51 (26-67)	1,6 (1,3-2,0)	0,42 (0,07-1,05)	16,3 (0,7-44,2)	Пески мелкие и алевритовые
	10	II. " <i>L. longifolia</i> " + <i>O. sarsii</i>	24 (14-48)	2,1 (1,6-3,4)	1,18 (0,27-3,28)	38,0 (6,9-94,6)	Пески мелкие и алевритовые, миктиты алевритовые, алевриты песчаные и пелитовые
	25	II. " <i>L. longifolia</i> " + <i>M. scarlatoi</i>	28 (21-37)	3,5 (3,2-3,8)	4,38 (3,01-6,85)	78,1 (55,3-97,6)	Алевриты пелитовые , миктиты, миктиты алевритовые
	В среднем		<u>27,8±2,7</u> (6,0-67,0)	<u>2,2±0,2</u> (1,0-3,8)	<u>1,69±0,31</u> (0,04-6,85)	<u>37,2±5,6</u> (0,7-97,6)	Пески мелкие и алевритовые, алевриты песчаные и пелитовые
D	2	II. <i>A. pacifica</i>	19 (6-29)	2,1 (1,8-2,8)	2,30 (1,51-3,03)	67,9 (39,4-95,8)	Пески алевритовые, алевриты песчаные , миктиты пелитовые, пелиты алевритовые
	6	IV. <i>A. insignis</i>	7 (5-16)	2,1 (1,5-2,5)	2,90 (1,10-3,10)	91,3 (25,8-98,5)	Алевриты пелитовые , пелиты алевритовые, пелиты, пески мелкие
	14	III. <i>A. pacifica</i> + <i>P. harmeri</i>	16 (14-18)	2,5 (2,0-3,0)	2,18 (1,91-2,86)	98,2 (94,8-99,6)	Пелиты
	15	I. <i>D. cardalia</i>	19 (10-26)	2,9 (2,2-3,2)	2,40 (0,85-3,21)	47,5 (3,4-93,2)	Пески мелкие, алевритовые и гравийные, алевриты пелитовые, миктиты алевритовые
	В среднем		<u>14,7±1,2</u> (5,0-29,0)	<u>2,4±0,1</u> (1,5-3,2)	<u>2,48±0,12</u> (0,85-3,21)	<u>75,3±5,1</u> (3,4-99,6)	Пески мелкие и алевритовые, алевриты песчаные и пелитовые

Продолжение таблицы 4.4

Тип	№	Сообщество	Глубина, м	ТПФ, усл. ед.	C _{орг} , мг/г	Доля частиц <0,1 мм, %*	Тип грунта (выделен преобладающий тип)
HD	11	III. <i>P. argentata</i> + <i>Macoma</i> sp.	15 (9-19)	2,2 (1,6-2,8)	1,57 (0,46-3,18)	56,9 (7,4-86,4)	Миктиты алевритовые , пески мелкие, алевриты пелитовые
	18	II. <i>O. sarsii</i> + <i>M. scarlatoi</i>	31 (27-37)	3,7 (3,0-4,0)	3,84 (2,78-4,90)	74,6 (63,7-86,4)	Миктиты алевритовые, алевриты пелитовые
	20	IV. <i>P. harmeri</i>	21 (17-25)	2,5 (2,4-2,8)	3,45 (3,08-4,03)	87,3 (79,1-94,8)	Миктиты алевритовые, пелиты
	22	II. " <i>L. longifolia</i> "	7 (4-8)	2,5 (2,4-2,6)	1,63 (1,35-2,08)	92,6 (88,0-99,3)	Алевриты пелитовые
		В среднем	<u>17,9±2,5</u> (5,0–37,0)	<u>2,8±0,2</u> (1,6–4,0)	<u>2,50±0,34</u> (0,46–4,90)	<u>76,0±5,7</u> (7,4–99,3)	Миктиты алевритовые, алевриты пелитовые
PC	12	IV. <i>A. pacifica</i>	20 (18-24)	3,8 (2,8-4,4)	9,37 (3,73-12,74)	56,6 (45,0-73,0)	Миктиты алевритовые , пески алевритовые и гравийные
	17	I. <i>A. pacifica</i> + <i>C. capitata</i>	17 (9-24)	4,6 (4,0-5,0)	5,68 (3,66-10,20)	62,0 (45,0-73,8)	Миктиты алевритовые , пески алевритовые, алевриты песчаные
	21	V. <i>M. sarsi</i>	12 (5-18)	2,7 (1,8-3,2)	1,79 (0,77-3,14)	89,2 (72,8-99,3)	Алевриты пелитовые и песчаные
	26	III. <i>A. pacifica</i>	16 (9-24)	4,8 4,4–5,0	7,05 (3,85-9,95)	64,0 (45,0-78,8)	Миктиты алевритовые и песчаные, миктит, пески алевритовые, алевриты песчаные
		В среднем	<u>15,7±1,1</u> (5,0–24,3)	<u>4,0±0,2</u> (2,2–5,0)	<u>5,90±0,7</u> (0,8–12,7)	<u>68,3±3,7</u> (45,0–99,3)	Миктиты алевритовые и песчаные, алевриты пелитовые

Примечание. Приведены средние значения и диапазон изменения параметров среды (в скобках), жирным шрифтом выделены преобладающие типы донных отложений; полные наименования сообществ приведены в таблице А.1.

гидрологического режима, который во многом обусловлен интенсивностью терригенного стока [9]. Кроме того, важную роль играют различные показатели гранулометрического состава осадков, определяющие, в конечном итоге, тип грунта. Все факторы, влияющие на донное население, условно могут быть объединены в четыре группы: гидрологические (глубина, содержание O_2 и т. д.), гранулометрические (соответствующие факторы и различные параметры гранулометрических спектров), характеристики контаминации (TPF и факторы загрязнения) и содержание органического углерода (соответственно группы 1, 2, 3 и 4) [13].

Среди факторов, обуславливающих дифференциацию сообществ, преобладают эффекты третьей условной группы, наблюдавшиеся в 20 из 26 случаев (76,9 %), затем следуют воздействия второй группы, отмеченные у половины сообществ; влияние 1 и 4 групп проявлялось по десять раз (38,5 %) (рисунок 4.2, таблица 4.3). Следует также обратить внимание на частое включение в число ведущих фактора MeF_2 и концентрации растворенного кислорода (8 и 30,8 % у обоих показателей), действие которых в ряду групп ВВ $\rightarrow$ РС заметно возрастает (увеличивается частота их подключения к дифференциации сообществ). Параметр MeF_2 маркирует терригенный сток и соответственное поступление специфических ЗВ и биогенов, интенсифицирующих, в конечном итоге, продукцию органического углерода, причем эти явления носят сезонный характер и проявляются через некоторое время после паводков [42–44]. В областях сезонного повышения содержания $C_{орг}$, а также там, где его концентрация велика постоянно (бухты Золотой Рог и Диомид), развиваются процессы гниения, усугубляющие дефицит O_2 , изменения концентраций которого обусловлены также и спецификой гидрологического режима [9, 13, 21, 45].

Однозначная приуроченность экологических типов сообществ к определенному диапазону императивных факторов в полной мере проявляется лишь у биологически сбалансированных и физически контролируемых агломераций. Первые локализованы в самых чистых районах с наименьшими концентрациями $C_{орг}$ ($TPF_{chem} = 1,7 \pm 0,1$ усл. ед., $C_{орг} = 1,50 \pm 0,10$ мг/г), вторые – на наиболее загрязненных и эвтрофированных акваториях ($4,0 \pm 0,2$ и $5,9 \pm 0,7$; рисунок 4.3, таблица 4.4). Слегка разбалансированные сообщества отмечены на участках с довольно высоким TPF_{chem} , но небольшим содержанием $C_{орг}$ ($2,7 \pm 0,1$ и $2,11 \pm 0,13$), умеренно разбалансированные – наблюдаются при относительно низком загрязнении и степени эвтрофикации ($2,2 \pm 0,2$ и $1,69 \pm 0,31$). Разбалансированные существуют в условиях умеренного загрязнения и эвтрофирования ($2,4 \pm 0,1$ и $2,48 \pm 0,12$), сильно разбалансированные – при TPF_{chem} , в среднем близком к порогу ERL_q , и примерно том же содержании органики ($2,8 \pm 0,2$ и $2,50 \pm 0,34$), что и группировки D типа.

Наиболее «глубоководны» умеренно разбалансированные сообщества,

«мелководны» – разбалансированные (соответственно $27,8 \pm 2,7$ и $14,7 \pm 1,2$ м), однако станции с небольшой глубиной (5 м и менее) присутствуют во всех агломерациях, независимо от степени их дисбаланса (рисунок 4.3, таблица 4.4). Наибольший процент алевропелитов отмечен в местообитаниях групп D и HD (в среднем $>75\%$), наименьший – у группировок MD ($<45\%$), однако диапазон изменений содержания таких частиц в биотопах большинства ассоциаций весьма широк – от $0,7\text{--}7,4\%$ до $97,6\text{--}99,6\%$, за исключением объединений PC группы, где их доля не опускается ниже 45% (таблица 4.4).

BB – биологически сбалансированные, SD, MD, D и HD соответственно слабо и умеренно разбалансированные, разбалансированные и сильно разбалансированные, PC – физически контролируемые

Рисунок 4.2 – Императивные факторы, участвующих в дифференциации сообществ

Нет четкой приуроченности выделенных типов сообществ и к какому-либо определенному грунту, хотя прослеживаются и некоторые закономерности в изменениях доминантов донных отложений, от песчаных алевритов, мелких и алевритовых песков, (группы BB–D) к песчаным, алевритовым и пелитовым микритам (HD, PC). При этом происходит увеличение разнообразия донных отложений (рост энтропии гранулометрического распределения), повышение содержания алевритов и частиц наиболее грубых фракций – псефитов (гравий, галька) (рисунок 4.3). Следует подчеркнуть, что влияние фактора «группа» статистически значимо для всех параметров среды, показанных в таблице 4.4 и на рисунке 4.3 (результаты теста Крускала-Уоллиса: вероятность справедливости $H_0 p = 0,0000\text{--}0,0002$; таблица А.2). Поэтому, наши выводы корректны с позиций статистики и могут быть использованы в дальнейших построениях.

Итак, по-настоящему императивными факторами для выделенных экологических типов сообществ макрозообентоса является уровень химического загрязнения и

эвтрофикации, а также содержание растворенного кислорода и терригенный сток. В меньшей степени это относится к гранулометрическому составу донных отложений и типам грунта и, еще в меньшей, – к глубине. В тоже время, последнюю нельзя полностью исключить из этого списка, поскольку ее действие, как и влияние фракционного состава осадков, отражается на вариациях общих биотических характеристик (см. далее раздел 4.3, а также [46]).

Mean – среднее значение; *SE* – ошибка репрезентативности; BB – биологически сбалансированные, SD, MD, D и HD соответственно слабо и умеренно разбалансированные, разбалансированные и сильно разбалансированные, PC – физически контролируемые

Рисунок 4.3 – Вариации некоторых параметров среды у выделенных групп сообществ макрозообентоса. Для группы умеренно разбалансированных агломераций (III) содержание алевритов вычислено только для сообществ 10 и 25, так у группировок 7 и 8 определяли лишь суммарное содержание частиц тонких фракций (алевропелитов)

4.2 Изменения состава сообществ по отношению к императивным факторам

Уровень химического загрязнения и степень эвтрофикации морской среды, как было показано в предыдущем разделе, являются основными факторами, обуславливающими разделение исследованных сообществ макрозообентоса на экологические типы. Поэтому, проанализируем таксономический состав выделенных групп по отношению к данным факторам, для чего используем имеющиеся классификации, с учетом бионтности, и индексы TPF_{bio} и $AMBI$ [21, 22, 25]. Естественно, желательно иметь представление о «спектрах» группировок и в отношении других параметров среды – глубины, типов грунта и характеристик их гранулометрических спектров, содержания растворенного кислорода, наконец, терригенного стока, заиляющее действие которого можно характеризовать, например, содержанием взвешенных веществ. Однако какие-либо ясные классификации представителей макрозообентоса относительно указанных факторов, выраженные в цифрах и пригодные для практического применения, отсутствуют, как, впрочем, и соответствующие количественные показатели. Классификация донных животных по отношению к перечисленным параметрам и разработка показателей, необходимых для использования этих ординаций на практике, запланированы на 2025–2029 гг. в рамках темы 4.6.2.

В биологически сбалансированных группировках преобладают умеренно толерантные, чувствительные и экстремально чувствительные по отношению к загрязнению гидробионты (рисунок 4.4). В физически контролируемых сообществах доминируют экстремально толерантные и толерантные представители донной фауны – оппортунисты первого и второго порядка. Такой состав этих типов агрегаций характерен как для всего набора таксонов, так и для систематических единиц, вносящих наибольший вклад во внутригрупповое сходство отдельных сообществ (далее – значимые, весомые или ценные таксоны).

Среди весомых таксонов экстремально толерантные и толерантные животные доминируют еще и в разбалансированных и сильно разбалансированных группировках, причем здесь это оппортунисты второго порядка, тогда как в физически контролируемых – первого. В целом, в ряду выделенных типов сообществ ($BB \rightarrow PC$) наблюдается довольно равномерное снижение роли умеренно толерантных, чувствительных и экстремально чувствительных, и увеличение значения экстремально толерантных и толерантных представителей зообентоса. Исключение – слегка разбалансированные сообщества (SD), где на фоне скачка загрязнения происходит рост вкладов экстремально толерантных и, особенно, толерантных организмов, причем в большей степени эти изменения выражены у ценных таксонов.

ET – экстремально толерантные, T – толерантные, MT – умеренно толерантные, S – чувствительные, ES – экстремально чувствительные; BB – биологически сбалансированные, SD, MD, D и HD соответственно слабо и умеренно разбалансированные, разбалансированные и сильно разбалансированные, PC – физически контролируемые

Рисунок 4.4 – Изменение состава сообществ по отношению к загрязнению: сверху – все найденные таксоны, внизу – значительные таксоны, обеспечивающие наибольшее внутригрупповое сходство (по [25])

В этом же ряду наблюдается и изменение состава сообществ по бионтности представителей донной фауны в отношении загрязнения (рисунок 4.5). В BB группе вклад стенобионтов и эври-стенобионтов в сумме примерно равен таковому эврибионтов (все таксоны – 49,8 и 50,2 %), затем он последовательно снижается, а роль эврибионтных животных – возрастает (соответственно до 27,1 и 72,9 % в PC группе). Среди весомых репрезентантов бентоса во всех группах роль стенобионтов и эври-стенобионтов существенно ниже, чем эврибионтов, а снижение их вкладов весьма неравномерно (рисунок 4.4). Следует также отметить все ту же SD группу: по сравнению с первым и третьим типами ассоциаций, доля эврибионтов среди наиболее ценных таксонов у нее заметно больше, процент эври-стенобионтов – минимален среди всех экологических типов, тогда как стенобионтов, наоборот, максимален.

Подобные, хотя и не столь отчетливые, вариации наблюдаются в составе выделенных типов сообществ и по отношению к уровню эвтрофикации (содержанию $C_{орг}$). Толерантные, индифферентные и экстремально чувствительные животные в сумме преобладают во всех группах, а вклад оппортунистов 1 и 2-го порядка становится существенным лишь у физически контролируемых группировок, возрастая до 30,1 %, что

почти в три раза превышает их долю у сильно разбалансированных ассоциаций (все таксоны; рисунок 4.6). В большей степени нарастание роли оппортунистов обоих порядков в ряду BB → PC наблюдается у ценных таксонов: доля таких животных в последней группе превышает 72 % (у типов BB–HD – всего 0,0–22,7 % с «промежуточным выбросом» до 18,5 % у SD группы).

Е – эврибионты, SE – эври-стенобионты, S – стенобионты; BB – биологически сбалансированные, SD, MD, D и HD соответственно слабо и умеренно разбалансированные, разбалансированные и сильно разбалансированные, PC – физически контролируемые

Рисунок 4.5 – Изменение состава сообществ по бионтности таксонов в отношении к загрязнению: вверху – все найденные таксоны, внизу – таксоны, обеспечивающие наибольшее внутригрупповое сходство (по [25])

Таким образом, влияние главных императивных факторов отчетливо проявляется в составе выделенных экологических типов сообществ макрозообентоса. В биологически сбалансированных или почти сбалансированных группировках преобладают стенобионтные и эври-стенобионтные чистолюбивые и умеренно толерантные по отношению к загрязнению представители макрозообентоса, а также животные, экстремально чувствительные и индифферентные к эвтрофикации. В физически контролируемых агломерациях доминируют эврибионтные оппортунисты первого и второго порядков, как в отношении загрязнения, так и содержания органического углерода. В ряду от биологически сбалансированных к физически контролируемым сообществам наблюдается последовательное снижение роли животных, чувствительных к загрязнению и эвтрофикации, и рост вкладов оппортунистических таксонов. Следует подчеркнуть, что

слабо сбалансированные ассоциации (SD) показывают «неожиданно» высокую долю оппортунистических и эврибионтных по отношению к загрязнению таксонов.

OP1 – оппортунисты 1-го порядка, OP2 – оппортунисты 2-го порядка, T – толерантные, IN – индифферентные, ES – экстремально чувствительные; BB – биологически сбалансированные, SD, MD, D и HD соответственно слабо и умеренно разбалансированные, разбалансированные и сильно разбалансированные, PC – физически контролируемые

Рисунок 4.6 – Изменение состава сообществ по отношению к содержанию органического углерода: сверху – все найденные таксоны, внизу – таксоны, обеспечивающие наибольшее внутригрупповое сходство (по [21])

4.3 Изменения общих характеристик обилия и экологических индексов

Использование так называемых экологических индексов – видового богатства Маргалефа, разнообразия Шеннона-Винера, доминирования Симпсона, выравнинности видовых распределений Пиелу и статистики Кларка – для характеристики донного населения водоемов в синэкологических исследованиях является почти обязательным [47–52]. Кроме того, не менее широко распространено и применение интегральных биотических показателей, к которым относятся индексы *AMBI* и *M-AMBI* [22, 27, 28, 29, 51, 52]. К этой же категории параметров следует отнести и разработанный авторами индекс TPF_{bio} , [25, 46]. Естественно, невозможно представить описания сообществ и без общих количественных характеристик обилия – плотности поселения и биомассы.

Все численные показатели выделенных экологических типов сообществ макрозообентоса, как и их состав, в ряду BB → PC заметно варьируют, причем эти изменения значимы с позиций статистики (кроме плотности поселения; результаты теста Крускала-Уоллиса: вероятность справедливости H_0 $p = 0,0000–0,0003$ и $0,1825$; таблица

А.2). Помимо того, в этих изменениях у большинства перечисленных выше параметров, за исключением биомассы и все той же плотности, прослеживаются отчетливые закономерности (рисунок 4.7, 4.8, таблица 4.5). Например, средние значения индексов Маргалефа R и SR отчетливо увеличиваются от биологически сбалансированных или почти сбалансированных к умеренно сбалансированным сообществам, при этом набор таксонов изменяется от умеренно богатого к богатому и очень богатому. Далее эти показатели не менее резко падают, достигая абсолютного минимума у физически контролируемых группировок, фауна которых является умеренно богатой или бедной (соответственно по R и SR).

Как и вариации индексов Маргалефа, изменение индекса Шеннона-Винера H' в ряду $BB \rightarrow PC$ не монотонно: на фоне общего снижения этого показателя, его промежуточный минимум наблюдается у слабо разбалансированных сообществ, хотя с позиции теории информации все группировки первых четырех экологических типов являются разнообразными (рисунок 4.7, таблица 4.5). Сходным образом ведет себя и индекс $M-AMBI$ (рисунок 4.8, таблица 4.5). Сбалансированные сообщества имеют, в среднем, самый высокий экологический статус, затем он несколько уменьшается у слегка разбалансированных группировок, вновь увеличивается у умеренно разбалансированных, а затем последовательно снижается до минимальных величин у физически контролируемых ассоциаций.

Весьма схожи с ними тенденции изменений индекса Пиелу и статистики Кларка, (рисунок 4.7, 4.8, таблица 4.5). Средние значения этих показателей максимальны у биологически сбалансированных группировок (умеренно-выравненные распределения таксонов по рангам и выраженное доминирование относительно крупных животных) и снижаются при переходе к легкому дисбалансу, что особенно заметно у W (умеренно-выравненные распределения и слабое доминирование относительно крупных животных). Далее статистика Кларка существенно возрастает, достигая промежуточного максимума у разбалансированных ассоциаций (выраженное доминирование относительно крупных животных), и вновь падает до минимума у сильно разбалансированных и физически контролируемых сообществ (слабое доминирование), причем их средние величины близки к таковым у группировок, находящихся в состоянии легкого дисбаланса (SD). У индекса Пиелу первое падение затягивается до ассоциаций MD типа, а затем его изменения следуют паттерну статистики Кларка с промежуточным максимумом у объединения D , причем у всех типов сообществ сохраняется умеренно-выравненное распределение таксонов по рангам.

Mean – среднее значение; *SE* – ошибка репрезентативности; BB – биологически сбалансированные, SD, MD, D и HD соответственно слабо и умеренно разбалансированные, разбалансированные и сильно разбалансированные, PC – физически контролируемые

Рисунок 4.7 – Статистические характеристики некоторых биотических параметров в выделенных группах

В отличие от рассмотренных выше показателей, изменения индексов доминирования Симпсона, $AMBI$ и TPF_{bio} в ряду выделенных экологических типов сообществ хотя и не монотонны, но имеют противоположные тенденции (рисунок 4.8, таблица 4.5). В целом, значения этих параметров увеличиваются от биологически сбалансированных группировок к физически контролируемым с промежуточным максимумом у слегка разбалансированных ассоциаций. Наиболее отчетливо такая

тенденция выражена у индексов S_i (BB $\rightarrow$ HD – слабое и умеренное доминирование, PC – отчетливое доминирование) и TPF_{bio} , а у $AMBI$ она «смазана» его близкими средними величинами у слегка разбалансированных, разбалансированных и сильно разбалансированных сообществ (BB $\rightarrow$ HD – слегка нарушенные местообитания, PC – умеренно поврежденные биотопы).

Mean – среднее значение; *SE* – ошибка репрезентативности; BB – биологически сбалансированные, SD, MD, D и HD соответственно слабо и умеренно разбалансированные, разбалансированные и сильно разбалансированные, PC – физически контролируемые

Рисунок 4.8 – Статистические характеристики некоторых биотических параметров в выделенных группах

Таблица 4.5 – Статистические характеристики биотических параметров экологических типов сообществ

Параметр	Типы сообществ						Все сообщества
	BB	SD	MD	D	HD	PC	
Плотность поселения, A (экз./м ²)	1618±191	2348±420	2133±370	1673±267	2720±627	2022±827	1997±163
	182–8975	93–19040	241–10953	36–7173	82–7780	10–19710	10–19710
Биомасса, B (г/м ²)	311,2±72,1	210,5±40,2	281,1±45	314,3±128,8	376,9±115,4	206,5±123,4	276,1±33,8
	4,1–3944	3,4–1987	14,5–1048	1,6–4480	2,8–1901	0,1–2695	0,1–4479
Индекс Маргалефа, R (усл. ед.)	17,8±0,7	19,3±1,3	28,6±1,7	17,5±1,8	16,5±2,4	9,1±1,4	18,8±0,7
	5–33	2–43	15–54	1–41	2–33	1–22	1–54
Индекс Маргалефа, SR (усл. ед.)	2,37±0,08	2,93±0,16	4,58±0,3	2,29±0,22	2,55±0,29	1,02±0,16	2,71±0,10
	0,77–4,06	0,44–5,98	0,00–8,63	0,00–4,64	0,45–4,71	0,00–3,35	0,00–8,63
Индекс Шеннона-Винера, H (бит/особь)	2,82±0,07	2,44±0,11	2,78±0,17	2,53±0,16	1,96±0,25	1,32±0,2	2,47±0,06
	1,56–3,84	0,33–4,15	0,60–4,32	0,00–4,16	0,52–3,2	0,00–3,52	0,00–4,32
Индекс Пиелу, e (усл. ед.)	0,733±0,015	0,630±0,023	0,589±0,035	0,724±0,026	0,555±0,048	0,513±0,054	0,652±0,012
	0,340–0,922	0,083–0,985	0,131–0,902	0,352–1,000	0,169–0,742	0,157–0,945	0,083–1,000
Индекс Симпсона, S_i (усл. ед.)	0,211±0,012	0,316±0,025	0,225±0,031	0,287±0,032	0,364±0,059	0,565±0,05	0,295±0,013
	0,089–0,540	0,079–0,933	0,059–1,000	0,073–1,000	0,138–0,772	0,144–1,000	0,059–1,000
Статистика Кларка, W (усл. ед.)	0,213±0,020	0,072±0,016	0,164±0,025	0,185±0,038	0,059±0,021	0,050±0,036	0,142±0,011
	-0,186–0,511	-0,161–0,669	-0,118–0,472	-0,211–0,889	-0,087–0,173	-0,174–0,374	-0,211–0,889
Индекс $AMBI$ (усл. ед.)	1,93±0,07	2,83±0,13	2,22±0,17	2,76±0,17	2,63±0,23	4,08±0,29	2,58±0,07
	0,23–3,43	0,80–5,9	0,36–4,18	0,94–4,71	0,22–4,31	1,61–6,00	0,22–6,00
Индекс $M-AMBI$ (усл. ед.)	0,701±0,013	0,592±0,018	0,676±0,021	0,620±0,029	0,552±0,036	0,298±0,036	0,609±0,011
	0,453–1,000	0,132–0,833	0,414–0,916	0,117–0,863	0,314–0,83	0,000–0,828	0,000–1,000
Индекс TPF_{bio} (усл. ед.)	2,21±0,04	2,73±0,03	2,38±0,09	2,70±0,08	2,98±0,07	3,75±0,12	2,64±0,04
	1,20–2,95	2,28–3,57	1,65–3,38	1,2–4,34	2,59–3,4	2,64–4,34	1,20–4,34

Примечание. Экологические типы сообществ: BB – биологически сбалансированные или почти сбалансированные, SD, MD, D и HD соответственно слабо и умеренно разбалансированные, разбалансированные и сильно разбалансированные, PC – физически контролируемые.

Как уже было отмечено, в изменениях количественных характеристик обилия – плотности поселения и биомассы – какие-либо отчетливые тенденции в ряду ВВ → РС отсутствуют (рисунок 4.7). Минимальная средняя плотность отмечена у разбалансированных группировок, максимальная – у сильно разбалансированных сообществ; наименьшая биомасса наблюдалась у SD и РС ассоциаций, наибольшая – в группе HD. Следует подчеркнуть, что диапазоны изменения всех биотических параметров у всех экологических типов сообществ чрезвычайно широки и сильно перекрывают друг друга (таблица 4.5). Кроме того, биологические характеристики подвержены влиянию множества факторов среды, о чем свидетельствуют коэффициенты ранговой корреляции Спирмена, которые хотя и не велики в большинстве случаев, но значимы с позиций статистики (таблица 4.6).

Таблица 4.6 – Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена параметров среды и биотических характеристик

Параметры среды	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>R</i>	<i>SR</i>	<i>H</i>	<i>e</i>	<i>Si</i>	<i>W</i>	<i>AMBI</i>	<i>M-AMBI</i>	<i>TPF_{bio}</i>
<i>Dpth</i>	0,273	0,166	0,357	0,305	0,293	0,063	-0,229	-0,036	-0,129	0,313	-0,044
<i>C_{орг}</i>	-0,018	-0,099	-0,120	-0,172	-0,208	-0,170	0,275	-0,166	0,400	-0,393	0,480
<i>TPF</i>	0,108	-0,047	-0,056	-0,106	-0,148	-0,232	0,318	-0,352	0,574	-0,343	0,802
<i>Al</i>	-0,080	-0,101	-0,113	-0,064	-0,220	-0,158	0,185	-0,128	0,245	-0,294	0,336
<i>Pl</i>	0,054	0,007	-0,132	-0,116	-0,267	-0,284	0,264	-0,175	0,313	-0,352	0,324
<i>AP</i>	0,017	0,008	-0,257	-0,201	-0,225	-0,140	0,260	-0,136	0,363	-0,357	0,376
<i>Psa</i>	-0,031	-0,012	0,245	0,191	0,219	0,153	-0,272	0,153	-0,401	0,369	-0,431
<i>Pse</i>	-0,095	-0,118	-0,076	-0,184	0,010	0,138	-0,044	0,141	-0,089	0,052	-0,091
<i>MEAN</i>	-0,052	-0,120	0,063	0,302	0,067	0,117	-0,147	-0,014	-0,128	0,135	-0,208
<i>SD</i>	0,061	-0,025	0,190	0,410	0,019	-0,145	-0,043	-0,181	0,000	0,073	0,021
<i>SKEW</i>	-0,049	0,012	0,052	-0,082	0,109	0,130	-0,130	0,141	-0,266	0,172	-0,284
<i>KURT</i>	-0,008	0,075	0,188	0,046	0,113	0,025	-0,134	0,150	-0,307	0,197	-0,293
<i>H_r</i>	0,097	-0,029	-0,058	0,020	-0,065	-0,029	0,145	-0,176	0,407	-0,190	0,515

Примечание. Жирным шрифтом выделены статистически значимые коэффициенты ($p < 0,05$); обозначения параметров среды и характеристик биоты см. «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ».

В целом, эффекты глубины и различных характеристик гранулометрического состава на биотические параметры демонстрируют закономерности, стандартные для морского макрозообентоса [46]. Например, «глубоководное» донное население разнообразнее и богаче видами, чем «мелководное»: одни из самых высоких средних значений индекса Шеннона-Винера и максимальные – индексов Маргалефа приурочены к наиболее глубоководным сообществам (группа MD). Наибольшее богатство и разнообразие отмечено на максимально разнообразных – смешанных – грунтах, что связано с увеличением количества биотопов, пригодных для поселения донных животных.

Наоборот, степень доминирования (индекс Симпсона) для таких осадков невелика. Эти эффекты, в той или иной степени, нивелируют действие роста уровня загрязнения и эвтрофикации в ряду выделенных типов сообществ. В результате, разбалансированные и сильно разбалансированные сообщества (D и HD типов) остаются довольно разнообразными и богатыми видами (рисунок 4.6, 4.7, таблица 4.5). Следует подчеркнуть, что воздействия глубины и типа осадков, на фоне роста загрязнения и эвтрофикации, отчетливо проявляются и у других количественных характеристик – плотности, биомассы, индексов Пиелу, *AMBI*, *M-AMBI*, статистики Кларка, TPF_{bio} [46].

Итак, как и для таксономического состава, влияние главных императивных факторов отчетливо проявляется и в изменчивости большинства количественных характеристик выделенных экологических типов сообществ макрозообентоса, за исключением плотности поселения и биомассы. В целом, эти эффекты выражаются в нарушении общих тенденций изменения различных экологических индексов (их снижения или увеличения), а также нивелировании действия роста уровня загрязнения и эвтрофикации. Следует также подчеркнуть, что в наибольшей степени эти нарушения проявляются у слегка разбалансированных сообществ (SD тип), которые имеют весьма низкие величины статистики Кларка, а также неоправданные, по сравнению с ассоциациями «соседних» экологических типов, повышения или понижения большинства других параметров.

4.4 Причины смены экологического типа сообществ

Как было показано в разделе 4.1, сообщества макрозообентоса, локализованные на одних и тех же или сходных акваториях, обследованных в разные годы, довольно часто попадают в разные экологические типы, в соответствие с величинами $ПЭС_{амх}$ и MEV . Очевидно, судя по частоте таких переходов, они не являются чем-то необычным, а причинами таких вариаций могут быть, прежде всего, изменения экологической ситуации и их частота, причем немаловажным будет и «эффективная сила» этих трансформаций, т.е. превышение неких пороговых или критических значений. В полной мере в этом отношении в заливе Петра Великого проанализирован лишь общий уровень химического загрязнения морской среды (TPF_{chem} , 1982–2018 гг., станции ОГСН: [4, 42–44]). Пороговыми или критическими значениями для TPF_{chem} являются величины ERL_q и ERM_q ($TPF = 2,8$ и $3,2$), которые ограничивают область прогрессивной деградации — почти линейного падения индекса Шеннона-Винера для двустворчатых моллюсков (H_b') [40, 41].

В 1982–2018 гг. в течение большей части исследованного промежутка времени общий уровень загрязнения TPF_{chem} на станциях открытых районов Амурского и

Уссурийского заливов и, отчасти, их внутренних акваторий, был ниже ERL_q , а в бухтах Золотой Рог и Диомид – выше ERM_q . Доля превышений индексом TPF_{chem} порога ERL_q в первом случае составляла 3–10 %, а превышений ERM_q во втором – 92–94 %. В проливе Босфор Восточный, а также в западном и восточном побережье южной части полуострова Муравьева-Амурского доля превышений ERL_q составила 68,2 %, а ERM_q – 38,5 % (рисунок 4.9, 4.10). В целом продолжительность негативного воздействия химического загрязнения (превышение пороговой величины ERL_q и переход бентосного населения в стадию прогрессивной деградации) в бухте Золотой Рог составляет не менее 40 лет и резко снижается до 2–3 лет в открытых районах Амурского и до нуля – Уссурийского заливов. Необходимо подчеркнуть, что уровень химического загрязнения осадков в бухте Золотой Рог и проливе Босфор Восточный менее изменчив, чем на более открытых акваториях Амурского и Уссурийского заливов (рисунок 4.9).

Таким образом, основываясь на динамике лишь одного императивного фактора – общего уровня химического загрязнения осадков, сообщества макрозообентоса всех прибрежных акваторий Владивостока, за исключением бухт Золотой Рог и Диомид, просто «обязаны» переходить из одного экологического типа в другой. На открытых акваториях такие трансформация должны быть редки, а в проливе Босфор Восточный, в западном и восточном побережье южной части полуострова Муравьева-Амурского, наоборот, чуть ли не ежегодными. Последнее подтверждается результатами наших наблюдений 2016, 2018 и 2019 гг., а также данными 2021 и 2022 гг., находящимися на стадии обработки. К сожалению, ежегодные наблюдения над макрозообентосом были прерваны в конце 80-х годов прошлого столетия, и возобновлены лишь в 2018 г., что не дает возможности исследовать весь спектр изменений группировок донных животных статистическими методами.

В проливе Босфор Восточный обитает сообщество, практически не имеющее постоянного состава доминантных (титulyных) видов, среди которых облигатным является только толерантная по отношению к загрязнению оппортунистическая (второго порядка) полихета *L. longifolia*. В 2001 и 2016 гг. пролив заселяли сильно разбалансированные (тип HD) сообщества *P. argentata* + *Macoma* sp. и *O. sarsii* + *M. scarlatoi*, в 2007 г. – разбалансированная группировка *D. cardalia* (D), в 2019 г. – слабо и умеренно разбалансированные ассоциации "*L. longifolia*" + *O. sarsii* и "*L. longifolia*" + *M. scarlatoi* (SD и MD). Большинство из перечисленных титульных видов являются эврибионтами, а их отношение к уровню загрязнения обычно не ниже толерантного (кроме *O. sarsii*). Показатель экологического стресса этих сообществ заметно меняется из года в год, отражая их в той или иной степени разбалансированное состояние. При этом развитие той или иной группировки, судя по изменению комплекса

факторов, «провоцируется» изменениями в эвтрофикации (содержании $C_{орг}$), а увеличение уровня загрязнения ответственно за добавление к доминантам видов-оппортунистов первого порядка – *A. pacifica*, *Sch. japonica*, – других многощетинковых червей – *N. latericeus* – и иных животных сходной экологической валентности [25].

Рисунок 4.9 – Суммарная продолжительность вредного и экстремального воздействия ($TPF_{chem} > ERL_q$ и ERM_q , соответственно) и изменчивость индекса TPF_{chem} на прибрежной акватории залива Петра Великого (по [43])

1 и 2 – соответственно открытые и внутренние районы Амурского и Уссурийского заливов, 3 – пролив Босфор Восточный и побережье южной части полуострова Муравьева-Амурского, 4 и 5 – бухты Золотой Рог и Диомид; ось абсцисс – годы, ось ординат – значения индекса; планки погрешностей – ошибка репрезентативности

Рисунок 4.10 – Динамика индекса *TPF* в разных районах прибрежной акватории Владивостока (по [43])

В этом отношении интересно массовое развитие *S. armiger*, отмеченное на этой акватории в 2016 и 2019 гг., в период наибольшей эвтрофикации, который был малозаметен в начале тысячелетия. Этот вид дает вспышки плотности при умеренном повышении содержания $C_{орг}$, но по отношению к загрязнению относится к умеренно-толерантным эврибионтным организмам. Вспышка численности другого массового вида – *O. sarsii*, такого же, как и *S. armiger*, по отношению к загрязнению, но индифферентного в отношении $C_{орг}$ – наблюдалась в 2016 г., но к 2019 г. его обилие снизилось в разы, и он исчез из группы видов, доминантных по плотности. Судя по всему, изменения обилия перечисленных и многих других видов демонстрируют так называемые волны жизни – периодические или непериодические колебания численности организмов в природных популяциях, причиной которых являются, главным образом, изменения факторов среды, в данном случае — загрязнения и эвтрофикации.

Другим «поводом» смены экологического типа сообществами пролива могли послужить случаи низкого и экстремально низкого содержания кислорода в придонном слое воды в периоды, предшествующие съемкам. Такие события происходят здесь регулярно, скорее всего, в результате отсутствия вертикального перемешивания, при наличии ярко выраженного сезонного термоклина [53]. В срединной части этой акватории они наблюдались подряд в течение 3 лет в июле и августе 1999–2001 гг. (в 2001 г. – за 2 недели перед отбором проб). В 2006 г. летний недостаток O_2 не был столь суров, как и в

2014–2016 гг., хотя в период с лета 2007 по 2013 г. такие явления происходили неоднократно. В целом концентрации O_2 в исследованный период падали даже ниже 2 мл/л (в августе 2001 и 2007 гг. — соответственно 1,96 и 1,88 мл/л). Пороговая концентрация, ниже которой наступает гипоксия, по мнению Р. Диаса и Р. Розенберга [54], составляет именно 2 мл/л. Подобные изменения кислородного режима отмечены и в других частях пролива Босфор Восточный.

Следует подчеркнуть, что низкое содержание O_2 в летние месяцы может быть и результатом микробиологического окисления избыточной биомассы диатомовых водорослей в условиях слабой динамики вод и при низкой интенсивности фотосинтетически активной радиации [55]. В пользу этого предположения свидетельствует синхронность изменений в концентрациях кислорода и рН (снижение концентрации O_2 почти облигатно сопровождается уменьшением рН, $r = 0,746-0,756$, $p = 0,000$; [45]) и менее синхронный, но все же заметный рост концентраций биогенных элементов – фосфатов, силикатов, аммония (неопубликованные данные). Такие явления характерны практически для всей исследованной акватории, но особенно выражены у западного побережья полуострова Муравьева-Амурского.

Заселение освободившегося субстрата после гипоксии, очевидно, происходит теми животными, личинки которых в этот период могли случайно находиться в планктоне и были готовы к оседанию. Известно, что виды-оппортунисты, такие как *A. pacifica*, *D. cardalia*, *Sch. japonica*, дают в течение года несколько генераций личинок и, следовательно, появление этих полихет, причем в большом количестве, вполне закономерно. Это должно приводить к уменьшению средних значений статистики Кларка, т.е. увеличению роли относительно мелких животных, что отчетливо проявляется у слабо разбалансированных группировок (SD типа). В дальнейшем при сохранении относительно благоприятных условий сообщество восстанавливается (в проливе Босфор Восточный это появление *O. sarsii*, обогащение фауны полихет, например, за счет *S. armiger* и, в целом, снижение вклада *r*-стратегов*, усиление роли моллюсков). Доминирование среди последних *E. tenuis* (2006 г.) и *M. scarlatoi* (2016 и 2019 гг.) опять-таки представляется результатом случайных процессов или волн жизни, а также их бионтности и заметной устойчивости к загрязнению и эвтрофикации. Первый вид является эврибионтным представителем бентоса, толерантным к загрязнению и индифферентным по отношению к концентрации $C_{орг}$, второй – стено-эврибионтом, который экстремально толерантен к контаминации и толерантен к эвтрофикации.

Представляется, что слабо разбалансированные сообщества (экологический тип

*Плодовитые мелкие животные с коротким периодом жизни.

SD), учитывая приведённые факты, развиваются в результате экстремального, но относительно кратковременного, воздействия одного из императивных для данной акватории факторов, на фоне неблагоприятной, в целом, экологической ситуации (загрязнение, эвтрофикация). Для прибрежной акватории Владивостока наиболее «подозрительной» в этом отношении является именно концентрация растворенного кислорода в придонном слое воды. Как было показано в разделах 4.2 и 4.3, характерными чертами этих ассоциаций является высокая доля оппортунистических и эврибионтных по отношению к загрязнению и эвтрофикации таксонов, а также весьма низкие величины статистики Кларка. Эти особенности позволяют сформулировать следующее правило для дифференциации таких агломераций*: если при низких значениях $ПЭС_{атх}$ в составе группировки «неожиданно» возрастает доля видов-оппортунистов и относительно мелких представителей макрозообентоса, то данное сообщество явно относится к слабо разбалансированным, а не к биологически сбалансированным ассоциациям.

Причины этого отнюдь «нелегкого» дисбаланса, можно выяснить на основе информации о различных факторах среды и их пространственном распределении, а также при помощи других биотических индексов. Отчетливые следы некоего экстремального воздействия демонстрируют четыре из пяти сообществ этого экологического типа. У группировок "*L. longifolia*" + *S. bassi*, "*L. longifolia*", *O. sarsii* + *A. insignis*, "*L. longifolia*" + *O. sarsii* средние величины статистики Кларка составляют соответственно $0,040 \pm 0,032$, $0,069 \pm 0,029$, $0,082 \pm 0,022$ и $0,040 \pm 0,026$, да и у пятой ассоциации *S. armiger* + *O. sarsii* ее значения в целом невелики ($0,145 \pm 0,056$) [9]. Так или иначе, эти группировки следует рассматривать скорее не как слабо разбалансированные, а как в той или иной степени поврежденные или разрушенные, а место их обитания – как нестабильное.

Появление и развитие в исследованном районе областей пониженного содержания растворенного кислорода непосредственно связано с интенсивностью терригенного стока, обогащающего морские воды биогенными элементами и, кроме того, снижающего концентрации меди, свинца (эффект разбавления [56]) и общий уровень загрязнения осадков, что улучшает экологическую ситуацию [44]. В то же время, этот приток ведет, в конечном итоге, к увеличению содержания фенолов, поступающих на дно, по всей видимости, в основном из-за разложения микроводорослей [42–44]. Содержание фенолов тесно коррелирует с концентрацией органического углерода и, очевидно, отражает

*Самым надежным способом является, несомненно, определение, наряду с $ПЭС$, средней объясненной дисперсии количественных характеристик бентоса (см. таблицу 4.2), однако такой анализ весьма трудоемок и требует наличия специализированных данных, которые обычно не доступны широкому кругу исследователей.

эвтрофирование морской среды [43], которое, наоборот, снижает качество морской среды, по крайней мере, в соответствии с взглядами авторов индекса *AMBI*.

Другой негативный эффект связан с потоком тонкодисперсной взвеси, которая засоряет фильтрующие аппараты, затрудняя питание, дыхание и другие процессы метаболизма, а то и просто засыпает донных животных. Так, в период паводка в 2018 г. (середина августа) слой наилка достигал 7–8 мм, причем на весьма значительных расстояниях от устьев основных водотоков, впадающих в заливы Амурский и Уссурийский. Кроме того, следует ожидать усиление процессов «разбавления» и эвтрофикации, учитывая увеличение интенсивности речного стока с начала миллениума (рисунок 4.11). Таким образом, в отличие от загрязнения и снижения концентрации растворенного кислорода, терригенный сток (MeF_2) может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на экологическое состояние среды обитания донного населения. Все эти эффекты, прежде всего, проявляются вблизи главных его источников – на акваториях кутовых частей Амурского и Уссурийского заливов.

Рисунок 4.11 – Динамика среднегодового расхода воды (m^3/c) в реке Раздольной в 1982–2017 гг.: 1 — линейный тренд для расходов 2003–2017 гг. ($r = 0,69$, $p = 0,005$) по [44]

Изменения сообществ макрозообентоса, формирующихся в этих районах, по масштабу сопоставимы с таковыми пролива Босфор Восточный. В период с 1989 по 2018 гг. на повторяющихся станциях в северных частях Амурского и Уссурийского заливов (последняя акватория – 2001, 2016 и 2018 гг.) дифференцировались по одной-двум группировкам донных животных [9, 57, 58]. На пике загрязнения 1989 г. (см. рисунок 4.9) в северной и северо-западной областях Амурского залива обитало сообщество *M. sarsi* + "*L. longifolia*" + *A. pacifica* (D ; $ПЭС_{амх} = 21,9\%$)*. В 2001 г. его

*Значения $ПЭС$ для сообществ, найденных в 1989 г., в основных построениях не использовались из-за невозможности определения MEV .

сменила группировка "*L. longifolia*" + *S. bassi*, в 2005 – "*L. longifolia*", в 2016 – *M. sarsi*, в 2018 – снова "*L. longifolia*" (соответственно SD, SD, PC и HD). Интересно, что по сравнению с 2014 г., в 2015 и 2016 гг., т.е. непосредственно перед отбором проб, произошло более чем двукратное увеличение расходов воды реки Раздольной (рисунок 4.11).

Не менее вариабельной в эти годы была и вторая группировка, локализованная в центральной и южной части северной акватории Амурского залива: *A. pacifica* + *Ph. harmeri* (D, 1989 г.; $ПЭС_{амх} = 21,2\%*$) → "*L. longifolia*" + *S. bassi* (SD, 2001 г.)^{*} → *A. pacifica* + *P. harmeri* (D, 2005 г.) → *Ph. harmeri* (HD, 2016 г.) → *A. pacifica* + *D. cardalia* (тип не определен из-за малого числа станций, 2018 г.). Следует подчеркнуть, что и в 2018 г. *Ph. harmeri*, доминируя по биомассе и формируя поселения крайне высокой плотности, входил в число видов, наиболее ценных для внутрigrуппового сходства этой группировки. В 2001 г. на станциях, на которых эта ассоциация фиксировалась в другие годы, его вклад был малозаметен, тогда как *D. cardalia* и, в первую очередь, *A. pacifica*, наоборот, были весьма многочисленны. Следует подчеркнуть, что смена типа группировками макрозообентоса не ограничена районами высокого экологического «напряжения». Даже сообщества наименее загрязненных и эвтрофированных районов – открытых акваторий Амурского и Уссурийского заливов – в период наблюдений не раз совершали такие переходы, хотя и не в столь существенных масштабах (2001–2016–2018 гг.: MD и SD → BB → SD; см. таблица 4.3).

Итак, переходы группировок донной фауны из одного в другой экологический тип, причем происходящие как с увеличением степени дисбаланса, так и с ее уменьшением, свидетельствует, во-первых, о выраженной динамике сообществ макрозообентоса и, во-вторых, о принципиальной возможности восстановления донной фауны даже после самого сурового внешнего воздействия. Частое изменения уровня загрязнения и эвтрофикации, падение содержания O_2 ниже критического и, вероятно, другие пертурбации, предполагающие появление «новых» видов, не дают сообществам перейти в климаксное или близкое к таковому состояние. Это происходит из-за того, что переходы из одного состояния в другое и короткие периоды покоя не позволяют установиться связям внутри группировок, а самим видам выстроиться вдоль градиентов императивных факторов.

*Как отдельная синэкологическая единица группировка западного побережья полуострова Муравьева-Амурского и южной центральной части кута Амурского залива в 2001 г. не была выявлена.

5 Метод оценки экологического состояния донного населения и особенности его применения

Основой предлагаемого метода оценки состояния морской среды является шкала или номограмма для определения статуса сообществ макрозообентоса на основе показателя экологического стресса (рисунок 5.1). Эта шкала базируется на математической модели перехода группировок донных животных от «биологически сбалансированного» через «разбалансированное» к «физически контролируемому» состоянию. Поскольку статус донного населения отражает условия среды в местах его обитания, биотопы экологических типов сообществ варьируют, соответственно, от неповрежденных до экстремально поврежденных, по аналогии с классификацией, основанной на индексе *AMBI* (таблица 5.1). Слегка разбалансированные группировки, учитывая результаты анализа их состава и изменчивости биотических параметров, следует рассматривать как поврежденные или разрушенные в результате кратковременного экстремального воздействия одного из императивных факторов, а состояние морской среды – как нестабильное.

I и II – критические уровни ($ПЭС_{амх} = 15$ и 36 %, *CERL* и *CERM*)

Рисунок 5.1 – Шкала для определения состояния сообществ макрозообентоса на основе показателя экологического стресса

Значения показателя экологического стресса в 15 и 36 % являются граничными критериями или критическими уровнями состояния сообществ макрозообентоса (степени повреждения местообитания или состояния среды). Первый следует считать «заданным

значением» (target value, *CERL*), то есть уровнем, к которому необходимо стремиться, чтобы восстановить функциональные свойства донных отложений для жизни животных, второй – «значением коррекции» (intervention value, *CERM*) – уровнем, когда такие свойства сильно снижены, представляют опасность и требуют вмешательства со стороны человека. Предлагаемый метод универсален и может быть применен для оценки состояния среды на любой морской акватории*.

Таблица 5.1 – Экологические типы сообществ макрозообентоса и степень нарушения их местообитаний

<i>ПЭС_{амх}</i>, % (<i>MEV</i>, %)	Экологические типы сообществ	Биотоп (местообитание)
≤ 15 (< 70 %)	Биологически сбалансированные или почти сбалансированные	Неповрежденный
≤ 15 (77–87 %)	Разрушенные	Нестабильный
15,1–17,7 (83–89 %)	Умеренно разбалансированные	Умеренно поврежденный
17,8–22,0 (86–91 %)	Разбалансированные	Поврежденный
22,1–35,0 (92–96 %)	Сильно разбалансированные	Сильно поврежденный
>35,0 (95–98 %)	Физически контролируемые	Экстремально поврежденный

Кроме того, этот метод существенно сокращает время, необходимое для получения результатов оценки состояния морской среды. При определении большинства гидробиологических показателей основные временные затраты приходятся на таксономический анализ – идентификацию найденных животных до как можно более низкого, желательно видового, уровня (например, для вычисления индексов *АМВІ*, *М-АМВІ*, *ТРР_{био}*), что занимает несколько недель, а то и месяцев. Для определения *ПЭС_{амх}* в этом нет необходимости: достаточно иметь список таксонов с количественными характеристиками, где одни и те же систематические единицы имеют сквозные обозначения, например, нумерацию.

Определение *ПЭС_{амх}* осуществляется в несколько этапов. На первом из них выполняется планирование расположения станций на исследуемой акватории, на втором – производится обработка проб для составления списка таксонов с количественными характеристиками, на третьем – полученные данные подвергаются статистической обработке с целью выделения сообществ макрозообентоса и на четвертом –

*Перед применением этого метода авторы все же рекомендуют получить математические модели перехода группировок донных животных от «биологически сбалансированного» к «физически контролируемому» состоянию для конкретных акваторий, где осуществляется мониторинг; последовательность выполнения этой задачи и математический аппарат подробно описаны в [9, 13].

заключительном – происходит вычисление искомого показателя. Некоторые из этих этапов требуют дополнительных пояснений.

Планирование расположения станций отбора проб должно быть нацелено, в конечном итоге, на получение данных, пригодных для вычисления показателя экологического стресса. В идеальном варианте для каждого сообщества необходимо иметь не менее семи точек с количественными характеристиками бентоса, что многократно снижает вероятность случайного завышения ПЭС [9, 10], но в реальных условиях иногда оказывается недостижимым. Подстраховкой может служить дублирование проб, отбираемых на станции, хотя, опять-таки идеальным, было бы выполнение предварительных исследований для определения числа повторов, необходимых хотя бы для 50 % «покрытия» общего видового списка (анализ кривых накопления видов, см. [46]). Выбор расположения точек опробования существенно упрощается информацией о рельефе дна, фракционном составе осадков, гидрологическом режиме. Если таких данных нет, отбор проб следует производить вдоль разрезов, направленных от берега в сторону открытого моря, а еще лучше – в шахматном или близком к таковому порядке (рисунок 5.2).

1 и 2 – реальные и дополнительные станции, 3 – разрезы

Рисунок 5.2 – Схема расположения бентосных станций и разрезов на притуманганской акватории в 1996 г. (1 и 3), которая в 1997 г., при отборе проб для построения карты грунтов и рельефа дна, была дополнена вспомогательными точками опробования (2)

Для выделения сообществ макрозообентоса следует использовать специально созданный алгоритм, представляющий собой последовательность процедур и тестов, необходимых и достаточных для оперативного выявления таких агломераций и основных факторов среды, ведущих к их дифференциации. Этот алгоритм размещен на сайте ДВНИГМИ и опубликован в открытой печати [9, 10]. Следует подчеркнуть

необходимость осторожности и внимательности при выполнении различных процедур и тестов и последующей формулировки выводов, а также важность последовательного, шаг за шагом, выполнения всех операций, скомпилированных в алгоритме.

Для удобства и упрощения вычисления показателя экологического стресса, в формате Excel создается файл, фрагменты которого для одного из сообществ представлены на рисунке 5.3. Здесь в колонке «A or B» приведены значения группирующей переменной (1 – плотность поселения, 2 – биомасса), в колонках «Total_A_B» и «Total_B_A» – суммарные для станции (пробы) плотности и биомассы. Файл открывается (импортируется) в ППП STATISTICA, в опции «Анализ» выбирается подопция «Основные статистики и таблицы» и далее «Парные и частные корреляции», где и вычисляются две прямоугольные матрицы корреляций с предварительной группировкой по переменной «A or B». Далее они копируются в буфер обмена (с заголовками), переносятся на лист Excel, где сортируются по одной из колонок с возрастанием значений коэффициентов корреляции. Систематические единицы с $r \approx 0,7$ (с округлением) и более подсчитываются, и вычисляется их доля от общего числа найденных в сообществе таксонов (всего четыре колонки и, соответственно, четыре ПЭС – aa , bb , ab и ba – из которых и выбирается искомое максимальное значение).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	BR	BS	BT
1	Point	A or B	Actinia	Alveinus ojanus	Amphipoda	Aphelochae- ta pacifica	Aphrodi- tidae	Asabelli- des sibirica	Asterias amurensis	Axinopsida subquadrata	Callithaca adamsi	Capitella capitata	Yoldia sp.	Total_A _B	Total_B _A
2	8	1	0	0	0	5	20	0	0	0	0	5	0	305	1,2
3	9	1	5	20	0	10	25	0	0	0	0	50	0	1025	20,4
4	16	1	0	0	20	6255	0	0	0	0	5	120	0	11165	60,1
5	24	1	50	0	0	840	0	0	0	30	0	150	0	3010	117,1
6	55	1	0	0	0	8100	0	0	0	150	0	420	50	10320	75,7
7	57	1	0	0	0	4770	0	0	0	170	0	0	0	10660	40,2
8	59	1	0	0	0	2430	0	0	0	0	0	10	80	3020	23,6
9	61	1	80	0	0	4320	0	90	30	0	0	70	0	9930	141,9
10	8	2	0,00	0	0,00	0,04	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	1,2	305
11	9	2	0,04	0,02	0,00	0,11	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	20,4	1025
12	16	2	0,00	0	0,05	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,00	60,1	11165
13	24	2	5,45	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	1,20	0,00	117,1	3010
14	55	2	0,00	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,55	0,10	75,7	10320
15	57	2	0,00	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	40,2	10660
16	59	2	0,00	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00	23,6	3020
17	61	2	6,50	0	0,00	16,25	0,00	0,04	0,03	0,00	0,00	0,51	0,00	141,9	9930

Рисунок 5.3 – Фрагменты листа Excel с данными, подготовленными для вычисления ПЭС (пояснение в тексте)

Основным недостатком предлагаемого метода является определение ПЭС_{амх} для некой целой акватории, а не для каждой станции, как при использовании биотических индексов АМВИ, М-АМВИ, ТРФ_{био}. Это затрудняет, а возможно и искажает реальную картину состояния среды при картографическом отображении полученных результатов, что можно проиллюстрировать следующим примером (рисунок 5.4). «Не поврежденность» биотопов на станциях вдоль восточного побережья полуострова Муравьева-Амурского вызывает сомнение и противоречит результатам определения уровня химического загрязнения донных отложений, полученным на основе индексов ТРФ_{chem} и ТРФ_{био}.

17–21 – сообщества макрозообентоса (см. таблица 4.3), I и II критические уровни ($CERL$ и $CERM$)

Рисунок 5.4 – Распределение показателя экологического стресса, индексов $AMBI$, $M-AMBI$, TPF_{chem} (последний показатель откорректирован по TPF_{bio}) на прибрежной акватории Владивостока в 2016 г.

В то же время, лишь индекс $M-AMBI$ до некоторой степени отражает снижение экологического статуса зообентоса и соответствующего ухудшения состояния среды в северных частях Амурского и Уссурийского заливов из-за действия терригенного стока, тогда как наиболее отчетливо это ухудшение показывает именно распределение $ПЭС_{атх}$ (рисунок 5.4, рисунок 5.5).

Рисунок 5.5 – Распределения значений фактора MeF_2 , маркирующего терригенный сток в разные годы, по: [42, 59]

Наиболее вероятное объяснение этих несоответствий заключается в том, что для выведения сообщества из равновесия (из биологически сбалансированного или почти такого состояния) требуется действие всего комплекса выделенных императивных факторов – загрязнения, эвтрофикации, терригенного стока и содержания растворенного кислорода. Распределение концентраций последнего представлено на рисунке 5.6 и не требует дополнительных пояснений. Так или иначе, условия среды в восточном побережье полуострова Муравьева-Амурского, по всем показателям, кроме уровня химического загрязнения донных отложений, явно лучше, чем в Амурском заливе в

целом, не говоря уже об его отдельных участках, а также о проливе Босфор Восточный и самым внутренним акваториям порта Владивосток. Ниже представлен еще один пример применения предлагаемого метода.

Рисунок 5.6. Комбинированное распределение концентрации кислорода ($\mu\text{моль/кг}$) в придонных водах залива Петра Великого в летний сезон (вверху, по [60]) и в 2016 г. (мл/л). Красным отмечено пороговое значение гипоксии ($76 \mu\text{моль/кг}$ 2 мл/л)

В архиве авторов имеются данные по макрозообентосу ряда прибрежных полигонов (80–90-е годы прошлого века), на которых была детально изучена придонная физическая среда обитания гидробионтов – физико-механические свойства донных отложений, сила и структура водообменных процессов, осаждение-взмучивание взвешенного материала и осадка. В то же время, измерений содержания химических элементов и соединений, за исключением концентраций органического углерода, не производили. Таким полигоном является и бухта Западная (остров Фуругельма). К сожалению, из количественных характеристик таксонов макрозообентоса сохранились лишь их биомассы.

Вдоль разреза в бухте Западной обнаружено 155 видов и таксонов более высокого ранга макрозообентоса, а станции, на которых они были найдены, при использовании процедуры НМ-классификации, группируются в четыре кластера, имеющие уровень внутригруппового сходства 39,5–61,5 % (рисунок 5.7, таблица 5.2, 5.3):

I – Станции от начала трансекты до ее 70 м включительно;

II – Пункты опробования с 75 по 120 м, а также точки, находящиеся в 180–195 и 250 м от берега;

III – Места взятия проб, локализованные на дистанции 125–175 м от уреза воды;

IV – Точки, расположенные на расстоянии от берега с 200 по 245 м и с 255 м до окончания разреза (280 м).

Такое разбиение подтверждается результатами процедуры ANOSIM (глобальная статистика $R = 0,828$, вероятность справедливости H_0 $p = 0,001$). Включение в кластер II станций, расположенных в 185–195 и 250 м и которые должны были бы войти в группу IV, обусловлено, скорее всего, выходами скального грунта и соответствующих изменений донной фауны вокруг этих образований. Полный состав и количественные характеристики найденных животных приведены в приложении (таблица А.3).

Римскими числами обозначены выделенные группы станций; R – частные значения статистики, p – вероятность справедливости H_0 – агломерация отсутствует

Рисунок 5.7 – Нечеткая классификации сообществ макрозообентоса в бухте Западная (остров Фуругельма) и частные результаты процедуры ANOSIM; компоненты объясняют 41,7 % дисперсии точек; глобальная статистика $R = 0,828$, $p = 0,001$

Основной вклад во внутригрупповое сходство станций группы I вносят двустворчатые моллюски *Spisula sachalinensis* и *Mactra chinensis* (таблица 5.3). В группе II лидируют бивалвия *Callista brevisiphonata*, сердцевидный морской еж *Echinocardium cordatum* и морская звезда *Asterina pectinifera*. В группе III первые два места занимают все те же *C. brevisiphonata* и *E. cordatum*, а на третье место выходит другой двустворчатый моллюск *Spisula voyi*, который в предыдущей группировке не попадал даже в десятку наиболее ценных видов. В группе IV абсолютными лидерами по вкладам являются *C. brevisiphonata* и *A. pectinifera*. Естественно, одной только биомассы недостаточно для определения наиболее значимых видов и, соответственно, наименования сообществ, поэтому, для упрощения изложения далее используются порядковые номера выделенных групп (I–IV).

Таблица 5.2 – Результаты нечеткой классификации станций в бухте Западная (остров Фуругельма) по видовому составу в макрозообентоса – степень принадлежности станций к выделенным кластерам (экспоненциальный вес — 1,3)

Станция	Кластер			
	I	II	III	IV
<i>F35</i>	1,000	0,000	0,000	0,000
<i>F45</i>	1,000	0,000	0,000	0,000
<i>F40</i>	1,000	0,000	0,000	0,000
<i>F30</i>	1,000	0,000	0,000	0,000
<i>F20</i>	1,000	0,000	0,000	0,000
<i>F25</i>	1,000	0,000	0,000	0,000
<i>F60</i>	1,000	0,000	0,000	0,000
<i>F65</i>	0,999	0,000	0,000	0,000
<i>F50</i>	0,999	0,001	0,000	0,000
<i>F15</i>	0,999	0,001	0,000	0,000
<i>F55</i>	0,999	0,001	0,000	0,000
<i>F70</i>	0,956	0,043	0,000	0,001
<i>F105</i>	0,001	0,993	0,003	0,003
<i>F100</i>	0,000	0,990	0,008	0,002
<i>F90</i>	0,003	0,989	0,005	0,003
<i>F110</i>	0,000	0,987	0,009	0,003
<i>F95</i>	0,008	0,985	0,004	0,002
<i>F75</i>	0,012	0,978	0,002	0,008
<i>F85</i>	0,018	0,967	0,009	0,006
<i>F115</i>	0,008	0,957	0,026	0,008
<i>F195</i>	0,001	0,954	0,028	0,017
<i>F120</i>	0,004	0,946	0,015	0,036
<i>F190</i>	0,001	0,931	0,018	0,051
<i>F185</i>	0,002	0,853	0,080	0,065
<i>F250</i>	0,003	0,852	0,009	0,137

Продолжение таблицы 5.2

Станция	Кластер			
	I	II	III	IV
<i>F80</i>	0,113	0,837	0,008	0,041
<i>F180</i>	0,003	0,485	0,088	0,424
<i>F160</i>	0,000	0,000	1,000	0,000
<i>F155</i>	0,000	0,001	0,999	0,000
<i>F165</i>	0,000	0,001	0,999	0,000
<i>F175</i>	0,000	0,001	0,998	0,000
<i>F150</i>	0,000	0,002	0,998	0,000
<i>F170</i>	0,000	0,003	0,997	0,000
<i>F140</i>	0,000	0,009	0,991	0,001
<i>F130</i>	0,000	0,008	0,990	0,001
<i>F145</i>	0,000	0,013	0,986	0,001
<i>F135</i>	0,000	0,020	0,979	0,001
<i>F125</i>	0,000	0,052	0,946	0,002
<i>F235</i>	0,000	0,003	0,000	0,997
<i>F225</i>	0,000	0,003	0,000	0,996
<i>F270</i>	0,000	0,004	0,000	0,996
<i>F255</i>	0,000	0,006	0,000	0,994
<i>F260</i>	0,001	0,012	0,000	0,987
<i>F220</i>	0,000	0,011	0,002	0,987
<i>F230</i>	0,000	0,013	0,001	0,986
<i>F215</i>	0,001	0,014	0,006	0,979
<i>F240</i>	0,001	0,020	0,001	0,979
<i>F205</i>	0,001	0,019	0,002	0,978
<i>F210</i>	0,003	0,014	0,005	0,978
<i>F200</i>	0,001	0,024	0,002	0,974
<i>F275</i>	0,002	0,025	0,002	0,971
<i>F265</i>	0,001	0,028	0,001	0,970
<i>F245</i>	0,001	0,040	0,012	0,947
<i>F280</i>	0,235	0,128	0,004	0,632

Примечание. Жирным шрифтом выделены экспоненциальные веса для сообществ основного кластера, жирным курсивом – дополнительного (>0,05).

Таблица 5.3 – Разложение среднего внутригруппового сходства по вкладам отдельных видов макрозообентоса (по возможности первые десять видов) для группировок макрозообентоса выделенных в бухте Западная (остров Фуругельма)

Таксон	Fq	B	$\bar{\delta}_i$	$\bar{\delta}_i/SD(\delta_i)$	$CN, \%$	$CCN, \%$
Группа I. Среднее сходство 39,48 %						
<i>Spisula sachalinensis</i>	91,7	272,3	12,27	1,68	31,09	31,09
<i>Macra chinensis</i>	83,3	94,66	8,04	1,31	20,38	51,47
<i>Scaphechinus griseus</i>	33,3	5,10	3,12	0,63	7,90	59,38
<i>Scoloplos armiger</i>	83,3	1,07	3,01	1,32	7,64	67,01
<i>Chaustorius eons eons</i>	58,3	2,56	2,36	0,61	5,97	72,99
<i>Olivella borealis</i>	58,3	1,50	2,20	0,65	5,58	78,57

Продолжение таблицы 5.3

Таксон	Fq	B	$\bar{\delta}_i$	$\bar{\delta}_i/SD(\delta_i)$	$CN, \%$	$CCN, \%$
<i>Pontarpinia longirostris</i>	58,3	1,42	1,79	0,61	4,53	83,09
<i>Echinocardium cordatum</i>	41,7	25,79	1,55	0,41	3,92	87,01
<i>Onuphis shirikishinaensis</i>	50,0	3,32	1,41	0,52	3,58	90,58
Группа II. Среднее сходство 42,44 %						
<i>Callista brevisiphonata</i>	92,9	795,2	9,99	2,16	23,53	23,53
<i>Echinocardium cordatum</i>	92,9	258,7	6,93	2,09	16,33	39,85
<i>Asterina pectinifera</i>	92,9	101,3	5,82	1,89	13,72	53,58
<i>Strongylocentrotus intermedius</i>	85,7	37,48	3,71	1,41	8,75	62,32
<i>Onuphis shirikishinaensis</i>	71,4	11,45	1,97	0,93	4,63	66,96
<i>Mya priapus</i>	42,9	122,7	1,39	0,44	3,28	70,24
<i>Scoloplos armiger</i>	71,4	3,18	1,34	0,93	3,16	73,40
<i>Felaniella usta</i>	71,4	1,99	0,96	0,87	2,26	75,66
<i>Mactra chinensis</i>	42,9	13,56	0,92	0,44	2,16	77,83
<i>Keenocardium californiensis</i>	50,0	10,50	0,85	0,53	2,01	79,84
Группа III. Среднее сходство 61,51 %						
<i>Callista brevisiphonata</i>	100,0	1169	12,47	8,27	20,27	20,27
<i>Echinocardium cordatum</i>	100,0	215,6	8,13	10,26	13,22	33,49
<i>Spisula voyi</i>	100,0	330,9	8,05	6,42	13,08	46,57
<i>Strongylocentrotus intermedius</i>	100,0	84,41	5,35	3,52	8,70	55,27
<i>Echinarachnius parma</i>	90,9	92,22	5,32	2,01	8,65	63,92
<i>Felaniella usta</i>	100,0	9,56	3,22	4,35	5,24	69,16
<i>Apostichopus japonicus</i>	63,6	66,45	2,38	0,77	3,87	73,03
<i>Litorina squalida</i>	90,9	8,10	2,08	1,78	3,38	76,41
<i>Asterina pectinifera</i>	63,6	58,38	1,90	0,74	3,09	79,50
<i>Notomastus latericeus</i>	90,9	1,36	1,70	1,94	2,76	82,26
Группа IV. Среднее сходство 51,24 %						
<i>Callista brevisiphonata</i>	94,1	968,4	6,66	2,15	12,99	12,99
<i>Asterina pectinifera</i>	100,0	104,7	5,48	5,91	10,70	23,69
<i>Crenomytilus grayanus</i>	70,6	415,3	2,43	0,70	4,74	28,43
<i>Polydora sp.</i>	94,1	12,93	2,35	2,00	4,60	33,03
<i>Laonice cirrata</i>	100,0	5,50	2,25	3,78	4,39	37,42
<i>Mya priapus</i>	70,6	47,42	2,21	0,93	4,32	41,74
<i>Scoloplos armiger</i>	100,0	4,79	2,21	3,80	4,32	46,06
<i>Pectinaria sp.</i>	82,4	13,12	1,80	1,31	3,52	49,58
<i>Lumbrineris japonica</i>	88,2	6,52	1,72	1,66	3,36	52,94
<i>Lumbrineris latreilli</i>	70,6	14,29	1,63	0,91	3,19	56,13

Примечание. Виды расположены в порядке уменьшения процентных вкладов; Fq – частота встречаемости, B – средняя биомасса, $\bar{\delta}_i$ – мера сходства, SD – стандартное отклонение, CN – процентный вклад, CCN – накопленные проценты.

Группа I (глубины 1,0–2,8 м) приурочена к чисто песчаным, весьма подвижным и хорошо аэрируемым донным отложениям (низкие значения угла внутреннего трения, герметичности и высокие – силы взмучивания) и характеризуется наименьшей среди выделенных ассоциаций биомассой (рисунок 5.8). Мористая граница этого сообщества в точности совпадает с областью второго разрушения волнения (из трех зафиксированных

при данной гидродинамической ситуации) и началу снижения содержания частиц песчаных фракций, а его «ядро» или «центр»* простирается с 30 по 60 м разреза. Сообщество II (глубины 3,0–4,5 м) обитает на смешанных грунтах с преобладанием мелкого песка при несколько более спокойной гидродинамической обстановке (снижение интенсивности общего водообмена, хотя его вертикальная компонента также хорошо выражена, как и в «ареале» первой группировки). «Упаковка» осадка здесь несколько плотнее (угол внутреннего трения выше), но сила взмучивания и проницаемость примерно такие же, ядро сообщества занимает 85–110 м трансекты.

I – профиль дна, 2 – содержание частиц песчаных фракций (%), 3 – сила взмучивания (логарифмический масштаб, г/м²), 4 – угол внутреннего трения грунта (градусы), 5–6 – интенсивность общего водообмена в придонном слое и его вертикальной составляющей (усл. ед.), 7 – «герметичность» грунта (с); 8–9 – TPF_{bio} и TPF_{chem} , 10 – биомасса (г/м²), сглаженная фильтром 4253Н. 1, 3, 5, 6, 8, 9 – отложены по основной оси ординат, 2, 4, 7, 10 – по дополнительной; 1–7 – по [61]), 8–9 по: [25]. Стрелки – проникающее волнение, римские цифры – сообщества, в скобках – $ПЭС_{амх}$

Рисунок 5.8 – Распределение некоторых абиотических параметров и сообществ макрозообентоса вдоль разреза у острова Фуругельма (волнение 3-4 балла). Выделение сообществ выполнено на основе алгоритма, разработанного авторами [9, 10], и не совпадает с таковым, опубликованным ранее [61, 62]

*Участки с наибольшими биомассами: сообщество представляет собой «относительный континуум между относительными перерывами континуума» или узел – скопление точек в некоем гиперпространстве, полностью или частично изолированное от других подобных скоплений [7]. Группы видов, одинаково реагирующих на факторы среды – некие узлы в многомерном континууме – это сообщества, т. е. участки континуума, ограниченные пространством перерыва континуума – экотонем. Естественно, области этого континуума, где «сходится» наибольшее число видов, должны быть и наиболее обильны в количественном отношении.

Ассоциация III (глубины 4,5–6,5 м) обитает, очевидно, при наиболее благоприятных физических условиях, о чем свидетельствует относительно низкая интенсивность общего водообмена, слабая выраженность его вертикальной составляющей, низкая сила взмучивания и самая высокая проницаемость грунта. Последний представлен здесь мелким гравием со значительной примесью крупного песка и среднего гравия; центр группировки сосредоточен в пределах 135–165 м разреза (рисунок 5.8). Сообщество IV (глубины 7–18 м) располагается сразу после первой области разрушения волн и перегиба донного профиля, где формирование такой области почти облигатно при любых, кроме, вероятно, штилевых условий [59]. Донные отложения представлены, в основном, алевритами с существенной добавкой более грубых фракций – среднезернистого песка, среднего и мелкого гравия. Ядро группировки локализовано в 205–230 м от берега, причем осадки на этом участке очень плотно упакованы, что ведет к резкому увеличению их герметичности и угла внутреннего трения. Сила взмучивания принимает здесь самые низкие значения, однако ее уменьшение – кажущееся явление. По сравнению с более мелководными участками, взмучиваются гораздо более тонкие частицы, имеющие низкую гидравлическую крупность и долгое время жизни во взвеси, что и снижает массу осадка, попадающего в седиментационные ловушки, но обеспечивает резкое повышение мутности в придонном слое воды.

В дифференциации выделенных сообществ статистически значимо участвуют все параметры, характеризующие свойства придонной физической среды и представленные на рисунке 5.8 (таблица 5.4, рисунок 5.9). В то же время, глубина, индексы TPF_{chem} и TPF_{bio} , а также содержание органического углерода были удалены из модели на основе пошаговой процедуры.

Таблица 5.4 – Результаты ССА для биомассы донных животных: дисперсионный анализ (ANOVA) для полных моделей, моделей с сокращенным числом параметров, учитывающих краевые эффекты, и статистическая оценка их термов (число перестановок – 999)

Параметр	<i>Df</i>	χ^2	<i>F</i>	Pr(> <i>F</i>)
Общая модель: Корень 4 степени из биомассы ~ <i>Pse</i> + <i>Psa</i> + <i>Total_w</i> + <i>Wave</i> + <i>Force_r</i> + <i>Angle</i> + <i>Herm</i>				
Модель	7	1,697	3,834	0,001
Остатки	46	2,908		
Краевые эффекты (тип II)				
<i>Pse</i>	1	0,174	2,758	0,002
<i>Psa</i>	1	0,180	2,852	0,001
<i>Total_w</i>	1	0,161	2,5531	0,001
<i>Wave</i>	1	0,102	1,610	0,022
<i>Force_r</i>	1	0,150	2,374	0,002
<i>Angle</i>	1	0,150	2,372	0,002

Продолжение таблицы 5.4

Параметр	Df	χ^2	F	$Pr(>F)$
<i>Herm</i>	1	0,135	2,140	0,002
Остатки	46	2,908		

Примечание — χ^2 – критерий согласия хи-квадрат; F – расчетная величина критерия Фишера; Pr – вероятность справедливости H_0 о статистической незначимости модели или включении в нее переменных; обозначения параметров среды см. «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ».

Следует подчеркнуть, что уровень загрязнения последовательно возрастает (TPF_{chem} , вычисленный по TPF_{bio} , рисунок 5.8) от берега в сторону моря, но превышение порога ERL_q наблюдалось только единожды – в точке 230 м. Подобным же образом ведет себя и содержание органического углерода (модельные данные по [13], не показано). Концентрация $C_{орг}$ и TPF_{chem} в местообитании группировки I составляют соответственно $0,17 \pm 0,01$ мг/г и $1,48 \pm 0,03$ усл. ед., для II сообщества – $0,22 \pm 0,01$ и $1,88 \pm 0,05$, для III – $0,27 \pm 0,01$ и $2,02 \pm 0,04$, для IV – $0,37 \pm 0,01$ и $2,33 \pm 0,06$. В среднем для всего полигона это составит $0,28 \pm 0,01$ мг/г и $2,00 \pm 0,05$ усл. ед.; такие величины TPF_{chem} низки и характерны, в целом, для биологически сбалансированных группировок, не говоря уже о содержании $C_{орг}$ (см. таблица 4.4).

Показатель экологического стресса, рассчитанный по биомассам найденных таксонов, для сообществ I–IV достигает 11,4, 5,0, 3,0 и 13,0 %. Однако для отнесения этих группировок к тому или иному экологическому типу, необходимо иметь величины $ПЭС_{амх}$ (рисунок 5.10). $ПЭС_{bb}$ и $ПЭС_{амх}$ довольно сильно коррелируют друг с другом (полином второй степени: $r = 0,976$, $p = 0,000$); использование этой регрессии показывает, что в указанном ряду группировок $ПЭС_{амх}$ составляет соответственно 16,8, 14,0, 13,5 и 17,8 % (экологические типы MD, BB, BB и D). Таким образом, значения этого показателя у первого и четвертого сообществ превышают первый критический уровень, что свидетельствует об их разбалансированном состоянии, но за их дифференциацию относительно степени дисбаланса ответственно отнюдь не загрязнение и эвтрофикация, а придонные физические условия в местах их обитания.

Сообщество "*L. longifolia*" + *M. chinensis*, выделенное в 1993 г. в заливе Посьета и на притуманганской акватории (локализация, главным образом в последнем районе) приурочено к глубинам 5–18 м, что совпадает с диапазоном глубин группировок III и IV в бухте Западной. Как уже было отмечено, эта группировка биологически сбалансирована или почти сбалансирована, но ее $ПЭС_{амх}$ (15,6 %) заметно выше, чем у остальных ассоциаций этого экологического типа, в большей степени соответствует диапазону данного показателя у умеренно разбалансированных сообществ и даже превышает первый критический уровень. Интересно, что соединение группировок III и IV в одно «сообщество» дает $ПЭС_{амх} = 16,1$ %, а

Римские цифры – выделенные сообщества

Рисунок 5.9 – Результаты процедуры неметрического многомерного шкалирования (преобразование биомассы – корень 4 степени, стресс – 0,122), градиенты параметров среды и ординация станций методом NMDS с результатами подгонки поверхностей для косных факторов. Обозначения параметров среды см. «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ».

R^2 – коэффициент детерминации, F – расчетная величина критерия Фишера, p – вероятность справедливости H_0 ; красные квадраты – выбракованные значения

Рисунок 5.10 – Связь показателей экологического стресса, вычисленных разными способами

простое усреднение – 15,7%. Похоже, что указанный выброс $PЭС_{амх}$ у ассоциации "*L. longifolia*" + *M. chinensis* обусловлен ее существованием в несколько напряженной придонной физической обстановке. При использовании соответствующих параметров среды для определения MEV она, вероятно, заняла бы место в группе MD, в которую включается сообщество "*L. longifolia*" + *E. cordatum*, найденное в 1996 г. на этой же акватории и в том же диапазоне глубин. Кроме того, на лицо возможность применения $PЭС_{амх}$ не только для отдельных синэкологических единиц, но и для донной макрофауны неких акваторий в целом, что, естественно, требует экспериментальной проверки.

Итак, выполненные наблюдения, статистический анализ и различные дополнительные вычисления позволили разработать метод, предназначенный для мониторинга экологического статуса донного населения и степени повреждения мест его обитания. Предлагаемый метод базируется на математической модели перехода сообществ донных животных от «биологически сбалансированного» через «разбалансированное» к «физически контролируемому» состоянию. Нелинейность этой зависимости (логистическая функция) дает возможность установления граничных критериев или критических уровней состояния сообществ макрозообентоса (степени повреждения местообитания). Первый из них ($PЭС_{амх} = 15\%$) следует считать «заданным значением» (target value, *CERL*), то есть уровнем, к которому необходимо стремиться, чтобы

восстановить функциональные свойства донных отложений для жизни животных, второй ($ПЭС_{амх} = 36 \%$) – «значением коррекции» (intervention value, *CERM*) – уровнем, когда такие свойства сильно снижены, представляют опасность и требуют вмешательства со стороны человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Запланированные на 2022 г. работы по систематизации и анализу данных, в соответствии с Государственным заданием, выполнены полностью. На основе проведенных наблюдений, анализа и расчетов можно сделать следующее заключение.

1) Показано, что наилучшие результаты дает вычисление показателя экологического стресса (*ПЭС*) на основе выбора максимального значения среди всех возможных вариантов расчетов, и именно такой вариант определения этого показателя следует использовать для разработки искомого метода. Данный вариант вычисления (*ПЭС_{амх}*) является и наиболее «биологичным»: донные животные, как впрочем, и любые другие, весьма разнообразны по своим размерам, и совершенно необязательно, что их плотность сильно связана именно с общей плотностью, а не с общей биомассой и наоборот;

2) При благоприятных условиях среды *ПЭС_{амх}* не превышает 15 % (первый критический уровень, *CERL*), а сообщества донной фауны находятся в состоянии, близком к биологически сбалансированному. Величины *ПЭС_{амх}* в диапазоне 15–36 % говорят об усилении влияния неких лимитирующих факторов (не обязательно антропогенных), но это воздействие не является «разрушающим». Значения *ПЭС_{амх}*, превышающие 36 % (второй критический уровень, *CERM*) свидетельствуют об экстремальном ухудшении условий среды обитания и переходе сообществ в физически контролируемое состояние;

3) Применение процедуры НМ позволило выделить шесть экологических типов сообществ донных животных. Тип ВВ объединяет биологически сбалансированные или почти сбалансированные сообщества, тип РС – физически контролируемые. Между ними располагаются типы SD, MD, D и HD, включающие группировки с разной степенью разбалансировки – от легкого до сильного дисбаланса: слабо и умеренно разбалансированные, разбалансированные и сильно разбалансированные;

4) По-настоящему императивными факторами для выделенных экологических типов сообществ макрозообентоса является уровень химического загрязнения и эвтрофикации, а также содержание растворенного кислорода и терригенный сток. В меньшей степени это относится к гранулометрическому составу донных отложений и типам грунта и, еще в меньшей, – к глубине. В тоже время, последнюю нельзя полностью исключить из этого списка, поскольку ее действие, как и влияние фракционного состава осадков, отражается на вариациях общих биотических характеристик;

5) Влияние императивных факторов отчетливо проявляется в составе выделенных экологических типов сообществ макрозообентоса. В биологически сбалансированных или почти сбалансированных группировках преобладают стенобионтные и эври-

стенобионтные чистолюбивые и умеренно толерантные по отношению к загрязнению представители макрозообентоса, а также животные, экстремально чувствительные и индифферентные к эвтрофикации. В физически контролируемых агломерациях доминируют эврибионтные оппортунисты первого и второго порядков, как в отношении загрязнения, так и содержания органического углерода. В ряду от биологически сбалансированных к физически контролируемым сообществам наблюдается последовательное снижение роли животных, чувствительных к загрязнению и эвтрофикации, и рост вкладов оппортунистических таксонов;

6) Воздействие императивных факторов сказывается и на изменчивости большинства количественных характеристик выделенных экологических типов сообществ макрозообентоса, за исключением плотности поселения и биомассы. В целом, эти эффекты выражаются в нарушении общих тенденций изменения различных экологических индексов (их снижения или увеличения), а также нивелировании действия роста уровня загрязнения и эвтрофикации;

7) Характерными чертами слегка разбалансированных сообществ (SD тип) являются весьма низкие величины статистики Кларка, «неожиданно» высокая доля оппортунистических и эврибионтных по отношению к загрязнению таксонов, а также большая доля стенобионтов. Скорее всего, эти ассоциации развиваются, в результате кратковременного экстремального воздействия одного из императивных факторов и должны рассматриваться как поврежденные или разрушенные;

8) Переходы сообществ из одного в другой экологический тип, происходящие как с увеличением степени дисбаланса, так и с его уменьшением, свидетельствуют, во-первых, о выраженной динамике донной фауны и, во-вторых, о принципиальной возможности ее восстановления даже после самого сурового внешнего воздействия. Частое изменения уровня загрязнения и эвтрофикации, падение содержания O_2 ниже критического и, вероятно, другие пертурбации, предполагающие появление «новых» видов, не дают сообществам перейти в климаксное или близкое к таковому состояние. Это происходит из-за того, что короткие периоды покоя не позволяют установиться связям внутри группировок, а самим видам выстроиться вдоль градиентов императивных факторов;

9) Разработан метод оценки экологического состояния морской среды и донного населения, основой которого является шкала для определения статуса сообществ макрозообентоса на основе показателя экологического стресса. Эта шкала базируется на математической модели перехода группировок гидробионтов от биологически сбалансированного к физически контролируемому состоянию. Нелинейность этой зависимости (логистическая функция) дает возможность установления граничных

критериев состояния сообществ макрозообентоса (степени повреждения местообитания). Первый из них ($ПЭС_{амх} = 15 \%$) следует считать «заданным значением» (target value, *CERL*), то есть уровнем, к которому необходимо стремиться, чтобы восстановить функциональные свойства донных отложений для жизни животных, второй ($ПЭС_{амх} = 36 \%$) – «значением коррекции» (intervention value, *CERM*) – уровнем, когда такие свойства сильно снижены, представляют опасность и требуют вмешательства со стороны человека.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Mann R.E. Global environmental monitoring system (GEMS). — Action Plan for Phase 1. SCOPE, rep. 3. — Toronto, 1973. — 130 p.
2. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. — Л.: Гидрометеиздат, 1979. — 375 с.
3. UNEP: Statistical analysis and interpretation of marine community data: Reference methods for Marine Pollution Studies. — Nairobi, 1995. — № 64. — 75 p.
4. Мощенко А.В., Белан Т.А., Лишавская Т.С., Борисов Б.М. Экологическое состояние морской среды и макрозообентоса у южной оконечности полуострова Муравьева-Амурского // Тр. ДВНИГМИ. — 2017. — Вып. 155. — С. 178—220.
5. Мощенко А.В., Белан Т.А., Лишавская Т.С., Борисов Б.М. Предельно допустимый уровень загрязнения и сообщества макрозообентоса // Океанография залива Петра Великого и прилегающей части Японского моря: тезисы докладов III научной конф. / г. Владивосток (26-28 апреля 2017 г.). — Владивосток: ТОИ ДВО РАН, 2017. — С. 26.
6. Мощенко А.В., Белан Т.А., Борисов Б.М., Лишавская Т.С. Допустимый уровень загрязнения и сообщества макрозообентоса. // Четвёртая научная конференция «Океанография залива Петра Великого» 15-16 мая 2018. — URL: <http://ferhri.org/images/stories/FERHRI/science/zalivPV/Conference2018/moschenko2.pdf> (дата обращения 16.11.2021).
7. Несис К.Н. Общие экологические понятия в приложении к морским сообществам. Сообщество как континуум // Биология океана. Т. 2. Биологическая продуктивность океана. — М.: Наука, 1977. — С. 5—13.
8. Суханов В.В., Петропавловский Б.С., Чавтур Н.А. Структура растительных сообществ Сихотэ-Алинского заповедника. — Владивосток: Дальнаука, 1994. — 220 с.
9. Отчет ФГБУ «ДВНИГМИ» «Совершенствование методических основ мониторинга состояния морской среды. Предложения по установлению граничных критериев для оценки классов состояния морской среды на базе одного или комплекса биологических параметров с учетом передового международного опыта». — 2020. — 167 с. — URL: http://ferhri.org/images/stories/FERHRI/NIR/Otchety/otchet_462_moschenko.pdf (дата обращения 05.09.2022).
10. Мощенко А.В., Белан Т.А., Борисов Б.М., Лишавская Т.С., Севастьянов А.В. К методике выделения сообществ макрозообентоса: простой алгоритм для практики экологического мониторинга // Труды ДВНИГМИ. — 2021. — Вып. 156. — С. 111—141.
11. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. Том 2. — М: Мир, 1989. — 477 с.

12. Антомонов Ю.Г. Моделирование биологических систем. — Киев: Наукова думка, 1987. — 260 с.
13. Отчет ФГБУ «ДВНИГМИ» «Совершенствование методических основ мониторинга состояния морской среды. Систематизированные данные по факторам среды и общим характеристикам сообществ макрозообентоса». — 2021. — 108 с. — URL: http://ferhri.org/images/stories/FERHRI/NIR/Otchety/otchet_4.6.2_2021_moschenko.pdf (дата обращения 05.09.2022).
14. РД 52.10.556-95. Методические указания. Определение загрязняющих веществ в пробах морских донных отложений и взвеси. — М.: Гидрометеоздат, 1996. — 49 с.
15. Орлов Д.С., Гришина Л.А. Практикум по химии гумуса. — М.: МГУ, 1981. — 272 с.
16. Лонцих С.В., Петров Л.Л. Стандартные образцы состава природных сред. — Новосибирск: Наука, 1988. — 277 с.
17. Петелин В.П. Гранулометрический анализ морских донных осадков. — М.: Наука, 1967. — 125 с.
18. Боцул А.И. Лазерный измеритель размеров частиц “Analysette 22”: достоинства, недостатки и некоторые особенности использования при анализе донных осадков // Условия образования донных осадков и связанных с ними полезных ископаемых в окраинных морях. — Владивосток: Дальнаука, 2002. — С. 114—118.
19. Дударев О.В., Боцул А.И., Чаркин А.Н., Бирюлина М.Г., Гаврилова Г.С. Современная геэкологическая обстановка зал. Петра Великого (Японское море) // Изв. ТИНРО. — 2002. — Т. 131. — С. 132—140.
20. Григорьева Н.И. Залив Посьета на рубеже веков: физико-географическая характеристика, климат, гидрологический режим // Современное экологическое состояние залива Петра Великого Японского моря. — Владивосток: Издат. дом ДВФУ, 2012. — С. 5—20.
21. Отчет ФГБУ «ДВНИГМИ» «Предложения по разработке новых или обновления существующих методов гидробиологического анализа морской среды с целью определения качества морских вод по характеристикам состояния биологических сообществ. Адаптация метода оценки качества морской среды по данным биологического анализа на основе индексов *AMBI* и *M-AMBI* (*Azti Marine Biotic Index* и *Multivariate Azti Marine Biotic Index*) для залива Петра Великого Японского моря». — 2020. — 120 с. — URL: http://ferhri.org/images/stories/FERHRI/NIR/Otchety/otchet_463_moschenko.pdf (дата обращения 05.09.2022).
22. Мощенко А.В., Белан Т.А., Борисов Б.М., Лишавская Т.С., Севастьянов А.В.

Адаптация метода оценки качества морской среды по данным биологического анализа на основе индексов AMBI и M-AMBI для залива Петра Великого Японского моря // Труды ДВНИГМИ. — Вып. 156. — 2021. — С. 142—181.

23. Лихт Ф.Р., Астахов А.С., Боцул А.И., Деркачев О.В., Марков Ю.Д., Уткин И.В. Структура осадков и фации Японского моря. — Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1983. — 287 с.

24. Belan T.A., Moshchenko A.V. Polychaete taxocenosis variability associated with sediment pollution loading in the Peter the Great Bay (the East Sea/Japan Sea) // Ocean Science J. — 2005. — Vol. 40, No. 1. P. 1—10.

25. Отчет ФГБУ «ДВНИГМИ» «Метод оценки химического загрязнения морской среды, основанный на распределении видов макрозообентоса вдоль градиента загрязнения». — 2021. — 108 с. — URL: http://www.ferhri.ru/images/stories/FERHRI/NIR/Otchet/otchet_4.6.3_2021_moschenko.pdf (дата обращения 05.09.2022).

26. Clarke K.R. Comparisons of dominance curves // J. Exp. Mar. Biol. Ecol. — 1990. — Vol. 138. No. 1–2. P. 143–157.

27. Borja Á., Franco J., Muxika I. The biotic indices and the Water Framework Directive: the required consensus in the new benthic monitoring tools // Mar. Pollut. Bull. — 2004. — Vol. 48. No. 3–4. P. 405—408.

28. Muxika I., Borja Á., Bald J. Using historical data, expert judgment and multivariate analysis in assessing reference conditions and benthic ecological status, according to the European Water Framework Directive // Mar. Pollut. Bull. — 2007. — Vol. 55. No. 1–6. P. 16—29.

29. Borja Á., Mader J., Muxika I. Instructions for the use of the AMBI index software (Version 5.0) // Revista de Investigacion Marina. — 2012. — Vol. 19. No. 3. P. 71—82.

30. Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTICA® — Статистический анализ и обработка данных в среде Windows®. — М.: Инф.-издат. дом «Филинь», 1998. — 608 с.

31. The R Project for Statistical Computing. — URL: <https://www.r-project.org> (дата обращения 16.11.2021).

32. Non-linear Regression in R for biologist (Part1). — URL: http://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/7812_5327615eb0044cf29420b955ddaa6173.html (дата обращения 16.11.2021).

33. Шипунов А. Б., Коробейников А. И., Балдин Е. М. Анализ данных с R (II). — URL: <https://www.inp.nsk.su/~baldin/DataAnalysis/R/R-07-datamining.pdf> (дата обращения 16.11.2021).

34. Шитиков В.К., Розенберг Г.С. Рандомизация и бутстреп: статистический анализ

в биологии и экологии с использованием R. — Тольятти: Кассандра, 2013. — 314 с.

35. Ким Дж., Клекка У.Р., Мьюлер К.У. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. — М.: Финансы и статистика, 1989. — 312 с.

36. Circular on target values and intervention values for soil/sediment redemption. Spatial Planning and Environment of Netherlands. — Ministry of Housing, 2000. — 75 p.

37. Buchman M.F. NOAA Screening Quick Reference Tables, NOAA OR&R Report 08-1, Office of Response and Restoration Division, National Oceanic and Atmospheric Administration. — Seattle WA, 2008. — 34 p.

38. Long E.R., MacDonald D.D., Smith S.L., Calder F.D. Incidence of adverse biological effects within ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments // Environ. Management. — 1995. — Vol. 19. Iss. 1. — P. 81—97.

39. Boyd J., Baumann J., Hutton K., Bertold S., Moore B. Sediment quality in Burrard inlet using various chemical and biological benchmarks // Burrard Inlet Environmental Action Program. — Burnaby, B.C., 1998. — 37 p.

40. Мощенко А.В., Белан Т.А. Метод оценки антропогенного нарушения сообществ макрозообентоса рыхлых грунтов // Биол. моря. — 2008. — Т. 34. № 4. — С. 279—292.

41. Мощенко А.В., Белан Т.А. Новые методы оценки экологического состояния природной среды Дальневосточных морей России // Динамика морских экосистем и современные проблемы сохранения биологического потенциала морей России. — Владивосток: Дальнаука, 2007. — С. 276—313.

42. Мощенко А.В., Белан Т.А., Борисов Б.М., Лишавская Т.С., Севастьянов А.В. Современное загрязнение донных отложений и экологическое состояние макрозообентоса в прибрежной зоне Владивостока (залив Петра Великого Японского моря) // Изв. ТИНРО. — 2019. — Т. 196. — С. 155—181.

43. Мощенко А.В., Белан Т.А., Лишавская Т.С., Севастьянов А.В., Борисов Б.М. Многолетняя динамика концентраций приоритетных поллютантов и общего уровня химического загрязнения прибрежных акваторий Владивостока (залив Петра Великого Японского моря) // Изв. ТИНРО. — 2020. — Т. 200, вып. 2. — С. 377—400.

44. Мощенко А.В., Белан Т.А., Борисов Б.М., Лишавская Т.С., Севастьянов А.В. Основные тенденции временного хода концентраций приоритетных поллютантов в осадках прибрежных акваторий Владивостока (залив Петра Великого Японского моря) // Изв. ТИНРО. — 2021. — Т. 201, вып. 2. — С. 440—457.

45. Мощенко А.В., Белан Т.А., Ивин В.В. Сообщества макрозообентоса восточной части пролива Босфор Восточный (залив Петра Великого Японского моря) // Изв. ТИНРО. — 2018. — Т. 193. — С. 112—142.

46. Отчет ФГБУ «ДВНИГМИ» «Исследование структуры изменчивости общих характеристик донного населения для определения наиболее эффективных для мониторинговых исследований биотических показателей». — 2022. — 108 с.
47. Washington H.G. Diversity, biotic and similarity indices. A review with special relevance to aquatic ecosystems // *Water Research*. — 1984. — Vol. 18. — P. 653–694.
48. Rygg B. Distribution of species along pollution-induced diversity gradients in benthic communities in Norwegian Fjords // *Mar. Poll. Bull.* — 1985. — Vol. 16. — No. 12. — P. 469–474.
49. Warwick, R.M., Clarke, K.R. New “biodiversity” measures reveal a decrease in taxonomic distinctness with increasing stress // *Mar. Ecol. Prog. Ser.* — 1995. — Vol. 129. — P. 301–305.
50. Протасов А.А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикоология. — Киев: Академперіодика, 2002. — 105 с.
51. Ponti M., Vadrucchi M. R., Orfanidis S., Pinna M. Biotic indices for ecological status of transitional water ecosystems // *Transit. Waters Bull.* — 2009. — Vol. 3. — No. 3. — P. 32–90.
52. Veríssimo H., Neto J.M., Teixeira H., Franco J.N., Fath B.D., Marques J.C., Patrício J. Ability of benthic indicators to assess ecological quality in estuaries following management. — URL: https://www.researchgate.net/publication/236033738_Ability_of_benthic_indicators_to_assess_ecological_quality_in_estuaries_following_management (дата обращения 20.09.2022).
53. Севастьянов А.В., Лишавская Т.С., Чаткина Т.В. Гипоксия придонных вод прибрежных районов залива Петра Великого // *Тр. ДВНИГМИ*. — 2012. — Вып. 154. — С. 226–245.
54. Diaz R.J., Rosenberg R. Spreading dead zones and consequences for marine ecosystems // *Science*. — 2008. — Vol. 321, № 5891. — P. 926–929.
55. Тищенко П.Я., Лобанов В.Б., Звалинский В.И. и др. Сезонная гипоксия Амурского залива (Японское море) // *Изв. ТИНРО*. — 2011. — Т. 165. — С. 136–157.
56. Шулькин В.М., Струков А.Ю. Влияние межгодовой изменчивости речного стока на геохимию эстуарных и прибрежно-морских донных отложений // *Геологическая эволюция взаимодействия воды с горными породами : мат-лы 3-й Всерос. конф. с междунар. участием*. — Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2018. — С. 210–213.
57. Moshchenko A.V., Belan T.A. Ecological state and long-term changes of macrozoobenthos in the northern part of Amursky Bay (Sea of Japan) // *Ecological studies and the state of the ecosystem of Amursky Bay and the estuarine zone of the Razdolnaya River (Sea of Japan)*. — Vladivostok: Dalnauka, 2008. — Vol. 1. — P. 61–91.

58. Belan T.A., Moshchenko A.V. Pollution indicator species in the communities of soft bottom macrozoobenthos in Amursky Bay (Peter the Great Bay, Sea of Japan) // Ecological studies and the state of the ecosystem of Amursky Bay and the estuarine zone of the Razdolnaya River (Sea of Japan). — Vladivostok: Dalnauka, 2009. — Vol. 2. — P. 173–204.

59. Moshchenko A.V., Belan T.A., Oleynik E.V. Influence of contamination on soft-bottom communities in Peter the Great Bay, Sea of Japan: choice of variables // Ecological studies and the state of the ecosystem of Amursky Bay and the estuarine zone of the Razdolnaya River (Sea of Japan). — Vladivostok: Dalnauka, 2009. — Vol. 2. — P. 173–204.

60. Тищенко П.П., Звалинский В.И., Михайлик Е.А., Тищенко П.Я. Гипоксия залива Петра Великого // Изв. ТИНРО. — 2021. — Т. 201, вып. 3. — С. 600–639.

61. Мощенко А.В. Роль микромасштабной турбулентности в распределении и изменчивости бентосных животных. — Владивосток: Дальнаука, 2006. — 321 с.

62. Озолиньш А.В. Факторы, определяющие пространственную структуру бентосных сообществ мелководной бухты // Биол. моря. — 2000. — Т. 26, № 4. — С. 231–239.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

**Результаты теста Крускала-Уоллиса, состав и количественные характеристики
таксонов донных животных в сообществах макрозообентоса**

Таблица А.1 – Состав и количественные характеристики таксонов макрозообентоса в выделенных группировках макрозообентоса

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
1. « <i>Lumbrineris longifolia</i> » + <i>Ophiura sarsii</i>										
<i>Acila insignis</i>	27,3	16,0	12,5	1,02	12,25	10,28	4,31	S	SE	–
Ampeliscidae gen. sp.	9,1	1,4	1,4	0,09	0,01	0,01	0,00	–	–	IN
<i>Ampharete</i> sp.	18,2	4,1	3,1	0,26	0,11	0,10	0,04	MT	E	IN
Ampharetidae gen. sp.	9,1	1,4	1,4	0,09	0,02	0,02	0,01	S	SE	T
Annelida fam. gen. sp.	9,1	1,4	1,4	0,09	0,01	0,01	0,00	–	–	–
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	36,4	8,6	4,0	0,55	0,04	0,02	0,01	ET	E	OP2
<i>Aricidea</i> sp.	9,1	1,4	1,4	0,09	0,04	0,04	0,01	–	–	–
<i>Asabellides sibirica</i>	72,7	182,3	68,5	11,60	0,28	0,11	0,10	T	SE	ES
<i>Asterias amurensis</i>	63,6	11,7	4,1	0,75	1,21	0,70	0,43	ET	SE	OP2
<i>Asterina pectinifera</i>	9,1	2,0	2,1	0,13	78,80	82,65	27,76	–	–	IN
<i>Axinopsida subquadrata</i>	9,1	4,1	4,3	0,26	0,03	0,04	0,01	MT	E	IN
Buccinidae gen. sp.	9,1	1,4	1,4	0,09	0,25	0,26	0,09	–	–	–
<i>Buccinum</i> sp.	9,1	8,4	4,4	0,90	4,70	3,43	2,20	–	–	–
<i>Chone</i> sp.	9,1	1,4	1,4	0,09	0,01	0,01	0,00	T	E	IN
<i>Diastylis</i> sp.	9,1	1,0	1,0	0,06	0,00	0,00	0,00	ES	S	IN
<i>Echinarachnius parma</i>	18,2	5,5	3,8	0,35	22,64	16,85	7,97	ES	S	ES
<i>Ennucula tenuis</i>	27,3	4,0	2,2	0,25	0,16	0,11	0,06	T	E	IN
<i>Eteone</i> sp.	27,3	5,5	3,2	0,35	0,04	0,04	0,02	–	–	T
<i>Felaniella usta</i>	9,1	1,4	1,4	0,09	0,03	0,03	0,01	ES	S	ES
<i>Glycera</i> sp.	81,8	28,0	9,2	1,78	0,69	0,49	0,24	ES	SE	IN
<i>Goniada maculata</i>	90,9	42,2	8,8	2,68	0,70	0,26	0,25	MT	E	IN
<i>Halocynthia aurantium</i>	9,1	1,4	1,4	0,09	94,64	99,26	33,33	–	–	IN
Hirudinea fam. gen. sp.	9,1	1,4	1,4	0,09	0,01	0,01	0,00	–	–	OP2
Isaeidae gen. sp.	9,1	2,7	2,9	0,17	0,48	0,50	0,17	–	–	–
<i>Kellia japonica</i>	9,1	2,7	2,9	0,17	0,01	0,01	0,00	–	–	ES
<i>Lanassa</i> sp.	9,1	1,4	1,4	0,09	0,00	0,00	0,00	S	E	ES
<i>Laonice cirrata</i>	72,7	102,1	68,9	6,49	7,76	3,27	2,73	ES	S	IN
<i>Liocyma fluctuosa</i>	63,6	20,0	6,8	1,27	1,54	0,79	0,54	ES	S	ES
«<i>Lumbrineris longifolia</i>»	100,0	268,2	73,5	17,06	1,95	0,58	0,69	T	E	IN
<i>Lunatia pila</i>	9,1	1,4	1,4	0,09	1,36	1,43	0,48	–	–	–
<i>Lunatia</i> sp.	9,1	1,4	1,4	0,09	0,09	0,09	0,03	–	–	–
Lysianassidae gen. sp.	9,1	2,7	2,9	0,17	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
<i>Magelona pacifica</i>	18,2	2,6	1,9	0,17	0,02	0,02	0,01	S	S	ES
<i>Maldane sarsi</i>	18,2	10,9	8,8	0,69	0,49	0,50	0,17	T	E	IN
Maldanidae gen. sp.	45,5	108,2	47,8	6,88	0,96	0,49	0,34	ES	E	ES
<i>Melinna elisabethae</i>	9,1	1,4	1,4	0,09	0,03	0,03	0,01	T	E	T
<i>Miodontiscus annakensis</i>	9,1	2,7	2,9	0,17	0,20	0,21	0,07	–	–	–
<i>Mya japonica</i>	9,1	1,4	1,4	0,09	0,02	0,02	0,01	MT	S	ES
<i>Mytilus edulis</i>	9,1	1,4	1,4	0,09	0,04	0,04	0,01	–	–	T
Nemertea fam. gen. sp.	72,7	26,5	7,3	1,69	0,75	0,25	0,26	MT	E	T
<i>Nephtys</i> sp.	45,5	10,5	4,8	0,67	0,27	0,19	0,10	I	SE	IN
<i>Nothria</i> sp.	27,3	4,8	2,9	0,31	0,10	0,09	0,04	S	S	IN
<i>Oenopota</i> sp.	9,1	10,9	11,4	0,69	0,89	0,93	0,31	T	E	ES
<i>Olivella borealis</i>	9,1	1,4	1,4	0,09	0,21	0,22	0,08	–	–	ES
<i>Ophiura sarsii</i>	81,8	243,2	87,4	15,47	40,30	20,54	14,20	MT	E	IN

Продолжение таблицы А.1

Таксон	<i>Fq</i>	<i>A</i> , экз./м ²	<i>SE</i>	<i>A</i> , %	<i>B</i> , г/м ²	<i>SE</i>	<i>B</i> , %	<i>Cont</i>	<i>Bion</i>	<i>Eutr</i>
Paguridae gen. sp.	9,1	2,0	2,1	0,13	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Pandalidae gen. sp.	9,1	1,4	1,4	0,09	0,01	0,01	0,00	–	–	–
<i>Paranaitis polynoides</i>	18,2	2,7	1,9	0,17	0,14	0,10	0,05	S	S	IN
<i>Pectinaria</i> sp.	54,5	16,7	6,6	1,06	0,61	0,32	0,22	–	–	ES
<i>Philine</i> sp.	9,1	1,0	1,0	0,06	0,90	0,94	0,32	S	E	IN
<i>Phyllodoce groenlandica</i>	36,4	5,5	2,4	0,35	0,04	0,02	0,01	MT	E	OP2
Phyllodocidae gen. sp.	9,1	1,4	1,4	0,09	0,01	0,01	0,00	–	–	IN
Pleustidae gen. sp.	9,1	1,4	1,4	0,09	0,01	0,01	0,00	–	–	–
<i>Plicifusus</i> sp.	9,1	1,4	1,4	0,09	0,68	0,72	0,24	–	–	–
<i>Polydora</i> sp.	18,2	20,4	19,9	1,30	0,03	0,02	0,01	I	E	T
<i>Praxillella gracilis</i>	9,1	16,4	17,2	1,04	0,41	0,43	0,14	I	E	T
<i>Praxillella praetermissa</i>	9,1	13,6	14,3	0,87	0,89	0,93	0,31	MT	E	T
<i>Praxillella</i> sp.	9,1	9,5	10,0	0,61	0,10	0,10	0,03	I	SE	T
<i>Prionospio</i> sp.	9,1	5,5	5,7	0,35	0,00	0,00	0,00	MT	E	IN
<i>Protocallithaca adamsi</i>	36,4	8,1	4,4	0,51	0,13	0,08	0,04	MT	E	T
<i>Raeta pulchella</i>	18,2	2,3	1,6	0,14	0,05	0,05	0,02	S	E	T
<i>Retusa</i> sp.	9,1	0,9	1,0	0,06	0,02	0,02	0,01	–	–	IN
Sabellidae gen. sp.	18,2	2,6	1,9	0,17	0,07	0,07	0,02	MT	SE	ES
<i>Scalibregma inflatum</i>	54,5	19,5	7,7	1,24	0,42	0,21	0,15	T	E	T
<i>Scoloplos armiger</i>	90,9	189,5	37,1	12,06	3,43	1,16	1,21	MT	E	T
<i>Spio</i> sp.	9,1	0,9	1,0	0,06	0,00	0,00	0,00	–	–	T
Spionidae gen. sp. 3	9,1	10,0	10,5	0,64	0,01	0,01	0,00	MT	E	T
Spionidae gen. sp. 4	36,4	39,5	35,3	2,52	0,07	0,04	0,02	MT	E	T
<i>Spiophanes bombyx</i>	54,5	26,3	15,6	1,67	0,15	0,09	0,05	I	E	IN
<i>Sternaspis scutata</i>	9,1	1,4	1,4	0,09	0,41	0,43	0,14	S	S	T
Terebellidae gen. sp.	9,1	1,4	1,4	0,09	0,01	0,01	0,00	MT	SE	T
<i>Terebellides</i> sp.	9,1	1,4	1,4	0,09	0,01	0,01	0,00	–	–	ES
<i>Terebellides stroemii</i>	9,1	1,4	1,4	0,09	0,10	0,10	0,03	–	–	ES
<i>Travisia</i> sp.	18,2	2,7	1,9	0,17	1,05	0,75	0,37	–	–	ES
<i>Yoldia johani</i>	9,1	1,4	1,4	0,09	0,03	0,03	0,01	S	S	ES
<i>3. Ophiura sarsii + Amphipholis fissa</i>										
<i>Acila insignis</i>	11,5	8,8	5,9	0,48	3,55	2,67	1,20	S	SE	–
<i>Aglaja giglioli</i>	30,8	10,3	4,5	0,56	0,39	0,18	0,13	–	–	ES
<i>Alveinus ojanus</i>	15,4	3,2	1,8	0,17	0,00	0,00	0,00	S	S	ES
<i>Ampharete</i> sp.	15,4	4,2	2,1	0,23	0,04	0,02	0,01	MT	E	IN
Ampharetidae gen. sp.	7,7	1,0	0,7	0,06	0,00	0,00	0,00	S	SE	T
<i>Amphiodia fissa</i>	92,3	140,5	27,1	7,70	37,01	10,00	12,55	I	SE	IN
<i>Amphipholis macrospis</i>	3,8	1,0	1,0	0,05	0,53	0,54	0,18	–	–	ES
Annelida fam. gen. sp.	50,0	12,0	2,8	0,66	1,58	1,23	0,54	–	–	–
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	50,0	30,8	13,0	1,69	0,24	0,17	0,08	ET	E	OP2
<i>Aphrodita</i> sp.	7,7	1,0	0,7	0,05	6,35	4,51	2,15	S	S	ES
Aphroditidae gen. sp.	15,4	2,8	1,6	0,15	0,08	0,06	0,03	S	S	OP2
<i>Asabellides sibirica</i>	19,2	4,8	2,3	0,27	0,02	0,01	0,01	T	SE	ES
<i>Asterias amurensis</i>	11,5	1,3	0,8	0,07	8,05	8,03	2,73	ET	SE	OP2
<i>Asterina pectinifera</i>	11,5	1,5	0,9	0,08	21,94	12,70	7,44	–	–	IN
Asteroidea fam. gen. sp.	3,8	0,5	0,5	0,03	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
<i>Asychis gotoi</i>	7,7	0,9	0,7	0,05	2,19	1,72	0,74	–	–	IN

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Asychis</i> sp.	15,4	1,9	0,9	0,11	10,68	10,18	3,62	S	S	IN
<i>Axinopsida subquadrata</i>	65,4	23,9	6,7	1,31	0,24	0,17	0,08	MT	E	IN
<i>Bivalvia</i> fam. gen. sp.	3,8	0,0	0,0	0,00	0,07	0,07	0,02	–	–	–
<i>Cancer</i> sp.	3,8	0,6	0,6	0,03	0,01	0,01	0,00	–	–	IN
<i>Capitella capitata</i>	3,8	0,3	0,4	0,02	0,00	0,00	0,00	ET	E	OP1
Capitellidae gen. sp.	11,5	5,5	3,7	0,30	0,05	0,04	0,02	MT	SE	OP1
<i>Chaetozone setosa</i>	23,1	4,1	1,6	0,22	0,03	0,01	0,01	ET	E	T
<i>Chone</i> sp.	7,7	0,9	0,7	0,05	0,01	0,01	0,00	T	E	IN
<i>Crenella leana</i>	3,8	2,0	2,0	0,11	0,01	0,01	0,00	–	–	IN
<i>Cryptobranchia lima</i>	7,7	1,6	1,2	0,09	0,07	0,06	0,02	–	–	ES
<i>Cryptonatica janthostoma</i>	15,4	1,7	0,8	0,09	1,83	1,19	0,62	I	SE	ES
<i>Cylichnatus incisula</i>	3,8	0,5	0,5	0,03	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
Decapoda fam. gen. sp.	15,4	4,0	2,6	0,22	0,07	0,05	0,02	S	SE	IN
<i>Echinocardium cordatum</i>	19,2	5,5	2,7	0,30	58,47	32,21	19,82	I	S	ES
<i>Ennucula tenuis</i>	30,8	11,1	6,7	0,61	0,09	0,04	0,03	T	E	IN
<i>Eteone</i> sp.	11,5	1,9	1,2	0,11	0,01	0,01	0,00	–	–	T
<i>Eulalia bilineata</i>	7,7	0,8	0,6	0,05	0,01	0,00	0,00	T	E	IN
<i>Eumida sanguinea</i>	3,8	0,4	0,4	0,02	0,01	0,01	0,00	–	–	IN
Eunicidae gen. sp.	3,8	0,5	0,5	0,03	0,03	0,03	0,01	–	–	IN
<i>Felaniella usta</i>	3,8	2,0	2,0	0,11	0,00	0,00	0,00	I	S	ES
Gammaridae fam. gen. sp.	30,8	6,5	2,3	0,35	0,07	0,04	0,02	–	–	ES
<i>Glycera capitata</i>	3,8	1,0	1,1	0,06	0,31	0,31	0,10	T	E	IN
<i>Glycera</i> sp.	84,6	43,3	8,1	2,37	1,17	0,56	0,40	I	SE	IN
<i>Glycinde armigera</i>	23,1	10,7	5,1	0,58	0,21	0,12	0,07	MT	E	IN
<i>Glycinde</i> sp.	3,8	0,4	0,4	0,02	0,00	0,00	0,00	–	–	IN
<i>Goniada maculata</i>	65,4	44,5	10,3	2,44	0,86	0,21	0,29	MT	E	IN
<i>Hiatella arctica</i>	3,8	0,6	0,6	0,03	0,03	0,04	0,01	–	–	ES
Holothuroidea fam. gen. sp.	11,5	1,2	0,7	0,07	3,30	2,91	1,12	S	S	ES
Isopoda fam. gen. sp.	3,8	0,5	0,5	0,03	0,03	0,03	0,01	S	S	–
<i>Laonice cirrata</i>	42,3	7,6	2,5	0,42	0,59	0,21	0,20	I	S	IN
<i>Liocyma fluctuosa</i>	3,8	0,4	0,4	0,02	0,21	0,21	0,07	I	S	ES
«<i>Lumbrineris longifolia</i>»	80,8	128,4	45,2	7,04	1,64	0,42	0,56	T	E	IN
<i>Lyonsia nuculaniformis</i>	3,8	0,3	0,4	0,02	0,11	0,11	0,04	–	–	IN
<i>Macoma orientalis</i>	3,8	0,7	0,7	0,04	14,51	14,80	4,92	–	–	IN
<i>Mactra chinensis</i>	3,8	1,0	1,0	0,05	0,00	0,00	0,00	I	S	ES
<i>Magelona pacifica</i>	38,5	13,5	6,2	0,74	0,07	0,02	0,02	S	S	ES
<i>Maldane sarsi</i>	53,8	391,7	144,9	21,47	14,24	7,33	4,83	T	E	IN
Maldanidae gen. sp.	3,8	0,5	0,5	0,03	0,00	0,00	0,00	I	E	ES
<i>Mediomastus californiensis</i>	3,8	3,5	3,6	0,19	0,06	0,06	0,02	MT	E	T
<i>Melinna elisabethae</i>	23,1	2,8	1,0	0,15	0,05	0,02	0,02	T	E	T
<i>Mya japonica</i>	11,5	2,0	1,2	0,11	0,04	0,02	0,01	MT	S	ES
Nemertea fam. gen. sp.	73,1	25,9	5,0	1,42	1,44	0,45	0,49	MT	E	T
<i>Neomysis</i> sp.	7,7	1,4	1,1	0,08	0,01	0,01	0,00	I	S	IN
<i>Nephtys longosetosa</i>	3,8	0,3	0,4	0,02	0,00	0,00	0,00	I	S	IN
<i>Nephtys</i> sp.	23,1	4,3	1,9	0,23	0,11	0,06	0,04	I	SE	IN
<i>Nicania montagui orientalis</i>	3,8	0,5	0,5	0,03	0,11	0,11	0,04	–	–	–
<i>Nicomache lumbricalis</i>	3,8	3,8	3,9	0,21	0,08	0,09	0,03	–	–	IN

Продолжение таблицы А.1

Таксон	<i>Fq</i>	<i>A</i> , экз./м ²	<i>SE</i>	<i>A</i> , %	<i>B</i> , г/м ²	<i>SE</i>	<i>B</i> , %	<i>Cont</i>	<i>Bion</i>	<i>Eutr</i>
<i>Onuphis</i> sp.	19,2	4,3	2,0	0,23	0,40	0,31	0,14	I	S	IN
<i>Ophelina acuminata</i>	3,8	0,4	0,4	0,02	0,01	0,01	0,00	I	SE	T
<i>Ophiura sarsii</i>	92,3	328,1	53,1	17,98	23,03	4,60	7,81	MT	E	IN
<i>Pagurus</i> sp.	7,7	1,0	0,7	0,05	0,03	0,02	0,01	–	–	IN
<i>Pandalus hypsinotus</i>	3,8	0,6	0,6	0,03	0,39	0,40	0,13	–	–	IN
<i>Paranaitis polynoides</i>	19,2	2,1	0,9	0,12	0,05	0,02	0,02	S	S	IN
<i>Pectinaria</i> sp.	3,8	0,3	0,4	0,02	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
<i>Pherusa plumosa</i>	11,5	2,5	1,7	0,14	0,34	0,24	0,11	T	E	T
<i>Pholoe minuta</i>	3,8	1,0	1,0	0,05	0,01	0,01	0,00	MT	SE	IN
<i>Phoronopsis harmeri</i>	11,5	1,6	0,9	0,09	0,10	0,07	0,03	T	E	T
<i>Phyllodoce groenlandica</i>	30,8	9,9	3,5	0,54	0,43	0,36	0,15	MT	E	OP2
<i>Phyllodoce</i> sp.	3,8	0,4	0,4	0,02	0,00	0,00	0,00	–	–	IN
Phyllodocidae gen. sp.	15,4	3,3	1,7	0,18	0,03	0,02	0,01	–	–	IN
Polychaeta fam. gen. sp.	50,0	12,4	3,2	0,68	0,86	0,58	0,29	–	–	–
<i>Polydora</i> sp.	7,7	102,0	103,5	5,59	5,29	5,39	1,79	I	E	T
<i>Praxillella</i> sp.	96,2	203,4	40,7	11,15	2,83	0,74	0,96	I	SE	T
<i>Prionospio</i> sp.	3,8	1,3	1,3	0,07	0,00	0,00	0,00	MT	E	IN
<i>Protocallithaca adamsi</i>	7,7	0,9	0,7	0,05	4,83	4,92	1,64	MT	E	T
<i>Raeta pulchella</i>	34,6	21,8	14,7	1,19	0,08	0,05	0,03	S	E	T
Sabellidae gen. sp.	7,7	0,9	0,7	0,05	0,01	0,01	0,00	MT	SE	ES
<i>Scalibregma inflatum</i>	15,4	3,0	1,9	0,16	0,12	0,11	0,04	T	E	T
<i>Scoloplos armiger</i>	73,1	42,5	9,8	2,33	0,60	0,20	0,20	MT	E	T
<i>Sigambra bassi</i>	19,2	7,1	5,6	0,39	0,03	0,02	0,01	T	E	OP2
<i>Siliqua alta</i>	3,8	0,5	0,5	0,03	0,05	0,05	0,02	I	S	IN
Sipuncula fam. gen. sp.	3,8	0,3	0,4	0,02	0,00	0,00	0,00	MT	SE	ES
<i>Spiophanes bombyx</i>	65,4	59,2	19,1	3,25	0,48	0,22	0,16	I	E	IN
<i>Sternaspis scutata</i>	11,5	1,3	0,8	0,07	0,30	0,18	0,10	S	S	T
<i>Strongylocentrotus</i> sp.	3,8	0,5	0,5	0,03	12,88	13,14	4,37	I	S	ES
Syllidae gen. sp.	7,7	1,0	0,7	0,05	0,00	0,00	0,00	S	S	–
<i>Syllis</i> sp.	3,8	0,5	0,5	0,03	0,02	0,02	0,01	–	–	IN
Terebellidae gen. sp.	3,8	0,4	0,4	0,02	0,55	0,56	0,19	MT	SE	T
<i>Theora lubrica</i>	11,5	3,0	1,8	0,16	0,01	0,01	0,00	T	E	T
<i>Thracia itoi</i>	3,8	0,3	0,4	0,02	0,14	0,14	0,05	–	–	ES
<i>Travisia</i> sp.	3,8	1,0	1,0	0,05	0,09	0,09	0,03	–	–	ES
<i>Turritella fortilirata</i>	11,5	8,5	7,2	0,47	46,31	41,46	15,70	–	–	ES
<i>Volvulella sculpturata</i>	3,8	0,8	0,9	0,05	0,01	0,01	0,00	–	–	IN
<i>Yoldia keppeliana</i>	30,8	4,8	1,8	0,26	1,78	0,83	0,60	MT	S	ES
4. « <i>Lumbrineris longifolia</i> » + <i>Mactra chinensis</i>										
<i>Abrina shiashkotanica</i>	25,0	3,3	2,3	1,03	0,04	0,04	0,04	–	–	IN
<i>Aglaja giglioli</i>	12,5	1,6	1,7	0,51	0,13	0,14	0,12	–	–	ES
<i>Ampharete acutifrons</i>	12,5	1,4	1,5	0,43	0,12	0,13	0,11	–	–	IN
<i>Amphiodia fissa</i>	25,0	5,1	3,9	1,62	0,41	0,29	0,37	I	SE	IN
Annelida fam. gen. sp.	37,5	7,6	4,2	2,41	0,32	0,29	0,29	–	–	–
<i>Asabellides sibirica</i>	12,5	1,8	1,9	0,55	0,00	0,00	0,00	T	SE	ES
Capitellidae gen. sp.	12,5	1,4	1,5	0,43	0,00	0,00	0,00	MT	SE	OP1
<i>Chaetozone setosa</i>	37,5	14,9	11,0	4,69	0,14	0,10	0,13	ET	E	T
<i>Cryptonatica janthostoma</i>	12,5	1,6	1,7	0,51	16,69	17,84	15,24	I	SE	ES

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
Decapoda fam. gen. sp.	12,5	1,6	1,7	0,51	0,03	0,03	0,03	S	SE	IN
<i>Echinocardium cordatum</i>	12,5	3,3	3,5	1,03	44,53	47,60	40,66	I	S	ES
<i>Felaniella usta</i>	12,5	13,0	13,9	4,10	0,02	0,02	0,01	I	S	ES
Gammaridae fam. gen. sp.	50,0	18,9	9,0	5,96	0,04	0,02	0,04	–	–	ES
<i>Glycera nana</i>	12,5	1,4	1,5	0,43	0,55	0,59	0,50	–	–	IN
<i>Glycera</i> sp.	12,5	3,3	3,5	1,03	0,24	0,26	0,22	I	SE	IN
<i>Glycinde armigera</i>	25,0	3,1	2,2	0,99	0,03	0,02	0,03	MT	E	IN
<i>Goniada maculata</i>	12,5	4,9	5,2	1,54	0,01	0,01	0,01	MT	E	IN
Holothuroidea fam. gen. sp.	12,5	1,6	1,7	0,51	0,05	0,05	0,04	S	S	ES
Isopoda fam. gen. sp.	25,0	3,6	2,5	1,14	0,12	0,12	0,11	S	S	–
<i>Lanassa venusta venusta</i>	12,5	5,6	6,0	1,78	0,01	0,01	0,01	–	–	ES
<i>Laonice cirrata</i>	12,5	1,8	1,9	0,55	0,53	0,56	0,48	I	S	IN
«Lumbrineris longifolia»	75,0	21,6	8,8	6,82	0,87	0,44	0,79	T	E	IN
<i>Lunatia pallida</i>	12,5	3,5	3,7	1,10	0,02	0,02	0,02	–	–	–
<i>Mactra chinensis</i>	62,5	16,9	7,2	5,33	1,46	1,20	1,33	I	S	ES
<i>Magelona pacifica</i>	12,5	1,8	1,9	0,55	0,01	0,01	0,01	S	S	ES
Nemertea fam. gen. sp.	12,5	1,8	1,9	0,55	0,01	0,01	0,01	MT	E	T
<i>Neomysis</i> sp.	50,0	10,1	4,5	3,20	0,06	0,04	0,05	I	S	IN
<i>Nephtys caeca</i>	12,5	1,4	1,5	0,43	9,08	9,70	8,29	S	S	IN
<i>Nephtys</i> sp.	25,0	6,9	5,6	2,17	1,32	1,40	1,21	I	SE	IN
<i>Nipponomysella obesa</i>	25,0	4,4	3,2	1,38	0,13	0,13	0,12	–	–	T
<i>Nuttallia olivacea</i>	12,5	1,6	1,7	0,51	0,07	0,08	0,07	–	–	–
<i>Onuphis iridescens</i>	25,0	18,0	17,2	5,68	0,17	0,14	0,16	I	SE	IN
<i>Onuphis</i> sp.	12,5	8,1	8,7	2,56	0,04	0,04	0,04	I	S	IN
<i>Ophiura sarsii</i>	12,5	1,6	1,7	0,51	0,11	0,12	0,10	MT	E	IN
<i>Pandalus</i> sp.	12,5	15,0	16,0	4,73	0,82	0,87	0,74	–	–	IN
Polychaeta fam. gen. sp.	25,0	7,3	5,1	2,29	0,34	0,30	0,31	–	–	–
<i>Polydora</i> sp.	12,5	1,4	1,5	0,43	0,04	0,04	0,04	I	E	T
Polynoidae gen. sp.	12,5	15,0	16,0	4,73	0,66	0,70	0,60	MT	S	ES
<i>Prionospio malmgreni</i>	12,5	1,8	1,9	0,55	0,01	0,01	0,01	ET	E	OP2
<i>Scaphechinus griseus</i>	12,5	14,6	15,6	4,62	23,08	24,67	21,07	–	–	ES
<i>Scoloplos armiger</i>	50,0	43,5	23,2	13,73	1,74	1,67	1,59	MT	E	T
<i>Siliqua alta</i>	25,0	5,0	3,7	1,58	5,27	4,57	4,81	I	S	IN
<i>Spiophanes bombyx</i>	62,5	9,8	3,5	3,08	0,02	0,01	0,02	I	E	IN
<i>Spisula sakhalinensis</i>	12,5	1,6	1,7	0,51	0,10	0,10	0,09	–	–	ES
<i>Vilasina pillula</i>	12,5	3,8	4,0	1,18	0,08	0,08	0,07	–	–	ES
5. «Lumbrineris longifolia» + <i>Maldane sarsi</i>										
<i>Acila insignis</i>	53,8	79,2	60,2	6,62	59,40	48,52	10,27	S	SE	–
<i>Aglaja gigliolii</i>	53,8	21,8	7,7	1,83	0,81	0,34	0,14	–	–	ES
<i>Alveinus ojanus</i>	30,8	60,9	54,2	5,10	0,04	0,04	0,01	S	S	ES
<i>Ampharete acutifrons</i>	7,7	0,8	0,9	0,07	0,01	0,01	0,00	–	–	IN
<i>Ampharete</i> sp.	7,7	4,0	4,2	0,33	0,07	0,08	0,01	MT	E	IN
Ampharetidae gen. sp.	7,7	1,0	1,0	0,08	0,00	0,00	0,00	S	SE	T
<i>Amphiodia fissa</i>	15,4	7,0	6,2	0,59	0,44	0,37	0,08	I	SE	IN
Annelida fam. gen. sp.	38,5	11,6	6,3	0,97	0,29	0,16	0,05	–	–	–
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	30,8	20,5	14,3	1,72	0,11	0,09	0,02	ET	E	OP2
Aphroditidae gen. sp.	23,1	2,7	1,5	0,23	0,03	0,02	0,01	S	S	OP2

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Asterias amurensis</i>	7,7	1,0	1,0	0,08	200,0	208,17	34,58	ET	SE	OP2
<i>Asterina pectinifera</i>	7,7	1,0	1,0	0,08	20,00	20,82	3,46	–	–	IN
<i>Axinopsida subquadrata</i>	38,5	11,2	5,8	0,93	0,04	0,02	0,01	MT	E	IN
<i>Brada</i> sp.	7,7	0,7	0,7	0,06	0,04	0,04	0,01	–	–	ES
Capitellidae gen. sp.	15,4	3,2	2,7	0,27	0,01	0,01	0,00	MT	SE	OP1
<i>Clinocardium ciliatum</i>	7,7	0,7	0,7	0,06	0,03	0,03	0,00	–	–	ES
<i>Cryptonatica janthostoma</i>	15,4	1,8	1,3	0,15	1,38	0,98	0,24	I	SE	ES
<i>Cylichnatus incisula</i>	7,7	1,0	1,0	0,08	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
Decapoda fam. gen. sp.	46,2	8,1	3,2	0,68	3,12	3,11	0,54	S	SE	IN
<i>Ennucula tenuis</i>	53,8	37,8	18,7	3,17	0,18	0,07	0,03	T	E	IN
<i>Glycera capitata</i>	7,7	0,7	0,7	0,06	0,01	0,01	0,00	T	E	IN
<i>Glycera</i> sp.	53,8	7,8	2,4	0,65	0,77	0,46	0,13	I	SE	IN
<i>Glycinde armigera</i>	15,4	2,8	2,2	0,24	0,06	0,05	0,01	MT	E	IN
<i>Goniada maculata</i>	7,7	0,8	0,9	0,07	0,03	0,03	0,00	MT	E	IN
<i>Lanassa</i> sp.	7,7	1,0	1,0	0,08	0,02	0,02	0,00	S	E	ES
<i>Laonice cirrata</i>	30,8	4,5	2,3	0,38	0,69	0,57	0,12	I	S	IN
«Lumbrineris longifolia»	100,0	285,6	117,5	23,89	1,60	0,66	0,28	T	E	IN
<i>Macoma orientalis</i>	15,4	1,4	1,0	0,12	12,63	13,03	2,18	–	–	IN
<i>Magelona pacifica</i>	7,7	0,8	0,9	0,07	0,01	0,01	0,00	S	S	ES
<i>Maldane sarsi</i>	92,3	154,8	51,1	12,94	10,06	3,70	1,74	T	E	IN
Maldanidae gen. sp.	7,7	2,0	2,1	0,17	0,04	0,04	0,01	I	E	ES
<i>Melinna elisabethae</i>	7,7	2,0	2,1	0,17	0,02	0,02	0,00	T	E	T
<i>Mizuhopecten yessoensis</i>	7,7	0,8	0,9	0,07	253,85	264,2	43,89	–	–	ES
<i>Mya</i> sp.	7,7	0,8	0,9	0,07	0,00	0,00	0,00	MT	E	T
Nemertea fam. gen. sp.	84,6	39,3	11,9	3,29	0,84	0,43	0,15	MT	E	T
<i>Neomysis</i> sp.	7,7	0,7	0,7	0,06	0,00	0,00	0,00	I	S	IN
<i>Nephtys</i> sp.	15,4	1,8	1,3	0,15	0,41	0,42	0,07	I	SE	IN
<i>Ophiura sarsii</i>	15,4	3,1	2,2	0,26	0,31	0,32	0,05	MT	E	IN
<i>Pandalus hypsinotus</i>	7,7	0,7	0,7	0,06	0,03	0,03	0,01	–	–	IN
<i>Pholoe minuta</i>	7,7	1,4	1,4	0,12	0,00	0,00	0,00	MT	SE	IN
<i>Phoronopsis harmeri</i>	7,7	0,8	0,9	0,07	0,02	0,02	0,00	T	E	T
Polychaeta fam. gen. sp.	23,1	7,5	4,7	0,63	0,10	0,08	0,02	–	–	–
<i>Polydora</i> sp.	7,7	11,0	11,4	0,92	0,25	0,26	0,04	I	E	T
Polynoidae gen. sp.	7,7	2,1	2,2	0,17	0,02	0,02	0,00	MT	S	ES
<i>Praxillella</i> sp.	61,5	70,9	36,5	5,93	2,58	1,25	0,45	I	SE	T
<i>Protocallithaca adamsi</i>	23,1	23,7	15,7	1,98	0,22	0,14	0,04	MT	E	T
<i>Raeta pulchella</i>	84,6	63,5	18,2	5,31	0,88	0,41	0,15	S	E	T
<i>Scalibregma inflatum</i>	61,5	16,8	5,5	1,40	1,76	1,15	0,30	T	E	T
<i>Schistomeringos japonica</i>	15,4	6,2	4,7	0,52	0,01	0,01	0,00	ET	E	OP1
<i>Scoloplos armiger</i>	76,9	78,9	23,4	6,60	2,23	0,86	0,39	MT	E	T
<i>Sigambra</i> sp.	7,7	2,1	2,2	0,17	0,01	0,01	0,00	–	–	OP2
<i>Sigambra bassi</i>	23,1	8,6	5,4	0,72	0,05	0,04	0,01	T	E	OP2
Sipuncula fam. gen. sp.	7,7	0,8	0,9	0,07	0,23	0,24	0,04	MT	SE	ES
<i>Solen krusensterni</i>	7,7	1,0	1,0	0,08	0,64	0,67	0,11	I	S	ES
Spionidae gen. sp.	7,7	2,1	2,2	0,17	0,01	0,01	0,00	MT	E	T
<i>Spiophanes bombyx</i>	46,2	52,2	32,1	4,37	0,29	0,17	0,05	I	E	IN
<i>Theora lubrica</i>	76,9	53,5	18,1	4,47	0,30	0,20	0,05	T	E	T

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Yoldia keppeliana</i>	23,1	3,8	2,3	0,32	1,38	0,91	0,24	MT	S	ES
<i>Yoldia</i> sp.	7,7	0,8	0,9	0,07	0,00	0,00	0,00	MT	SE	ES
19. <i>Ophiura sarsii</i> + « <i>Lumbrineris longifolia</i> »										
<i>Acanthomysis stelleri</i>	8,3	0,4	0,4	0,02	0,003	0,003	0,001	–	–	IN
<i>Ampelisca macrocephala</i>	41,7	3,3	1,5	0,13	0,04	0,02	0,02	MT	E	ES
<i>Ampharete sibirica</i>	8,3	0,4	0,4	0,02	0,02	0,02	0,01	I	S	ES
<i>Ampharete</i> sp.	41,7	2,5	1,0	0,10	0,09	0,05	0,04	MT	E	IN
Ampharetidae gen. sp.	8,3	1,3	1,3	0,05	0,04	0,04	0,02	S	SE	T
<i>Amphiodia fissa</i>	41,7	7,9	5,6	0,31	3,94	3,51	1,82	I	SE	IN
<i>Anonyx</i> sp.	8,3	0,4	0,4	0,02	0,003	0,003	0,002	I	SE	IN
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	25,0	5,0	3,2	0,20	0,09	0,06	0,04	ET	E	OP2
<i>Arca boucardi</i>	8,3	0,4	0,4	0,02	0,45	0,47	0,21	MT	SE	ES
<i>Aricidea catherinae</i>	8,3	0,4	0,4	0,02	0,002	0,002	0,001	MT	SE	ES
<i>Asterina pectinifera</i>	16,7	0,8	0,6	0,03	12,83	9,19	5,94	–	–	IN
<i>Axinopsida subquadrata</i>	33,3	8,8	7,7	0,34	0,06	0,05	0,03	MT	E	IN
<i>Balanus rostratus</i>	8,3	3,8	3,9	0,15	91,62	95,69	42,40	MT	SE	T
<i>Bathymedon tilesii</i>	8,3	0,4	0,4	0,02	0,002	0,002	0,001	–	–	IN
<i>Bispira</i> sp.	8,3	0,4	0,4	0,02	0,10	0,11	0,05	–	–	ES
<i>Brada</i> sp.	8,3	0,4	0,4	0,02	0,02	0,02	0,01	–	–	ES
<i>Byblis gaimardi</i>	8,3	0,4	0,4	0,02	0,003	0,003	0,001	–	–	ES
<i>Cerebratulus</i> sp.	8,3	0,4	0,4	0,02	0,54	0,57	0,25	–	–	T
<i>Chaetozone setosa</i>	58,3	70,4	38,4	2,77	0,88	0,41	0,41	ET	E	T
<i>Cheilonereis</i> sp.	25,0	6,3	4,8	0,25	0,25	0,20	0,12	ET	SE	OP1
<i>Chone</i> sp.	41,7	3,8	1,6	0,15	0,13	0,06	0,06	T	E	IN
<i>Crangon amurensis</i>	25,0	1,7	1,0	0,07	0,48	0,46	0,22	T	E	ES
<i>Cryptonatica janthostoma</i>	25,0	2,1	1,2	0,08	0,95	0,92	0,44	I	SE	ES
<i>Diastylis alaskensis</i>	8,3	1,7	1,7	0,07	0,00	0,00	0,00	T	SE	IN
<i>Echinocardium cordatum</i>	8,3	0,4	0,4	0,02	4,14	4,32	1,91	I	S	ES
<i>Edwardsia japonica</i>	8,3	0,4	0,4	0,02	0,25	0,26	0,11	MT	SE	T
<i>Ennucula tenuis</i>	91,7	94,2	28,7	3,71	7,85	2,92	3,63	T	E	IN
<i>Eulalia bilineata</i>	16,7	0,8	0,6	0,03	0,02	0,02	0,01	T	E	IN
Gastropoda fam. gen. sp.	8,3	0,8	0,9	0,03	0,07	0,08	0,03	I	SE	–
<i>Glycera capitata</i>	83,3	35,4	14,8	1,39	0,85	0,34	0,39	T	E	IN
<i>Glycera</i> sp.	8,3	0,4	0,4	0,02	0,01	0,01	0,01	I	SE	IN
<i>Goniada maculata</i>	91,7	25,8	7,7	1,02	0,48	0,12	0,22	MT	E	IN
<i>Harmothoe</i> sp.	16,7	0,8	0,6	0,03	0,03	0,02	0,01	T	E	IN
<i>Laonice cirrata</i>	41,7	6,7	3,9	0,26	0,53	0,29	0,25	I	S	IN
Lineidae gen. sp.	50,0	3,8	1,3	0,15	0,75	0,36	0,35	I	E	IN
«<i>Lumbrineris longifolia</i>»	100,0	71,3	23,7	2,81	1,70	0,97	0,79	T	E	IN
<i>Macoma tokyoensis</i>	8,3	0,8	0,9	0,03	0,30	0,31	0,14	MT	SE	IN
<i>Magelona longicornis</i>	16,7	0,8	0,6	0,03	0,02	0,01	0,01	T	E	IN
<i>Maldane sarsi</i>	75,0	475,8	316,1	18,74	6,99	2,12	3,24	T	E	IN
<i>Mediomastus californiensis</i>	8,3	0,4	0,4	0,02	0,006	0,007	0,003	MT	E	T
<i>Melinna elisabethae</i>	50,0	27,1	14,2	1,07	1,01	0,54	0,47	T	E	T
<i>Meriochele oculata</i>	25,0	2,9	1,6	0,11	0,04	0,02	0,02	–	–	–
<i>Metasychis gotoi</i>	8,3	0,4	0,4	0,02	0,49	0,51	0,23	–	–	IN
<i>Mizuhopecten yessoensis</i>	16,7	0,8	0,6	0,03	10,75	10,87	4,97	–	–	ES

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Monoculodes crassirostris</i>	8,3	1,7	1,7	0,07	0,003	0,003	0,002	–	–	ES
<i>Monoculodes</i> sp.	8,3	0,4	0,4	0,02	0,002	0,002	0,001	T	E	IN
<i>Monoculodes zernovi</i>	8,3	0,4	0,4	0,02	0,003	0,003	0,001	I	S	ES
<i>Mya</i> sp.	8,3	0,8	0,9	0,03	0,98	1,02	0,45	MT	E	T
<i>Mya truncata</i>	8,3	0,4	0,4	0,02	6,86	7,17	3,18	T	E	T
Nemertea fam. gen. sp.	16,7	2,5	1,9	0,10	0,10	0,07	0,05	MT	E	T
<i>Neohaustator fortilirata</i>	8,3	0,8	0,9	0,03	2,50	2,61	1,16	S	SE	–
<i>Nereis tigrina</i>	8,3	0,4	0,4	0,02	0,01	0,01	0,01	–	–	T
<i>Notomastus latericeus</i>	25,0	15,0	11,7	0,59	0,25	0,22	0,12	ET	E	IN
<i>Onuphis iridescens</i>	16,7	9,2	8,7	0,36	0,38	0,36	0,17	I	SE	IN
<i>Ophiura sarsii</i>	100,0	151,7	48,4	5,97	20,75	6,90	9,60	MT	E	IN
Orbiniidae gen. sp.	16,7	1,3	0,9	0,05	0,03	0,03	0,02	–	–	–
<i>Orchomenella minuscula</i>	8,3	0,4	0,4	0,02	0,002	0,002	0,001	–	–	IN
<i>Owenia fusiformis</i>	50,0	13,3	5,3	0,53	0,23	0,11	0,11	MT	E	IN
<i>Pagurus brachyomastus</i>	8,3	0,4	0,4	0,02	0,33	0,34	0,15	–	–	IN
<i>Pandalus goniurus</i>	16,7	0,8	0,6	0,03	0,48	0,49	0,22	–	–	IN
<i>Paradorippe granulata</i>	8,3	0,4	0,4	0,02	0,65	0,68	0,30	MT	E	IN
<i>Pectinaria</i> sp.	16,7	1,3	0,9	0,05	0,13	0,12	0,06	–	–	ES
<i>Pherusa plumosa</i>	8,3	0,8	0,9	0,03	0,13	0,13	0,06	T	E	T
<i>Philine orientalis</i>	25,0	2,5	1,8	0,10	0,36	0,26	0,16	T	E	IN
<i>Phoronopsis harmeri</i>	41,7	822,9	574,8	32,4	20,94	14,81	9,69	T	E	T
<i>Plicifusus</i> sp.	8,3	0,4	0,4	0,02	0,01	0,01	0,01	–	–	–
<i>Polydora</i> sp.	41,7	279,2	268,2	10,99	1,23	0,83	0,57	I	E	T
<i>Praxillella gracilis</i>	8,3	0,4	0,4	0,02	0,02	0,02	0,01	I	E	T
<i>Praxillella praetermissa</i>	50,0	192,5	106,4	7,58	2,47	1,20	1,14	MT	E	T
<i>Praxillella</i> sp.	8,3	1,7	1,7	0,07	0,03	0,03	0,01	I	SE	T
<i>Priapulius caudatus</i>	25,0	3,8	2,4	0,15	0,48	0,43	0,22	T	E	T
<i>Protocallithaca adamsi</i>	25,0	2,1	1,2	0,08	0,80	0,56	0,37	MT	E	T
<i>Protomedeia epimerata</i>	33,3	2,5	1,2	0,10	0,03	0,02	0,01	MT	SE	ES
<i>Protomedeia</i> sp.	8,3	0,4	0,4	0,02	0,002	0,002	0,001	S	S	IN
Sabellidae gen. sp.	8,3	0,8	0,9	0,03	0,06	0,06	0,03	MT	SE	ES
<i>Scalibregma inflatum</i>	25,0	5,8	3,5	0,23	1,15	0,75	0,53	T	E	T
<i>Schistomeringos japonica</i>	16,7	1,7	1,3	0,07	0,010	0,008	0,005	ET	E	OP1
<i>Scoloplos armiger</i>	91,7	106,7	33,4	4,20	4,85	1,66	2,25	MT	E	T
<i>Sigambra bassi</i>	58,3	17,9	10,9	0,71	0,36	0,24	0,17	T	E	OP2
Sipuncula fam. gen. sp.	8,3	0,8	0,9	0,03	0,05	0,06	0,03	MT	SE	ES
Spionidae gen. sp.	16,7	5,0	4,4	0,20	0,10	0,08	0,05	MT	E	T
<i>Spiophanes bombyx</i>	33,3	11,7	6,6	0,46	0,14	0,07	0,06	I	E	IN
<i>Sternaspis scutata</i>	8,3	3,3	3,5	0,13	0,25	0,26	0,12	S	S	T
Terebellidae gen. sp.	8,3	0,4	0,4	0,02	0,01	0,01	0,01	MT	SE	T
<i>Yoldia johanni</i>	16,7	1,3	0,9	0,05	0,15	0,13	0,07	S	S	ES
9. « <i>Lumbrineris longifolia</i> » + <i>Sigambra bassi</i>										
Actiniaria fam. gen. sp.	13,3	699,9	362,4	41,54	0,03	0,02	0,02	MT	E	IN
<i>Alveinus ojanus</i>	6,7	248,5	53,5	14,75	0,001	0,001	0,001	S	S	ES
<i>Ampelisca macrocephala</i>	6,7	81,4	28,0	4,83	0,0003	0,0003	0,0002	MT	E	ES
Ampharetidae gen. sp.	46,7	69,8	29,0	4,14	0,03	0,01	0,02	S	SE	T
<i>Anonyx pavlovskii</i>	6,7	66,1	65,7	3,92	0,0002	0,0002	0,0001	–	–	IN

Продолжение таблицы А.1

Таксон	<i>Fq</i>	<i>A</i> , экз./м ²	<i>SE</i>	<i>A</i> , %	<i>B</i> , г/м ²	<i>SE</i>	<i>B</i> , %	<i>Cont</i>	<i>Bion</i>	<i>Eutr</i>
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	60,0	58,5	32,8	3,47	5,16	2,69	3,69	ET	E	OP2
<i>Apoprionospio nova</i>	6,7	51,6	14,3	3,06	0,003	0,003	0,002	–	–	–
<i>Arca boucardi</i>	6,7	48,8	9,8	2,90	0,80	0,80	0,57	MT	SE	ES
<i>Aricidea catherinae</i>	33,3	36,5	16,7	2,17	0,01	0,01	0,01	MT	SE	ES
Ascidia fam. gen. sp.	20,1	31,7	12,1	1,88	0,29	0,17	0,21	MT	SE	T
<i>Asterias amurensis</i>	13,3	23,0	7,1	1,37	1,52	1,51	1,09	ET	SE	OP2
<i>Axinopsida subquadrata</i>	20,0	22,9	18,4	1,36	0,002	0,001	0,001	MT	E	IN
<i>Bela erosa</i>	20,1	19,1	13,7	1,13	0,06	0,03	0,04	MT	E	IN
Brachiura fam. gen. sp.	6,7	14,7	3,8	0,87	0,001	0,001	0,001	–	–	–
<i>Brada villosa</i>	6,7	13,5	8,9	0,80	0,07	0,07	0,05	–	–	ES
<i>Cancer amphioeticus</i>	13,3	12,1	12,1	0,72	0,003	0,002	0,002	–	–	IN
<i>Cancer</i> sp.	13,3	11,0	8,7	0,66	0,02	0,02	0,02	–	–	IN
<i>Capitella capitata</i>	20,0	9,7	5,3	0,58	0,02	0,01	0,01	ET	E	OP1
Capitellidae gen. sp.	86,7	9,2	4,0	0,55	0,16	0,03	0,11	MT	SE	OP1
<i>Cerebratulus marginatus</i>	20,0	8,5	5,9	0,50	0,44	0,25	0,31	MT	SE	T
<i>Cerebratulus</i> sp.	13,3	7,8	3,7	0,46	0,32	0,23	0,23	–	–	T
Ceriantharia gen. sp.	13,3	7,0	3,9	0,41	0,02	0,02	0,01	–	–	ES
<i>Chaetozone setosa</i>	6,7	6,2	5,9	0,37	0,36	0,36	0,26	ET	E	T
<i>Cirratulus cirratus</i>	20,0	6,1	1,8	0,36	19,02	19,01	13,62	T	E	T
<i>Cistenides</i> sp.	6,7	6,1	6,1	0,36	0,001	0,001	0,001	–	–	ES
<i>Corophium ascherusicum</i>	13,3	4,8	4,6	0,28	0,004	0,004	0,003	–	–	–
<i>Corophium</i> sp.	6,7	4,6	3,4	0,27	0,02	0,02	0,01	–	–	T
<i>Crangon dalli</i>	6,7	4,1	4,1	0,24	0,04	0,04	0,03	–	–	IN
<i>Crangon</i> sp.	13,3	3,6	3,6	0,22	0,05	0,05	0,03	S	SE	ES
Cucumariidae gen. sp.	6,7	3,5	1,7	0,21	0,41	0,41	0,29	I	S	ES
Cumacea fam. gen. sp.	53,5	3,3	1,6	0,19	0,02	0,01	0,01	S	SE	ES
Decapoda fam. gen. sp.	66,8	3,3	1,2	0,19	0,08	0,03	0,06	S	SE	IN
<i>Diastylis goodsiri</i>	20,0	3,2	2,3	0,19	0,06	0,06	0,04	MT	S	IN
<i>Diastylis rathkei</i>	13,3	3,1	1,1	0,18	0,003	0,003	0,002	–	–	–
<i>Dipolydora cardalia</i>	73,5	3,0	1,1	0,18	0,48	0,19	0,35	T	E	OP2
<i>Dosinia angulosa</i>	6,7	2,9	1,9	0,17	11,49	11,49	8,23	–	–	ES
<i>Edwardsia japonica</i>	20,0	2,7	1,4	0,16	0,86	0,75	0,62	MT	SE	T
<i>Ennucula tenuis</i>	13,3	1,2	0,8	0,07	0,09	0,07	0,06	T	E	IN
<i>Erimacrus isenbeckii</i>	6,7	2,5	2,2	0,15	0,01	0,01	0,00	–	–	ES
<i>Eteone longa</i>	6,7	2,4	2,4	0,14	0,01	0,01	0,01	T	E	T
<i>Euchone</i> sp.	13,3	2,2	2,2	0,13	0,001	0,001	0,001	–	–	IN
Eunicidae gen. sp.	6,7	2,1	1,1	0,13	0,06	0,06	0,05	–	–	IN
<i>Gaetice depressus</i>	13,3	2,1	1,1	0,13	0,002	0,002	0,002	MT	SE	ES
Gammaridae fam. gen. sp.	26,7	1,8	1,0	0,10	0,01	0,01	0,01	–	–	ES
<i>Glycera capitata</i>	20,1	1,8	1,2	0,10	0,02	0,01	0,02	T	E	IN
<i>Glycera rouxii</i>	6,7	1,7	1,3	0,10	0,20	0,20	0,15	–	–	–
<i>Glycera</i> sp.	40,0	1,5	1,1	0,09	0,25	0,17	0,18	I	SE	IN
<i>Glycera tessellata</i>	26,7	1,5	1,5	0,09	0,90	0,41	0,64	S	S	IN
<i>Glycinde armigera</i>	13,3	1,5	1,5	0,09	0,006	0,004	0,004	MT	E	IN
<i>Goniada maculata</i>	6,7	1,5	1,5	0,09	0,006	0,006	0,004	MT	E	IN
<i>Hemigrapsus penicillatus</i>	6,7	1,5	0,8	0,09	0,01	0,01	0,01	–	–	IN
<i>Hubrechtella</i> sp.	6,7	1,4	0,7	0,08	0,002	0,002	0,001	–	–	T

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Ischyrocerus</i> sp.	6,7	1,3	1,0	0,08	0,004	0,004	0,003	–	–	IN
<i>Laonice cirrata</i>	20,0	1,2	0,8	0,07	0,02	0,01	0,01	I	S	IN
<i>Laonice</i> sp.	13,3	1,2	0,5	0,07	0,01	0,00	0,00	S	SE	T
<i>Leucon nasica</i>	13,3	1,1	0,6	0,06	0,01	0,01	0,01	–	–	IN
<i>Lilljeborgia serratooides</i>	6,7	1,1	0,7	0,06	0,0003	0,0003	0,0002	–	–	ES
<i>Limnoria</i> sp.	6,7	1,1	0,9	0,06	0,0002	0,0002	0,0001	–	–	T
«Lumbrineris longifolia»	100,0	1,1	0,9	0,06	0,98	0,27	0,70	T	E	IN
<i>Macoma incongrua</i>	20,0	0,9	0,8	0,05	1,99	1,37	1,42	MT	S	IN
<i>Macoma orientalis</i>	20,0	0,9	0,6	0,05	15,26	12,96	10,93	–	–	IN
<i>Macoma tokyoensis</i>	20,1	0,9	0,5	0,05	5,15	3,65	3,69	MT	SE	IN
<i>Magelona longicornis</i>	46,7	0,9	0,9	0,05	0,23	0,12	0,16	T	E	IN
Majidae gen. sp.	6,7	0,9	0,9	0,05	0,00	0,00	0,00	–	–	–
<i>Maldane sarsi</i>	60,1	0,8	0,4	0,04	1,52	0,59	1,09	T	E	IN
<i>Mediomastus californiensis</i>	20,0	0,8	0,5	0,04	0,07	0,04	0,05	MT	E	T
<i>Melita</i> sp.	6,7	0,8	0,6	0,04	0,004	0,004	0,003	–	–	IN
<i>Modiolus difficilis</i>	6,7	0,6	0,6	0,04	0,95	0,95	0,68	–	–	ES
<i>Mya pseudoarenaria</i>	20,0	0,6	0,4	0,03	0,79	0,78	0,57	T	E	T
<i>Mya</i> sp.	6,7	0,5	0,5	0,03	0,05	0,05	0,04	MT	E	T
<i>Neanthes</i> sp.	6,7	0,5	0,3	0,03	0,01	0,01	0,01	–	–	T
Nemertea fam. gen. sp.	80,0	0,5	0,2	0,03	0,35	0,15	0,25	MT	E	T
<i>Nephtys caeca</i>	6,7	0,5	0,3	0,03	0,25	0,25	0,18	S	S	IN
<i>Nephtys ciliata</i>	6,7	0,5	0,3	0,03	0,006	0,006	0,004	–	–	IN
<i>Nephtys</i> sp.	6,7	0,5	0,3	0,03	0,001	0,001	0,001	I	SE	IN
<i>Nereis</i> sp.	20,0	0,5	0,3	0,03	0,25	0,24	0,18	ET	E	T
<i>Nereis zonata</i>	6,7	0,5	0,2	0,03	0,58	0,58	0,41	MT	SE	T
<i>Notomastus latericeus</i>	33,3	0,5	0,3	0,03	0,08	0,04	0,05	ET	E	IN
<i>Obelia longissima</i>	6,7	1,4	1,2	0,08	1,71	1,66	1,22	–	–	IN
<i>Odius kelleri</i>	6,7	0,5	0,5	0,03	0,0002	0,0002	0,0001	T	E	–
<i>Onuphis iridescens</i>	13,3	0,5	0,5	0,03	0,01	0,01	0,01	I	SE	IN
<i>Ophiura sarsii</i>	26,7	0,5	0,5	0,03	1,34	0,75	0,96	MT	E	IN
<i>Ophiura</i> sp.	6,7	0,4	0,4	0,02	0,20	0,20	0,14	MT	E	IN
<i>Oratosquilla oratoria</i>	6,7	0,4	0,4	0,02	0,04	0,04	0,03	–	–	ES
Pantopoda fam. gen. sp.	6,7	0,4	0,4	0,02	0,00	0,00	0,00	–	–	–
<i>Paradorippe granulata</i>	53,4	0,4	0,4	0,02	1,89	1,81	1,36	MT	E	IN
Paraonidae gen. sp.	13,3	0,4	0,2	0,02	0,01	0,01	0,01	–	–	IN
<i>Paraphoxus simplex</i>	6,7	0,4	0,2	0,02	0,0002	0,0002	0,0001	–	–	IN
<i>Paraphoxus simplex</i>	6,7	0,4	0,2	0,02	0,0003	0,0003	0,0002	–	–	IN
<i>Pherusa plumosa</i>	20,0	0,4	0,2	0,02	0,07	0,05	0,05	T	E	T
<i>Philine argentata</i>	80,1	0,3	0,3	0,02	0,75	0,27	0,54	T	E	IN
<i>Philine</i> sp.	13,3	0,3	0,2	0,02	0,007	0,005	0,005	S	E	IN
<i>Pholoe minuta</i>	26,7	0,3	0,3	0,02	0,01	0,01	0,01	MT	SE	IN
<i>Phoronopsis harmeri</i>	33,3	0,3	0,3	0,02	4,10	2,74	2,93	T	E	T
<i>Phyllodoce groenlandica</i>	6,7	0,3	0,2	0,02	0,02	0,02	0,01	MT	E	OP2
<i>Phyllodoce maculata</i>	6,7	0,3	0,3	0,02	0,002	0,002	0,001	–	–	IN
<i>Pinnixa rathbuni</i>	40,0	0,3	0,3	0,02	0,16	0,10	0,12	T	E	ES
<i>Pleusymtes</i> sp.	6,7	0,3	0,2	0,02	0,002	0,002	0,002	–	–	T
Polynoidae gen. sp.	53,4	0,3	0,3	0,02	0,12	0,05	0,09	MT	S	ES

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Pontoporeia femorata</i>	6,7	0,3	0,3	0,02	0,003	0,003	0,002	–	–	–
<i>Potamilla reniformis</i>	13,3	0,3	0,2	0,02	3,69	3,63	2,64	T	SE	IN
<i>Priapulus caudatus</i>	6,7	0,2	0,2	0,01	0,32	0,32	0,23	T	E	T
<i>Prionospio malmgreni</i>	6,7	0,2	0,2	0,01	0,0002	0,0002	0,0001	ET	E	OP2
<i>Protocallithaca adamsi</i>	13,3	13,4	7,3	0,80	3,70	3,62	2,65	MT	E	T
<i>Protomedeia popovi</i>	13,5	0,2	0,2	0,01	0,002	0,001	0,001	S	S	IN
<i>Protomedeia</i> sp.	6,7	0,2	0,2	0,01	0,001	0,001	0,001	S	S	IN
<i>Raeta pulchella</i>	33,3	0,2	0,2	0,01	0,03	0,02	0,02	S	E	T
Sabellidae gen. sp.	20,1	0,2	0,2	0,01	0,05	0,03	0,03	MT	SE	ES
<i>Scalibregma inflatum</i>	86,7	0,2	0,2	0,01	6,51	4,43	4,66	T	E	T
<i>Scalibregma robusta</i>	6,7	0,2	0,2	0,01	0,002	0,002	0,001	–	–	T
<i>Scapharca broughtoni</i>	13,3	0,2	0,2	0,01	38,98	38,93	27,91	–	–	OP2
<i>Schistomeringos japonica</i>	53,3	0,2	0,2	0,01	0,24	0,08	0,17	ET	E	OP1
<i>Scolecopsis fuliginosa</i>	6,7	0,2	0,2	0,01	0,003	0,003	0,002	–	–	–
<i>Scolecopsis</i> sp.	26,7	0,2	0,2	0,01	0,05	0,03	0,04	MT	E	T
<i>Scoloplos armiger</i>	33,4	0,2	0,2	0,01	0,48	0,31	0,34	MT	E	T
<i>Sigambra bassi</i>	100,1	0,2	0,2	0,01	0,75	0,29	0,54	T	E	OP2
Sipuncula fam. gen. sp.	13,3	0,2	0,2	0,01	0,17	0,16	0,12	MT	SE	ES
<i>Spiophanes berkeleyorum</i>	40,1	0,2	0,2	0,01	0,06	0,03	0,04	MT	SE	T
<i>Spiophanes bombyx</i>	33,3	0,2	0,2	0,01	0,02	0,01	0,02	I	E	IN
<i>Spirontocaris</i> sp.	6,7	0,2	0,2	0,01	0,06	0,06	0,04	–	–	–
<i>Suavodrilla kennicottii</i>	6,7	0,2	0,2	0,01	0,19	0,19	0,13	–	–	ES
Syllidae gen. sp.	6,7	0,2	0,2	0,01	0,01	0,01	0,01	S	S	–
<i>Syllis</i> sp.	6,7	0,2	0,2	0,01	0,002	0,002	0,002	–	–	IN
<i>Synandwakia</i> sp.	20,0	0,2	0,2	0,01	1,20	0,71	0,86	–	–	T
<i>Synchelidium bulytschevae</i>	6,7	0,2	0,2	0,01	0,0002	0,0002	0,0001	–	–	ES
<i>Theora lubrica</i>	100,0	0,2	0,2	0,01	0,24	0,10	0,17	T	E	T
<i>Thysanocardia</i> sp.	13,3	0,2	0,2	0,01	0,07	0,06	0,05	–	–	ES
<i>Tritia acutidentata</i>	6,7	0,2	0,2	0,01	0,03	0,03	0,02	–	–	IN
<i>Tritodynamia rathbuni</i>	13,3	0,2	0,2	0,01	0,38	0,38	0,27	–	–	IN
Turbonillidae gen. sp.	6,7	0,2	0,2	0,01	0,0006	0,0006	0,0004	–	–	–
<i>Upogebia issaeffi</i>	6,7	0,1	0,1	0,00	0,003	0,003	0,002	–	–	ES
13. « <i>Lumbrineris longifolia</i> »										
Actiniaria fam. gen. sp.	15,4	1,5	0,3	0,04	0,08	0,02	0,03	MT	E	IN
<i>Alveinus ojanus</i>	15,4	8,5	1,9	0,26	0,018	0,004	0,006	S	S	ES
<i>Ampharete acutifrons</i>	7,7	0,8	0,2	0,02	0,03	0,01	0,01	–	–	IN
Amphipoda fam. gen. sp.	7,7	0,7	0,2	0,02	0,0007	0,0002	0,0002	–	–	–
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	23,1	2,9	0,5	0,09	0,06	0,01	0,02	ET	E	OP2
<i>Aricidea uschakovi</i>	61,5	18,0	1,8	0,55	0,26	0,03	0,09	–	–	ES
<i>Athenaria</i> sp.	38,5	10,0	1,3	0,31	0,08	0,01	0,03	–	–	IN
<i>Balanus crenatus</i>	7,7	0,8	0,2	0,02	0,15	0,05	0,05	–	–	IN
<i>Balanus rostratus</i>	7,7	1,0	0,3	0,03	1,94	0,58	0,69	MT	SE	T
<i>Bela erosa</i>	7,7	0,8	0,2	0,02	0,12	0,03	0,04	MT	E	IN
<i>Capitella capitata</i>	84,6	402,4	77,6	12,33	1,19	0,20	0,42	ET	E	OP1
Capitellidae gen. sp.	15,4	30,3	6,4	0,93	0,11	0,03	0,04	MT	SE	OP1
<i>Cerebratulus marginatus</i>	15,4	1,5	0,3	0,05	0,16	0,03	0,06	MT	SE	T
<i>Cistenides hyperborea</i>	7,7	1,0	0,3	0,03	0,23	0,07	0,08	MT	S	ES

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Crassikorophium crassicorne</i>	100,0	191,5	13,6	5,87	0,27	0,02	0,09	–	–	T
<i>Diastilys alaskensis</i>	7,7	0,8	0,2	0,02	0,014	0,004	0,005	T	SE	IN
<i>Diastylopsis dawsoni</i>	69,2	32,1	5,1	0,98	0,05	0,01	0,02	MT	S	OP2
<i>Dimorphostylis asiatica</i>	23,1	5,6	1,2	0,17	0,007	0,001	0,003	–	–	ES
<i>Dipolydora cardalia</i>	7,7	0,8	0,2	0,02	0,004	0,001	0,001	T	E	OP2
<i>Dosinia penicillata</i>	15,4	2,3	0,5	0,07	39,28	9,69	13,90	–	–	ES
<i>Edwardsia japonica</i>	76,9	39,9	2,6	1,22	3,79	0,31	1,34	MT	SE	T
<i>Glycera capitata</i>	7,7	0,8	0,2	0,02	0,06	0,02	0,02	T	E	IN
<i>Glycera rouxii</i>	53,8	9,2	0,9	0,28	2,21	0,23	0,78	–	–	–
<i>Glycinde armigera</i>	7,7	0,3	0,1	0,01	0,01	0,00	0,00	MT	E	IN
<i>Luidia quinaria</i>	7,7	0,8	0,2	0,02	12,69	3,81	4,49	–	–	ES
«<i>Lumbrineris longifolia</i>»	100,0	828,3	55,2	25,38	4,51	0,30	1,60	T	E	IN
<i>Macoma incongrua</i>	7,7	1,5	0,5	0,05	2,73	0,82	0,97	MT	S	IN
<i>Macoma</i> sp.	7,7	0,8	0,2	0,02	0,02	0,01	0,01	T	E	IN
<i>Macoma tokyoensis</i>	23,1	2,7	0,5	0,08	11,38	2,60	4,03	MT	SE	IN
<i>Maetra veneriformis</i>	7,7	1,0	0,3	0,03	0,57	0,17	0,20	–	–	–
<i>Magelona berkeleyi</i>	15,4	2,3	0,5	0,07	0,12	0,03	0,04	–	–	IN
<i>Maldane sarsi</i>	53,8	10,9	1,2	0,33	0,91	0,10	0,32	T	E	IN
<i>Melanochlamys diomedea</i>	15,4	1,9	0,5	0,06	0,08	0,02	0,03	MT	S	ES
<i>Menestho exarata</i>	23,1	2,7	0,5	0,08	0,02	0,00	0,01	MT	S	ES
<i>Metridium senile fimbriatum</i>	7,7	0,8	0,2	0,02	150,00	45,07	53,06	–	–	IN
<i>Monoculodes diamesus</i>	7,7	0,8	0,2	0,02	0,002	0,001	0,001	MT	S	OP2
<i>Monoculodes</i> sp.	15,4	1,1	0,2	0,03	0,0022	0,0005	0,0008	T	E	IN
Mysidacea gen. sp.	15,4	1,5	0,3	0,05	0,0015	0,0003	0,0005	–	–	–
<i>Nassarius multigranosus</i>	15,4	3,8	0,9	0,12	1,28	0,35	0,45	MT	S	OP2
<i>Nectoneanthes latipoda</i>	15,4	2,3	0,5	0,07	0,07	0,01	0,02	–	–	T
Nemertea fam. gen. sp.	15,4	6,5	1,3	0,20	0,04	0,01	0,01	MT	E	T
Nereidae gen. sp.	23,1	5,2	1,2	0,16	0,10	0,02	0,04	T	E	OP2
Oenopotinae gen. sp.	7,7	0,7	0,2	0,02	0,07	0,02	0,02	–	–	–
<i>Orchomenella</i> sp.	7,7	0,8	0,2	0,02	0,0008	0,0002	0,0003	S	S	IN
<i>Pectinaria</i> sp.	7,7	2,1	0,6	0,06	0,33	0,10	0,12	–	–	ES
<i>Philine argenata</i>	61,5	15,5	1,9	0,48	1,95	0,26	0,69	T	E	IN
<i>Phyllodoce</i> sp.	23,1	3,1	0,5	0,09	0,03	0,01	0,01	–	–	IN
Phyllodocidae gen. sp.	30,8	6,0	1,2	0,18	0,018	0,003	0,007	–	–	IN
Polynoidae gen. sp.	7,7	4,6	1,4	0,14	0,008	0,002	0,003	MT	S	ES
<i>Potamocorbula amurensis</i>	38,5	1429,3	424,6	43,80	28,44	8,00	10,06	MT	S	OP1
<i>Prionospio</i> sp.	7,7	2,3	0,7	0,07	0,35	0,10	0,12	MT	E	IN
<i>Protocallithaca adamsi</i>	7,7	0,8	0,2	0,02	0,13	0,04	0,05	MT	E	T
<i>Protomedeia</i> sp.	15,4	1,5	0,3	0,05	0,005	0,001	0,002	S	S	IN
<i>Pseudopolydora achaeta</i>	15,4	3,8	0,9	0,12	0,03	0,01	0,01	–	–	OP2
<i>Raeta pulchella</i>	23,1	2,6	0,5	0,08	0,25	0,05	0,09	S	E	T
<i>Retusa</i> sp.	7,7	3,1	0,9	0,09	0,02	0,01	0,01	–	–	IN
<i>Scolelepis</i> sp.	38,5	8,3	1,4	0,25	0,11	0,02	0,04	MT	E	T
<i>Setia candida</i>	30,8	4,6	0,7	0,14	0,04	0,01	0,01	–	–	ES
<i>Sigambra bassi</i>	69,2	58,0	9,0	1,78	0,15	0,02	0,05	T	E	OP2
Spionidae gen. sp.	23,1	3,8	0,7	0,12	0,05	0,01	0,02	MT	E	T
<i>Spiophanes berkeleyorum</i>	38,5	11,1	1,7	0,34	0,18	0,03	0,06	MT	SE	T

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Squilla oratoria</i>	7,7	0,8	0,2	0,02	8,50	2,55	3,01	–	–	–
<i>Synandwakia</i> sp.	38,5	8,4	1,4	0,26	6,29	0,97	2,23	MT	S	T
<i>Theora fragilis</i>	38,5	51,9	8,7	1,59	0,98	0,16	0,35	–	–	–
<i>Tylorrhynchus osawai</i>	7,7	1,5	0,5	0,05	0,15	0,04	0,05	–	–	T
<i>16. Scoloplos armiger + Ophiura sarsii</i>										
<i>Ampelisca macrocephala</i>	9,1	2,4	2,5	0,60	0,02	0,02	0,02	MT	E	ES
<i>Ampharete reducta</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	0,01	0,01	0,01	–	–	T
Ampharetidae gen. sp.	9,1	1,2	1,3	0,30	0,07	0,07	0,07	S	SE	T
<i>Anaitis polynoides</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	0,05	0,05	0,05	–	–	–
<i>Asabellides sibirica</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	0,02	0,02	0,02	T	SE	ES
<i>Bela erosa</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	0,06	0,06	0,06	MT	E	IN
Capitellidae sp.	9,1	1,2	1,3	0,30	0,10	0,10	0,11	MT	SE	OP1
<i>Cerebratulus marginatus</i>	36,4	7,3	3,5	1,80	4,96	3,36	5,28	MT	SE	T
Cirratulidae gen. sp.	9,1	1,2	1,3	0,30	0,08	0,08	0,08	T	S	OP2
<i>Diastilys</i> sp.	9,1	1,2	1,3	0,30	0,01	0,01	0,01	I	S	IN
<i>Ennucula tenuis</i>	81,8	52,1	17,7	12,87	4,11	1,09	4,38	T	E	IN
<i>Eteone longa</i>	9,1	4,8	5,1	1,20	0,09	0,10	0,10	T	E	T
<i>Eulalia bilineata</i>	27,3	6,1	3,9	1,50	0,41	0,39	0,44	T	E	IN
<i>Glycera capitata</i>	27,3	6,1	3,9	1,50	0,12	0,10	0,13	T	E	IN
<i>Glycera chirori</i>	27,3	3,6	2,0	0,90	1,05	0,69	1,12	T	S	IN
<i>Glycera</i> sp.	18,2	2,4	1,7	0,60	0,04	0,04	0,04	I	SE	IN
<i>Glycinde armigera</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	0,03	0,04	0,04	MT	E	IN
<i>Goniada maculata</i>	63,6	32,7	12,0	8,08	2,63	1,23	2,80	MT	E	IN
<i>Goniada</i> sp.	9,1	1,2	1,3	0,30	0,02	0,02	0,02	–	–	IN
<i>Halosydna brevisetosa</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	0,24	0,25	0,26	–	–	IN
<i>Halosydna</i> sp.	36,4	30,3	18,2	7,48	2,53	1,36	2,70	T	S	IN
<i>Heteromastus filiformis</i>	9,1	2,4	2,5	0,60	0,01	0,01	0,01	–	–	OP2
<i>Heteromastus giganteus</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	0,02	0,02	0,02	T	S	OP2
<i>Lumbrineris fragilis</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	0,08	0,09	0,09	–	–	IN
<i>Lumbrineris japonica</i>	27,3	21,8	15,1	5,39	1,99	2,03	2,12	T	SE	IN
« <i>Lumbrineris longifolia</i> »	45,5	33,9	23,7	8,38	0,25	0,19	0,26	T	E	IN
<i>Lumbrineris</i> sp.	54,5	7,3	2,2	1,80	0,19	0,12	0,20	T	E	IN
<i>Macoma calcarea</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	8,88	9,32	9,46	MT	S	IN
<i>Macoma crassula</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	0,62	0,65	0,66	–	–	T
<i>Macoma scarlatoii</i>	9,1	0,9	1,0	0,22	23,42	24,56	24,94	ET	SE	T
<i>Maldane sarsii</i>	54,5	67,9	43,2	16,76	6,45	3,25	6,87	T	E	IN
Maldanidae sp.	27,3	4,8	2,8	1,20	0,63	0,39	0,67	I	E	ES
Mysidacea fam. gen. sp.	9,1	1,2	1,3	0,30	0,03	0,03	0,03	–	–	–
<i>Myxicola</i> sp.	18,2	8,5	7,6	2,10	0,28	0,25	0,30	–	–	IN
<i>Nectocrangon lar lar</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	0,69	0,72	0,74	–	–	–
<i>Nereis zonata</i>	27,3	3,6	2,0	0,90	0,15	0,11	0,16	MT	SE	T
<i>Nicolea</i> sp.	36,4	9,7	5,4	2,39	0,62	0,33	0,66	MT	S	IN
<i>Onuphis iridescens</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	0,02	0,02	0,02	I	SE	IN
<i>Ophiura sarsii</i>	90,9	167,3	73,5	41,30	23,78	9,38	25,32	MT	E	IN
<i>Pherusa plumosa</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	0,49	0,51	0,52	T	E	T
<i>Philine scalpta</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	0,08	0,09	0,09	–	–	IN
<i>Phyllodoce citrina</i>	27,3	3,6	2,0	0,90	1,22	0,68	1,30	–	–	IN

Продолжение таблицы А.1

Таксон	<i>Fq</i>	<i>A</i> , экз./м ²	<i>SE</i>	<i>A</i> , %	<i>B</i> , г/м ²	<i>SE</i>	<i>B</i> , %	<i>Cont</i>	<i>Bion</i>	<i>Eutr</i>
<i>Phyllodoce maculata</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	0,06	0,06	0,06	–	–	IN
<i>Potamilla</i> sp.	36,4	33,9	19,4	8,38	2,79	2,08	2,97	–	–	IN
<i>Praxillella praetermissa</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	0,05	0,05	0,05	MT	E	T
<i>Sabella aulaconota</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	0,08	0,09	0,09	–	–	–
Sabellidae gen. sp.	9,1	1,2	1,3	0,30	0,004	0,004	0,004	MT	SE	ES
<i>Scalibregma inflatum</i>	9,1	50,9	53,4	12,57	4,50	4,72	4,79	T	E	T
<i>Scoloplos armiger</i>	90,9	106,7	23,8	26,34	8,74	2,44	9,31	MT	E	T
Terebellidae gen. sp.	18,2	2,4	1,7	0,60	0,06	0,05	0,06	MT	SE	T
<i>Yoldia keppeliana</i>	9,1	1,2	1,3	0,30	2,04	2,14	2,17	MT	S	ES
<i>23. Ophiura sarsii + Acila insignis</i>										
<i>Acila insignis</i>	100,0	223,8	75,8	6,34	25,96	11,14	6,23	S	SE	–
Actiniaria fam. gen. sp.	12,5	0,6	0,7	0,02	0,01	0,01	0,00	MT	E	IN
<i>Ampelisca macrocephala</i>	25,0	3,8	2,8	0,11	0,04	0,03	0,01	MT	E	ES
<i>Ampharete</i> sp.	50,0	18,1	13,1	0,51	0,59	0,34	0,14	MT	E	IN
Ampharetidae gen. sp.	12,5	0,6	0,7	0,02	0,01	0,01	0,00	S	SE	T
<i>Amphiodia fissa</i>	50,0	4,4	2,1	0,12	1,42	0,76	0,34	I	SE	IN
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	12,5	2,5	2,7	0,07	0,04	0,04	0,01	ET	E	OP2
<i>Arca boucardi</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,61	0,65	0,15	MT	SE	ES
<i>Aricidea catherinae</i>	37,5	10,6	6,1	0,30	0,26	0,17	0,06	MT	SE	ES
<i>Asabellides sibirica</i>	12,5	1,3	1,3	0,04	0,02	0,02	0,00	T	SE	ES
<i>Asabellides sibirica</i>	25,0	2,5	2,0	0,07	0,03	0,03	0,01	T	SE	ES
Ascidia fam. gen. sp.	12,5	0,6	0,7	0,02	0,03	0,03	0,01	MT	SE	T
<i>Asterina pectinifera</i>	12,5	1,9	2,0	0,05	46,71	49,94	11,20	–	–	IN
<i>Axinopsida subquadrata</i>	25,0	7,5	7,3	0,21	0,12	0,13	0,03	MT	E	IN
<i>Balanus rostratus</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,13	0,13	0,03	MT	SE	T
<i>Bathymedon obtusifrons</i>	12,5	2,5	2,7	0,07	0,00	0,00	0,00	–	–	–
<i>Bispira</i> sp.	12,5	0,6	0,7	0,02	0,53	0,56	0,13	–	–	ES
Bivalvia fam. gen. sp.	12,5	0,6	0,7	0,02	0,01	0,01	0,00	–	–	–
<i>Brada</i> sp.	12,5	3,1	3,3	0,09	0,19	0,21	0,05	–	–	ES
<i>Brada villosa</i>	12,5	1,3	1,3	0,04	0,04	0,05	0,01	–	–	ES
<i>Chaetozone setosa</i>	37,5	38,1	20,8	1,08	0,55	0,30	0,13	ET	E	T
<i>Chone cincta</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,02	0,02	0,00	ET	S	OP2
<i>Chone</i> sp.	25,0	1,3	0,9	0,04	0,06	0,04	0,01	T	E	IN
<i>Cirratulus cirratus</i>	12,5	1,9	2,0	0,05	0,28	0,30	0,07	T	E	T
<i>Crangon dalli</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,01	0,01	0,00	–	–	IN
<i>Crassicorophium crassicorne</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,00	0,00	0,00	–	–	T
<i>Cryptonatica janthostoma</i>	25,0	1,3	0,9	0,04	0,44	0,43	0,10	I	SE	ES
<i>Cucumaria calcigera</i>	12,5	1,3	1,3	0,04	0,74	0,79	0,18	I	S	ES
<i>Cucumaria fraudatrix</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,09	0,09	0,02	I	S	ES
<i>Derjuginella rufofasciata</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,02	0,02	0,00	–	–	ES
<i>Diastylis alaskensis</i>	25,0	2,5	1,7	0,07	0,00	0,00	0,00	T	SE	IN
<i>Diplodonta</i> sp.	12,5	2,5	2,7	0,07	0,04	0,05	0,01	–	–	–
<i>Dipolydora cardalia</i>	50,0	194,4	114,1	5,50	3,34	1,82	0,80	T	E	OP2
<i>Edwardsia</i> sp.	12,5	0,6	0,7	0,02	0,19	0,20	0,04	–	–	–
<i>Ennucula tenuis</i>	12,5	1,3	1,3	0,04	0,05	0,05	0,01	T	E	IN
<i>Eteone bistriata</i>	37,5	6,3	5,2	0,18	0,13	0,13	0,03	–	–	OP2
<i>Eteone longa</i>	37,5	18,1	14,6	0,51	0,21	0,17	0,05	T	E	T

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Eunoe depressa</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,04	0,04	0,01	–	–	–
<i>Felaniella usta</i>	12,5	2,5	2,7	0,07	0,05	0,06	0,01	I	S	ES
<i>Glebocarcinus amphioetus</i>	12,5	1,3	1,3	0,04	1,68	1,80	0,40	–	–	–
<i>Glycera capitata</i>	87,5	41,3	13,8	1,17	1,27	0,69	0,31	T	E	IN
<i>Glycinde armigera</i>	25,0	8,1	5,7	0,23	0,30	0,22	0,07	MT	E	IN
<i>Goniada maculata</i>	37,5	8,1	5,2	0,23	0,22	0,15	0,05	MT	E	IN
<i>Harmothoe</i> sp.	12,5	1,3	1,3	0,04	0,02	0,02	0,00	T	E	IN
<i>Laonice cirrata</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,03	0,03	0,01	I	S	IN
Lineidae gen. sp.	25,0	1,3	0,9	0,04	1,20	0,84	0,29	I	E	IN
«Lumbrineris longifolia»	100,0	273,1	132,5	7,74	3,07	1,31	0,74	T	E	IN
<i>Macoma calcarea</i>	50,0	6,3	3,0	0,18	149,86	88,45	35,94	MT	S	IN
<i>Macoma incongrua</i>	12,5	1,3	1,3	0,04	0,07	0,08	0,02	MT	S	IN
<i>Macoma</i> sp.	25,0	4,4	4,0	0,12	0,34	0,29	0,08	T	E	IN
<i>Macoma tokyoensis</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,93	0,99	0,22	MT	SE	IN
<i>Maera loveni</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,01	0,01	0,00	–	–	–
<i>Magelona longicornis</i>	37,5	5,0	3,4	0,14	0,21	0,14	0,05	T	E	IN
<i>Maldane sarsi</i>	87,5	373,8	269,9	10,58	19,41	12,17	4,66	T	E	IN
Maldanidae gen. sp.	12,5	70,6	75,5	2,00	0,93	1,00	0,22	I	E	ES
<i>Megayoldia thracieformis</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	9,38	10,02	2,25	–	–	–
<i>Melinna elisabethae</i>	37,5	9,4	7,9	0,27	0,23	0,18	0,06	T	E	T
<i>Mizuhopecten yessoensis</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,11	0,12	0,03	–	–	ES
<i>Monoculodes breviops</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
<i>Mya japonica</i>	37,5	3,1	2,0	0,09	0,28	0,23	0,07	MT	S	ES
<i>Mya</i> sp.	37,5	4,4	3,3	0,12	2,37	2,35	0,57	MT	E	T
<i>Mysella planata</i>	12,5	1,9	2,0	0,05	0,02	0,02	0,00	–	–	–
Nemertea fam. gen. sp.	100,0	29,4	8,2	0,83	25,03	24,74	6,00	MT	E	T
<i>Nephtys</i> sp.	50,0	3,8	1,7	0,11	0,28	0,15	0,07	I	SE	IN
Nereidae gen. sp.	12,5	6,9	7,3	0,19	0,55	0,59	0,13	T	E	OP2
<i>Nereis</i> sp.	25,0	1,3	0,9	0,04	0,18	0,13	0,04	ET	E	OP2
<i>Nicomache</i> sp.	12,5	0,6	0,7	0,02	0,24	0,26	0,06	–	–	IN
<i>Notomastus latericeus</i>	87,5	58,1	28,1	1,65	0,96	0,57	0,23	ET	E	IN
<i>Obelia longissima</i>	25,0	1,3	0,9	0,04	0,09	0,06	0,02	–	–	IN
<i>Oenopota</i> sp.	25,0	3,1	2,2	0,09	0,33	0,27	0,08	T	E	ES
<i>Onuphis iridescens</i>	25,0	38,1	36,4	1,08	1,68	1,68	0,40	I	SE	IN
<i>Ophiura sarsii</i>	100,0	346,3	155,3	9,81	45,59	14,99	10,93	MT	E	IN
Ophiuroidea fam. gen. sp.	25,0	1,3	0,9	0,04	0,07	0,07	0,02	–	–	–
Ostracoda fam. gen. sp.	12,5	0,6	0,7	0,02	0,01	0,01	0,00	–	–	–
<i>Owenia fusiformis</i>	50,0	24,4	16,0	0,69	0,21	0,12	0,05	MT	E	IN
Paguridae gen. sp.	12,5	0,6	0,7	0,02	0,09	0,10	0,02	–	–	–
<i>Pandalus hypsinotus</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,03	0,03	0,01	–	–	IN
<i>Pectinaria granulata</i>	12,5	1,9	2,0	0,05	0,53	0,57	0,13	–	–	–
<i>Pectinaria hyperborea</i>	25,0	11,3	10,6	0,32	0,71	0,63	0,17	MT	SE	ES
<i>Pectinaria</i> sp.	37,5	1,9	1,0	0,05	0,08	0,05	0,02	–	–	ES
<i>Pherusa plumosa</i>	25,0	3,8	3,3	0,11	2,49	2,52	0,60	T	E	T
<i>Philine argentata</i>	62,5	8,1	3,3	0,23	0,64	0,30	0,15	T	E	IN
<i>Pholoe minuta</i>	37,5	5,0	2,7	0,14	0,09	0,05	0,02	MT	SE	IN
<i>Phoronopsis harmeri</i>	12,5	51,9	55,5	1,47	0,81	0,86	0,19	T	E	T

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Phyllodoce groenlandica</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,01	0,01	0,00	MT	E	OP2
Phyllodocidae gen. sp.	25,0	1,3	0,9	0,04	0,01	0,00	0,00	–	–	IN
<i>Pleusymtes uncigera</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,00	0,00	0,00	–	–	–
<i>Plicifusus</i> sp.	12,5	0,6	0,7	0,02	0,13	0,13	0,03	–	–	–
Polynoidae gen. sp.	25,0	2,5	1,7	0,07	0,14	0,13	0,03	MT	S	ES
<i>Pontoporeia affinis</i>	12,5	1,9	2,0	0,05	0,03	0,03	0,01	–	–	–
<i>Pontoporeia furcigera</i>	25,0	1008,8	897,8	28,57	6,37	5,84	1,53	–	–	–
<i>Potamilla</i> sp.	25,0	1,9	1,4	0,05	2,28	1,78	0,55	–	–	IN
<i>Praxillella gracilis</i>	25,0	18,1	14,3	0,51	0,99	0,91	0,24	I	E	T
<i>Praxillella praetermissa</i>	37,5	41,9	24,8	1,19	1,21	0,76	0,29	MT	E	T
<i>Praxillella</i> sp.	62,5	53,1	33,8	1,50	0,97	0,55	0,23	I	SE	T
<i>Priapulus caudatus</i>	12,5	3,1	3,3	0,09	0,12	0,13	0,03	T	E	T
<i>Protomedeia epimerata</i>	37,5	3,8	2,6	0,11	0,02	0,01	0,00	MT	SE	ES
<i>Protomedeia grandimana</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,01	0,01	0,00	–	–	–
<i>Protomedeia</i> sp.	12,5	0,6	0,7	0,02	0,00	0,00	0,00	S	S	IN
<i>Protothaca jedoyensis</i>	50,0	6,3	3,0	0,18	4,24	3,40	1,02	MT	SE	IN
<i>Scalibregma inflatum</i>	62,5	61,3	39,5	1,73	2,25	1,17	0,54	T	E	T
<i>Schistomeringos japonica</i>	37,5	77,5	60,4	2,19	0,90	0,71	0,22	ET	E	OP1
<i>Scoloplos armiger</i>	75,0	60,6	18,8	1,72	4,72	2,97	1,13	MT	E	T
<i>Sigambra bassi</i>	87,5	37,5	11,1	1,06	0,67	0,32	0,16	T	E	OP2
Sipuncula fam. gen. sp.	37,5	10,6	9,9	0,30	0,58	0,56	0,14	MT	SE	ES
<i>Spio</i> sp.	12,5	1,9	2,0	0,05	0,01	0,01	0,00	–	–	T
Spionidae gen. sp.	12,5	3,1	3,3	0,09	0,05	0,05	0,01	MT	E	T
<i>Spiophanes bombyx</i>	37,5	136,9	109,7	3,88	2,44	1,99	0,58	I	E	IN
<i>Sternaspis scutata</i>	12,5	3,1	3,3	0,09	0,22	0,23	0,05	S	S	T
<i>Strongylocentrotus intermedia</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	32,06	34,28	7,69	I	S	ES
<i>Synidotea lata</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Terebellidae gen. sp.	25,0	3,1	2,2	0,09	0,08	0,06	0,02	MT	SE	T
<i>Theora lubrica</i>	12,5	0,6	0,7	0,02	0,02	0,02	0,00	T	E	T
Veneridae gen. sp.	12,5	0,6	0,7	0,02	0,02	0,02	0,00	–	–	ES
<i>Westwoodilla rectangulata</i>	37,5	1,9	1,0	0,05	0,01	0,00	0,00	S	SE	IN
<i>Yoldia keppeliana</i>	37,5	3,1	1,7	0,09	1,05	0,87	0,25	MT	S	ES
<i>Yoldia</i> sp.	12,5	0,6	0,7	0,02	0,00	0,00	0,00	MT	SE	ES
24. « <i>Lumbrineris longifolia</i> » + <i>Ophiura sarsii</i>										
<i>Acila insignis</i>	6,7	0,6	0,6	0,02	0,42	0,43	0,22	S	SE	–
<i>Ampelisca macrocephala</i>	33,3	1,8	0,8	0,06	0,03	0,02	0,02	MT	E	ES
<i>Ampharete</i> sp.	26,7	12,9	6,9	0,41	0,36	0,20	0,19	MT	E	IN
<i>Amphiodia fissa</i>	26,7	3,0	1,7	0,10	2,01	1,63	1,08	I	SE	IN
<i>Anisocorbula venusta</i>	13,3	19,2	19,5	0,62	1,26	1,30	0,68	ET	E	OP2
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	26,7	6,9	4,7	0,22	0,14	0,11	0,08	ET	E	OP2
<i>Aricidea catherinae</i>	53,3	29,4	15,2	0,94	0,42	0,20	0,22	MT	SE	ES
<i>Asabellides sibirica</i>	26,7	316,5	325,9	10,17	1,86	1,91	1,00	T	SE	ES
Ascidia fam. gen. sp.	13,3	0,6	0,4	0,02	1,67	1,32	0,90	MT	SE	T
<i>Asterina pectinifera</i>	13,3	0,6	0,4	0,02	5,45	4,04	2,93	–	–	IN
<i>Axinopsida subquadrata</i>	26,7	5,7	3,4	0,18	0,04	0,02	0,02	MT	E	IN
Bivalvia fam. gen. sp.	6,7	0,3	0,3	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Caprellidae gen. sp.	6,7	6,9	7,1	0,22	0,02	0,02	0,01	I	SE	IN

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
Caudofoveata fam. gen. sp.	6,7	0,3	0,3	0,01	0,01	0,01	0,00	–	–	–
Cerebratulus sp.	13,3	0,9	0,7	0,03	0,46	0,35	0,25	–	–	T
Chaetozone setosa	26,7	67,2	55,8	2,16	0,53	0,36	0,28	ET	E	T
Cheilonereis cyclurus	46,7	14,1	5,7	0,45	0,41	0,16	0,22	ET	SE	OP1
Chone cincta	6,7	0,6	0,6	0,02	0,22	0,22	0,12	ET	S	OP2
Chone sp.	60,0	6,0	2,0	0,19	0,14	0,09	0,07	T	E	IN
Cirratulidae gen. sp.	6,7	0,3	0,3	0,01	0,01	0,01	0,00	T	S	OP2
Collisella sp.	6,7	0,6	0,6	0,02	0,01	0,01	0,01	–	–	–
Crassicorophium crassicorne	13,3	0,6	0,4	0,02	0,00	0,00	0,00	–	–	T
Diastylis alaskensis	40,0	4,5	2,4	0,14	0,02	0,01	0,01	T	SE	IN
Dipolydora cardalia	73,3	1162	1000	37,35	28,32	23,72	15,23	T	E	OP2
Ennucula tenuis	80,0	98,7	30,2	3,17	4,37	1,47	2,35	T	E	IN
Eteone sp.	26,7	2,1	1,1	0,07	0,03	0,01	0,01	–	–	T
Eulalia bilineata	40,0	4,5	2,0	0,14	0,17	0,09	0,09	T	E	IN
Eumida sp.	6,7	0,3	0,3	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	IN
Eumida sanguinea	6,7	0,6	0,6	0,02	0,05	0,05	0,02	–	–	IN
Glycera capitata	86,7	15,0	5,1	0,48	0,57	0,19	0,31	T	E	IN
Glycinde armigera	6,7	0,6	0,6	0,02	0,02	0,02	0,01	MT	E	IN
Goniada maculata	86,7	21,9	5,4	0,70	0,88	0,18	0,47	MT	E	IN
Harmothoe imbricata	26,7	2,1	1,3	0,07	0,06	0,04	0,03	T	E	IN
Harmothoe sp.	20,0	2,1	1,6	0,07	0,05	0,04	0,03	T	E	IN
Lanassa sp.	6,7	0,3	0,3	0,01	0,00	0,00	0,00	S	E	ES
Laonice cirrata	20,0	1,5	0,9	0,05	0,12	0,09	0,06	I	S	IN
Lepidonotus helotypus	6,7	0,3	0,3	0,01	0,01	0,01	0,00	–	–	–
Liocyma fluctuosa	6,7	0,3	0,3	0,01	0,01	0,01	0,01	I	S	ES
«Lumbrineris longifolia»	100,0	266,7	75,8	8,57	6,78	2,78	3,64	T	E	IN
Lyonsia arenosa	20,0	1,2	0,7	0,04	0,78	0,53	0,42	–	–	–
Macoma nipponica	13,3	6,0	4,6	0,19	2,66	2,47	1,43	ET	E	T
Macoma sp.	20,0	17,1	17,0	0,55	0,21	0,19	0,11	T	E	IN
Magelona longicornis	33,3	5,1	2,3	0,16	0,11	0,05	0,06	T	E	IN
Maldane sarsi	93,3	271,8	133,5	8,74	14,24	5,39	7,65	T	E	IN
Melinna elisabethae	60,0	30,3	18,2	0,97	0,85	0,46	0,46	T	E	T
Melita sp.	20,0	3,6	2,6	0,12	0,02	0,01	0,01	–	–	IN
Mizuhopecten yessoensis	6,7	0,3	0,3	0,01	0,35	0,36	0,19	–	–	ES
Modiolus difficilis	6,7	0,9	0,9	0,03	0,32	0,34	0,17	–	–	ES
Monoculodes breviops	6,7	0,3	0,3	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
Monoculodes latimanus	6,7	0,3	0,3	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
Musculus sp.	6,7	0,3	0,3	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Mya truncata	13,3	0,9	0,7	0,03	1,81	1,47	0,97	T	E	T
Mya uzenensis	40,0	12,9	5,0	0,41	3,42	1,77	1,84	T	SE	T
Nebalia nemurensis	6,7	0,3	0,3	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Nemertea fam. gen. sp.	100,0	41,7	17,8	1,34	2,95	0,94	1,59	MT	E	T
Nephtys sp.	13,3	0,9	0,7	0,03	0,19	0,14	0,10	I	SE	IN
Nereis sp.	20,0	1,2	0,7	0,04	0,05	0,03	0,03	ET	E	OP2
Nereis vexillosa	20,0	0,9	0,5	0,03	0,28	0,23	0,15	ET	SE	–
Notomastus latericeus	60,0	23,7	16,7	0,76	0,36	0,25	0,20	ET	E	IN
Obesotoma sp.	6,7	2,7	2,8	0,09	0,26	0,26	0,14	–	–	ES

Продолжение таблицы А.1

Таксон	<i>Fq</i>	<i>A</i> , экз./м ²	<i>SE</i>	<i>A</i> , %	<i>B</i> , г/м ²	<i>SE</i>	<i>B</i> , %	<i>Cont</i>	<i>Bion</i>	<i>Eutr</i>
<i>Onuphis iridescens</i>	13,3	0,6	0,4	0,02	0,08	0,06	0,04	I	SE	IN
<i>Ophelina acuminata</i>	13,3	0,6	0,4	0,02	0,11	0,09	0,06	I	SE	T
<i>Ophiura sarsii</i>	100,0	159,9	62,5	5,14	20,51	5,51	11,03	MT	E	IN
<i>Owenia fusiformis</i>	20,0	4,5	2,7	0,14	0,33	0,27	0,18	MT	E	IN
<i>Pectinaria granulata</i>	6,7	0,9	0,9	0,03	0,21	0,22	0,11	–	–	–
<i>Pectinaria hyperborea</i>	20,0	3,9	2,3	0,13	0,86	0,63	0,46	MT	SE	ES
<i>Pectinaria</i> sp.	20,0	1,8	1,1	0,06	0,44	0,36	0,24	–	–	ES
<i>Pherusa plumosa</i>	20,0	7,2	6,2	0,23	1,29	1,12	0,70	T	E	T
<i>Philine argentata</i>	46,7	4,8	2,2	0,15	2,00	1,05	1,07	T	E	IN
<i>Pholoe minuta</i>	13,3	1,2	1,0	0,04	0,02	0,01	0,01	MT	SE	IN
<i>Phoronopsis harmeri</i>	6,7	1,5	1,6	0,05	0,03	0,03	0,02	T	E	T
<i>Photys</i> sp.	6,7	0,3	0,3	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	–
<i>Phyllodoce costanea</i>	6,7	0,3	0,3	0,01	0,14	0,14	0,07	–	–	–
<i>Phyllodoce groenlandica</i>	6,7	0,3	0,3	0,01	0,00	0,00	0,00	MT	E	OP2
<i>Phyllodoce</i> sp.	6,7	0,3	0,3	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	IN
Phyllodocidae gen. sp.	20,0	2,4	1,4	0,08	0,02	0,01	0,01	–	–	IN
Pilargiidae gen. sp.	13,3	0,9	0,7	0,03	0,01	0,01	0,01	–	–	IN
<i>Pinnixa rathbuni</i>	20,0	1,2	0,7	0,04	0,39	0,36	0,21	T	E	ES
<i>Pleusymtes</i> sp.	13,3	2,1	1,6	0,07	0,00	0,00	0,00	–	–	T
<i>Polydora</i> sp.	6,7	0,3	0,3	0,01	0,01	0,01	0,00	I	E	T
Polynoidae gen. sp. 1	6,7	0,9	0,9	0,03	0,04	0,04	0,02	–	–	ES
Polynoidae gen. sp. 2	6,7	0,6	0,6	0,02	0,01	0,01	0,00	–	–	ES
Polynoidae gen. sp. 3	6,7	0,6	0,6	0,02	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
Polynoidae gen. sp. 4	26,7	2,4	1,3	0,08	0,20	0,11	0,10	ET	SE	ES
<i>Potamilla reniformis</i>	6,7	0,3	0,3	0,01	1,22	1,26	0,65	T	SE	IN
<i>Potamilla</i> sp.	6,7	0,6	0,6	0,02	0,03	0,03	0,01	–	–	IN
<i>Praxillella gracilis</i>	20,0	23,1	17,0	0,74	0,66	0,47	0,35	I	E	T
<i>Praxillella praetermissa</i>	13,3	1,8	1,3	0,06	0,09	0,06	0,05	MT	E	T
<i>Praxillella</i> sp.	40,0	6,9	3,5	0,22	0,13	0,06	0,07	I	SE	T
<i>Priapulius caudatus</i>	6,7	0,3	0,3	0,01	0,01	0,01	0,00	T	E	T
<i>Prionospio</i> sp.	20,0	0,9	0,5	0,03	0,01	0,01	0,01	MT	E	IN
<i>Protocallithaca adamsi</i>	46,7	9,9	4,8	0,32	38,71	39,62	20,82	MT	E	T
<i>Pteraster</i> sp.	6,7	0,3	0,3	0,01	0,22	0,22	0,12	–	–	–
<i>Raeta pulchella</i>	26,7	4,8	2,7	0,15	0,54	0,36	0,29	S	E	T
<i>Rocinela maculata</i>	6,7	0,3	0,3	0,01	0,08	0,08	0,04	–	–	IN
<i>Scalibregma inflatum</i>	66,7	101,7	53,6	3,27	17,11	5,45	9,20	T	E	T
<i>Schistomeringos japonica</i>	40,0	15,3	7,3	0,49	0,17	0,08	0,09	ET	E	OP1
<i>Scoloplos armiger</i>	80,0	97,8	28,5	3,14	6,11	2,30	3,28	MT	E	T
<i>Sigambra bassi</i>	80,0	14,7	5,3	0,47	0,21	0,09	0,11	T	E	OP2
Sipuncula fam. gen. sp.	33,3	2,4	1,1	0,08	0,05	0,03	0,03	MT	SE	ES
<i>Spio goniocephala</i>	6,7	0,3	0,3	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Spionidae gen. sp.	13,3	2,1	1,9	0,07	0,02	0,02	0,01	MT	E	T
<i>Spiophanes bombyx</i>	53,3	123,6	84,5	3,97	2,92	2,36	1,57	I	E	IN
<i>Synidotea cinerea</i>	6,7	0,3	0,3	0,01	0,02	0,02	0,01	T	SE	T
Terebellidae gen. sp.	6,7	0,3	0,3	0,01	0,00	0,00	0,00	MT	SE	T
<i>Terebellides stroemii</i>	6,7	0,9	0,9	0,03	0,41	0,43	0,22	–	–	ES
<i>Thracia itoi</i>	6,7	1,5	1,6	0,05	4,75	4,92	2,56	–	–	ES

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Thracia kakumana</i>	6,7	0,3	0,3	0,01	0,03	0,03	0,01	–	–	–
<i>Turbonilla</i> sp.	6,7	0,6	0,6	0,02	0,01	0,01	0,00	–	–	ES
7. «Lumbrineris longifolia» + Echinocardium cordatum										
<i>Acila insignis</i>	22,2	0,7	0,5	0,14	0,13	0,13	0,10	S	SE	–
Actiniaria fam. gen. sp.	11,1	0,3	0,4	0,07	0,04	0,05	0,03	MT	E	IN
<i>Alveinus ojanus</i>	22,2	2,2	1,9	0,46	0,01	0,00	0,00	S	S	ES
<i>Ampharete</i> sp.	22,2	1,1	0,8	0,22	0,01	0,01	0,01	MT	E	IN
Ampharetidae gen. sp.	22,2	0,9	0,6	0,18	0,00	0,00	0,00	S	SE	T
<i>Amphiodia fissa</i>	77,8	19,5	8,7	4,03	2,15	0,74	1,72	I	SE	IN
<i>Anonyx</i> sp.	22,2	2,1	1,5	0,43	0,02	0,02	0,02	I	SE	IN
<i>Arcturus crenulatus</i>	11,1	3,3	3,5	0,69	0,03	0,04	0,03	–	–	IN
<i>Asterias amurensis</i>	11,1	0,7	0,7	0,14	0,01	0,01	0,00	ET	SE	OP2
<i>Axinopsida subquadrata</i>	11,1	0,7	0,8	0,15	0,01	0,01	0,00	MT	E	IN
<i>Axiothella catenata</i>	11,1	0,3	0,4	0,07	0,10	0,11	0,08	–	–	ES
<i>Bela erosa</i>	22,2	1,0	0,8	0,21	0,27	0,19	0,21	MT	E	IN
<i>Byblis</i> sp.	11,1	0,3	0,4	0,07	0,00	0,00	0,00	S	S	ES
<i>Cadella lubrica</i>	33,3	1,4	0,8	0,30	0,05	0,04	0,04	S	S	ES
Capitellidae gen. sp.	11,1	0,3	0,4	0,07	0,00	0,00	0,00	MT	SE	OP1
Caprellidae gen. sp.	11,1	1,3	1,4	0,28	0,00	0,00	0,00	I	SE	IN
<i>Carinoma</i> sp.	22,2	2,3	2,1	0,48	0,05	0,04	0,04	–	–	T
<i>Carinomella</i> sp.	22,2	1,4	1,2	0,30	0,04	0,04	0,03	S	S	ES
<i>Cerebratulus</i> sp.	22,2	2,4	1,8	0,50	0,17	0,12	0,14	–	–	T
<i>Chaetozone setosa</i>	55,6	17,3	9,1	3,58	0,14	0,07	0,11	ET	E	T
Cirratulidae gen. sp.	11,1	0,3	0,4	0,07	0,00	0,00	0,00	T	S	OP2
<i>Cistenides</i> sp.	22,2	1,7	1,4	0,35	0,15	0,14	0,12	–	–	ES
<i>Cymatoica orientalis</i>	11,1	0,4	0,4	0,08	0,19	0,21	0,16	MT	S	T
Decapoda fam. gen. sp.	11,1	0,7	0,8	0,15	0,09	0,09	0,07	S	SE	IN
<i>Derjuginella rufofasciata</i>	11,1	0,4	0,4	0,08	0,03	0,04	0,03	–	–	ES
<i>Diastylis</i> sp.	88,9	10,1	2,7	2,08	0,02	0,01	0,02	I	S	IN
<i>Diplodonta semiosperoides</i>	33,3	1,4	0,8	0,28	0,01	0,00	0,01	I	S	IN
<i>Dipolydora cardalia</i>	33,3	2,2	1,3	0,46	0,03	0,02	0,02	T	E	OP2
<i>Echinarachnius parma</i>	11,1	1,6	1,7	0,32	0,45	0,48	0,36	I	S	ES
<i>Echinocardium cordatum</i>	55,6	4,8	2,1	1,00	68,80	38,18	54,97	I	S	ES
<i>Eohaustorius eous eous</i>	22,2	0,7	0,5	0,14	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
<i>Eteone</i> sp.	11,1	0,4	0,4	0,08	0,02	0,02	0,01	–	–	T
Gastropoda fam. gen. sp. 1	44,4	4,7	2,9	0,98	0,27	0,19	0,22	I	SE	–
Gastropoda fam. gen. sp. 2	11,1	1,3	1,4	0,28	0,06	0,06	0,05	I	SE	–
Gastropoda fam. gen. sp. 3	11,1	1,0	1,1	0,21	0,03	0,03	0,02	I	SE	–
<i>Glycera capitata</i>	44,4	25,9	16,5	5,37	0,60	0,35	0,48	T	E	IN
<i>Glycera</i> sp.	55,6	18,5	8,6	3,84	0,20	0,11	0,16	I	SE	IN
<i>Glycinde armigera</i>	11,1	3,3	3,5	0,69	0,00	0,00	0,00	MT	E	IN
<i>Goniada maculata</i>	88,9	20,8	9,2	4,31	0,38	0,14	0,31	MT	E	IN
<i>Grandifoxus longirostris</i>	44,4	18,4	14,8	3,80	0,03	0,02	0,03	I	S	ES
<i>Grandifoxus robustus</i>	11,1	0,7	0,8	0,15	0,01	0,01	0,01	I	S	ES
Holothuroidea fam. gen. sp.	11,1	0,3	0,4	0,07	0,04	0,05	0,03	S	S	ES
<i>Hoplonemertea</i> sp.	11,1	0,7	0,8	0,15	0,07	0,08	0,06	–	–	IN
Lineidae gen. sp.	33,3	2,9	1,8	0,60	0,13	0,12	0,10	I	E	IN

Продолжение таблицы А.1

Таксон	<i>Fq</i>	<i>A</i> , экз./м ²	<i>SE</i>	<i>A</i> , %	<i>B</i> , г/м ²	<i>SE</i>	<i>B</i> , %	<i>Cont</i>	<i>Bion</i>	<i>Eutr</i>
«Lumbrineris longifolia»	55,6	130,1	59,0	26,95	0,97	0,59	0,77	T	E	IN
<i>Lumbrineris</i> sp.	33,3	20,8	16,4	4,31	1,52	0,91	1,21	T	E	IN
<i>Macoma nipponica</i>	11,1	0,4	0,4	0,08	0,05	0,05	0,04	ET	E	T
<i>Macoma</i> sp.	11,1	0,4	0,4	0,08	0,00	0,00	0,00	T	E	IN
<i>Maetra chinensis</i>	22,2	1,7	1,4	0,35	0,03	0,03	0,02	I	S	ES
<i>Magelona longicornis</i>	11,1	1,0	1,1	0,21	0,01	0,01	0,01	T	E	IN
<i>Maldane sarsi</i>	33,3	1,4	0,8	0,30	0,03	0,03	0,02	T	E	IN
Maldanidae gen. sp.	66,7	3,2	1,0	0,66	0,11	0,06	0,09	I	E	ES
<i>Margarites picturata</i>	22,2	1,4	1,2	0,30	0,01	0,00	0,00	–	–	IN
<i>Melinna</i> sp.	11,1	0,5	0,6	0,11	0,01	0,01	0,01	–	–	T
<i>Melita</i> sp.	11,1	0,7	0,8	0,15	0,00	0,00	0,00	–	–	IN
<i>Mercenaria stimpsoni</i>	22,2	5,1	3,7	1,06	33,22	35,22	26,54	–	–	IN
<i>Monoculodes pallidus</i>	11,1	0,3	0,4	0,07	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
<i>Monoculodes</i> sp.	11,1	0,4	0,4	0,08	0,00	0,00	0,00	T	E	IN
<i>Monoculodes zernovi</i>	11,1	0,4	0,4	0,08	0,00	0,00	0,00	I	S	ES
<i>Nephtys caeca</i>	22,2	1,1	0,8	0,22	0,10	0,10	0,08	S	S	IN
<i>Nephtys ciliata</i>	11,1	2,2	2,3	0,46	1,43	1,52	1,14	–	–	IN
<i>Nephtys longosetosa</i>	22,2	1,3	0,9	0,26	0,19	0,19	0,15	I	S	IN
<i>Nipponomysella obesa</i>	11,1	0,4	0,4	0,08	0,00	0,00	0,00	–	–	T
<i>Olivella borealis</i>	22,2	2,0	1,6	0,41	0,26	0,23	0,21	–	–	ES
<i>Onuphis iridescens</i>	44,4	16,9	10,3	3,51	2,14	1,61	1,71	I	SE	IN
<i>Onuphis</i> sp.	44,4	3,1	1,4	0,64	0,15	0,09	0,12	I	S	IN
<i>Ophelina acuminata</i>	22,2	1,7	1,2	0,36	0,22	0,16	0,18	I	SE	T
<i>Ophiura sarsii</i>	66,7	14,6	7,1	3,03	1,04	0,66	0,83	MT	E	IN
<i>Philine</i> sp.	44,4	5,1	2,9	1,06	0,47	0,32	0,38	S	E	IN
<i>Phyllodoce groenlandica</i>	33,3	2,7	2,1	0,56	0,24	0,16	0,19	MT	E	OP2
Phyllodocidae gen. sp.	22,2	1,0	0,8	0,21	0,01	0,00	0,01	–	–	IN
<i>Pontogeneia rostrata</i>	22,2	0,7	0,5	0,14	0,00	0,00	0,00	I	S	IN
<i>Praxillella gracilis</i>	44,4	9,0	4,4	1,87	0,59	0,45	0,47	I	E	T
<i>Praxillella praetermissa</i>	22,2	1,7	1,4	0,35	0,18	0,18	0,14	MT	E	T
<i>Praxillella</i> sp.	11,1	0,7	0,8	0,15	0,04	0,04	0,03	I	SE	T
<i>Priapulus caudatus</i>	11,1	0,4	0,4	0,08	0,01	0,01	0,01	T	E	T
<i>Prionospio</i> sp.	22,2	2,2	1,9	0,46	0,03	0,03	0,02	MT	E	IN
<i>Rocinela maculata</i>	11,1	0,3	0,4	0,07	0,00	0,00	0,00	–	–	IN
<i>Scoloplos armiger</i>	66,7	12,7	7,5	2,63	0,09	0,06	0,08	MT	E	T
<i>Siliqua alta</i>	33,3	1,4	0,8	0,29	6,10	5,72	4,87	I	S	IN
Sipuncula fam. gen. sp.	44,4	2,2	1,0	0,45	0,20	0,11	0,16	MT	SE	ES
<i>Solamen leanum</i>	11,1	0,4	0,4	0,08	0,00	0,00	0,00	–	–	IN
<i>Solen krusensterni</i>	22,2	0,7	0,5	0,14	0,13	0,14	0,11	I	S	I
Solenogastres fam. gen. sp.	22,2	1,0	0,8	0,21	0,07	0,07	0,06	I	SE	I
<i>Spio</i> sp.	11,1	0,4	0,4	0,08	0,00	0,00	0,00	–	–	T
Spionidae gen. sp.	33,3	2,1	1,2	0,43	0,01	0,01	0,01	MT	E	T
<i>Spiophanes berkeleyorum</i>	11,1	3,7	3,9	0,76	0,01	0,01	0,01	MT	SE	T
<i>Spiophanes bombyx</i>	55,6	30,8	13,0	6,38	0,18	0,07	0,14	I	E	IN
<i>Synchelidium bulytschevae</i>	11,1	1,5	1,6	0,30	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
<i>Synidotea epimerata</i>	33,3	1,1	0,6	0,22	0,01	0,01	0,01	S	S	–
Terebellidae gen. sp.	11,1	0,4	0,4	0,08	0,06	0,06	0,04	MT	SE	T

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Urothoe orientalis</i>	11,1	6,0	6,4	1,24	0,01	0,01	0,00	–	–	ES
<i>Yoldia johanni</i>	11,1	0,7	0,8	0,15	0,39	0,42	0,31	S	S	ES
8. <i>Ampelisca macrocephala</i>										
Actiniaria fam. gen. sp.	25,0	2,0	1,8	0,08	0,04	0,02	0,03	MT	E	IN
<i>Ampelisca macrocephala</i>	87,5	859,2	619,8	33,86	9,24	7,19	7,45	MT	E	ES
<i>Ampharete acutifrons</i>	25,0	0,8	0,5	0,03	0,98	1,04	0,79	–	–	IN
<i>Ampharete</i> sp.	25,0	0,8	0,5	0,03	0,02	0,01	0,01	MT	E	IN
<i>Amphiodia fissa</i>	87,5	41,7	14,0	1,64	8,38	7,00	6,75	I	SE	IN
<i>Anonyx</i> sp.	50,0	21,9	14,6	0,86	0,35	0,15	0,28	I	SE	IN
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	50,0	43,1	29,4	1,70	3,46	2,90	2,78	ET	E	OP2
<i>Aphrodita</i> sp.	12,5	0,8	0,8	0,03	1,88	2,01	1,51	S	S	ES
Aphroditidae gen. sp.	50,0	7,9	4,9	0,31	0,46	0,30	0,37	S	S	OP2
Ascidia fam. gen. sp.	12,5	0,8	0,8	0,03	1,93	2,06	1,55	MT	SE	T
<i>Astarte borealis</i>	12,5	0,4	0,4	0,01	10,20	10,90	8,22	–	–	ES
<i>Axinopsida subquadrata</i>	75,0	12,3	4,9	0,48	0,46	0,45	0,37	MT	E	IN
<i>Bathymedon</i> sp.	12,5	0,4	0,4	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	IN
<i>Bela erosa</i>	12,5	1,7	1,8	0,07	0,01	0,01	0,01	MT	E	IN
<i>Byblis</i> sp.	75,0	143,1	78,6	5,64	1,96	1,18	1,58	S	S	ES
Capitellidae gen. sp.	12,5	1,5	1,6	0,06	0,00	0,00	0,00	MT	SE	OP1
Caprellidae gen. sp.	87,5	366,1	102,8	14,43	0,57	0,17	0,46	I	SE	IN
<i>Carinomella</i> sp.	25,0	3,8	2,7	0,15	0,08	0,06	0,07	S	S	ES
<i>Cerebratulus signatus</i>	50,0	5,3	2,8	0,21	0,28	0,14	0,23	–	–	T
<i>Cerebratulus</i> sp.	25,0	7,9	5,6	0,31	0,90	0,67	0,73	–	–	T
<i>Chaetozone setosa</i>	12,5	1,1	1,2	0,04	0,01	0,01	0,01	ET	E	T
<i>Chirimia punctata</i>	37,5	3,0	1,8	0,12	2,01	1,79	1,62	–	–	IN
<i>Cistenides brevicoma</i>	12,5	1,7	1,8	0,07	0,66	0,71	0,53	–	–	ES
<i>Corophium</i> sp.	25,0	2,4	1,9	0,10	0,01	0,00	0,00	–	–	T
<i>Crassicorophium crassicorne</i>	37,5	10,9	9,1	0,43	0,03	0,03	0,03	MT	S	T
<i>Cryptonatica janthostoma</i>	12,5	0,8	0,9	0,03	0,14	0,15	0,11	I	SE	ES
<i>Cryptonatica</i> sp.	12,5	0,4	0,4	0,01	0,01	0,01	0,01	I	S	IN
Cucumariidae gen. sp.	12,5	0,4	0,4	0,02	0,15	0,16	0,12	I	S	ES
<i>Cymatoica orientalis</i>	12,5	0,4	0,4	0,01	0,11	0,12	0,09	MT	S	T
<i>Derjuginella rufofasciata</i>	12,5	1,5	1,6	0,06	0,39	0,41	0,31	I	E	ES
<i>Derjuginella rufofasciata</i>	25,0	1,8	1,4	0,07	0,03	0,02	0,02	–	–	ES
<i>Diastylis</i> sp.	87,5	132,0	51,9	5,20	0,83	0,49	0,67	I	S	IN
<i>Diplodonta semiosperoides</i>	12,5	2,1	2,2	0,08	0,01	0,01	0,01	I	S	IN
<i>Dulichia</i> sp.	12,5	0,8	0,8	0,03	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
<i>Echinarachnius parma</i>	12,5	0,8	0,8	0,03	0,08	0,09	0,06	I	S	ES
<i>Echinocardium cordatum</i>	25,0	1,1	0,8	0,04	8,20	8,21	6,61	I	S	ES
Echiurida fam. gen. sp.	12,5	0,8	0,8	0,03	24,03	25,69	19,36	–	–	ES
<i>Echiurus echiurus</i>	37,5	9,0	6,4	0,35	5,83	3,50	4,70	–	–	ES
<i>Ennucula tenuis</i>	25,0	2,3	1,7	0,09	0,04	0,03	0,03	T	E	IN
<i>Eteone spetsbergensis</i>	12,5	0,4	0,4	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	T
<i>Eulalia bilineata</i>	25,0	0,9	0,7	0,04	0,02	0,02	0,02	T	E	IN
<i>Euspira pallida</i>	25,0	0,8	0,5	0,03	0,04	0,03	0,03	–	–	IN
Gammaridae fam. gen. sp.	12,5	1,1	1,2	0,04	0,01	0,01	0,01	–	–	ES
Gastropoda fam. gen. sp. 1	25,0	3,1	2,4	0,12	0,05	0,03	0,04	I	SE	–

Продолжение таблицы А.1

Таксон	<i>Fq</i>	<i>A</i> , экз./м ²	<i>SE</i>	<i>A</i> , %	<i>B</i> , г/м ²	<i>SE</i>	<i>B</i> , %	<i>Cont</i>	<i>Bion</i>	<i>Eutr</i>
Gastropoda fam. gen. sp. 2	12,5	0,4	0,4	0,01	0,00	0,00	0,00	I	SE	–
Gastropoda fam. gen. sp. 3	12,5	1,1	1,2	0,04	0,01	0,01	0,01	I	SE	–
Gastropoda fam. gen. sp. 4	25,0	16,9	16,7	0,67	0,06	0,05	0,05	I	SE	–
Gastropoda fam. gen. sp. 5	12,5	0,4	0,4	0,01	0,00	0,00	0,00	I	SE	–
<i>Glycera capitata</i>	62,5	25,3	13,1	1,00	0,51	0,26	0,41	T	E	IN
<i>Glycera</i> sp.	62,5	27,0	14,6	1,06	0,36	0,25	0,29	I	SE	IN
<i>Glycinde armigera</i>	25,0	1,9	1,6	0,07	0,01	0,01	0,01	MT	E	IN
<i>Goniada maculata</i>	87,5	72,0	22,7	2,84	2,09	0,73	1,69	MT	E	IN
<i>Grandifoxus longirostris</i>	25,0	3,0	2,2	0,12	0,01	0,01	0,01	I	S	ES
<i>Grandifoxus robustus</i>	25,0	0,8	0,5	0,03	0,01	0,00	0,00	I	S	ES
Harpacticoida fam. gen. sp.	12,5	0,4	0,4	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	–
<i>Hoplonemertea</i> sp.	12,5	0,6	0,6	0,02	0,01	0,01	0,01	–	–	IN
<i>Hyppomedon granulosus</i>	12,5	0,4	0,4	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	–
<i>Laonice cirrata</i>	62,5	6,4	2,7	0,25	0,77	0,38	0,62	I	S	IN
Lineidae gen. sp.	50,0	8,4	4,4	0,33	0,30	0,13	0,25	I	E	IN
<i>Lineus</i> sp.	12,5	0,8	0,8	0,03	0,02	0,02	0,02	I	E	T
<i>Liocyma fluctuosa</i>	37,5	1,1	0,6	0,04	0,11	0,09	0,09	I	S	ES
<i>Lumbrineris longifolia</i>	75,0	19,5	10,4	0,77	0,35	0,18	0,28	T	E	IN
<i>Lumbrineris</i> sp.	37,5	3,4	2,7	0,13	1,19	0,82	0,96	T	E	IN
Lysianassidae gen. sp.	25,0	2,1	1,8	0,08	0,02	0,02	0,02	–	–	ES
<i>Macoma</i> sp.	12,5	1,1	1,2	0,04	0,02	0,02	0,02	T	E	IN
<i>Magelona longicornis</i>	25,0	9,8	10,0	0,38	0,23	0,24	0,19	T	E	IN
<i>Maldane sarsi</i>	62,5	15,4	8,7	0,61	0,47	0,29	0,37	T	E	IN
<i>Maldanella antarctica</i>	12,5	0,6	0,6	0,02	0,07	0,08	0,06	–	–	OP1
Maldanidae gen. sp.	25,0	3,0	2,2	0,12	0,02	0,02	0,02	I	E	ES
<i>Melinna elisabethae</i>	12,5	0,8	0,8	0,03	0,04	0,04	0,03	T	E	T
<i>Melita dentata</i>	12,5	0,4	0,4	0,01	0,02	0,02	0,02	–	–	ES
<i>Melita</i> sp.	12,5	0,6	0,6	0,02	0,00	0,00	0,00	–	–	IN
<i>Metasychis gotoi</i>	12,5	1,9	2,0	0,07	0,64	0,68	0,51	–	–	IN
<i>Monocorophium acherusicum</i>	12,5	1,5	1,6	0,06	0,00	0,00	0,00	–	–	T
<i>Monoculodes latimanus</i>	25,0	1,5	1,2	0,06	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
<i>Monoculodes semenovi</i>	12,5	0,8	0,8	0,03	0,01	0,01	0,00	–	–	ES
<i>Monoculodes zernovi</i>	25,0	1,1	0,8	0,04	0,01	0,01	0,01	I	S	ES
<i>Mya truncata</i>	12,5	0,4	0,4	0,01	1,48	1,58	1,19	T	E	T
<i>Mysella</i> sp.	12,5	0,4	0,4	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	T
<i>Mysella ventricosa</i>	12,5	4,9	5,2	0,19	0,03	0,03	0,02	–	–	T
Nemertea fam. gen. sp.	37,5	3,1	1,9	0,12	1,05	0,87	0,84	MT	E	T
<i>Neohaustator fortilirata</i>	12,5	0,8	0,8	0,03	0,03	0,03	0,02	S	SE	–
<i>Nephtys caeca</i>	37,5	8,3	4,6	0,33	0,82	0,55	0,66	S	S	IN
<i>Nephtys longosetosa</i>	37,5	1,6	0,9	0,06	0,13	0,07	0,10	I	S	IN
<i>Nereis</i> sp.	25,0	0,8	0,5	0,03	0,02	0,01	0,01	ET	E	OP2
<i>Nicomache lumbricalis</i>	12,5	1,1	1,2	0,04	0,06	0,06	0,05	–	–	IN
<i>Nipponnemertes arenaria</i>	25,0	4,5	3,2	0,18	0,41	0,30	0,33	–	–	IN
<i>Onisimus normani</i>	12,5	0,4	0,4	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	–
<i>Onuphis iridescens</i>	37,5	8,3	6,0	0,33	1,16	0,77	0,93	I	SE	IN
<i>Onuphis</i> sp.	12,5	0,4	0,4	0,02	0,00	0,00	0,00	I	S	IN
Opheliidae gen. sp.	12,5	0,4	0,4	0,01	0,01	0,01	0,00	–	–	–

Продолжение таблицы А.1

Таксон	<i>Fq</i>	<i>A</i> , экз./м ²	<i>SE</i>	<i>A</i> , %	<i>B</i> , г/м ²	<i>SE</i>	<i>B</i> , %	<i>Cont</i>	<i>Bion</i>	<i>Eutr</i>
<i>Ophelina acuminata</i>	50,0	9,6	4,5	0,38	0,45	0,26	0,36	I	SE	T
<i>Ophiura sarsii</i>	75,0	57,6	21,6	2,27	17,79	17,23	14,33	MT	E	IN
<i>Oratosquilla oratoria</i>	12,5	0,4	0,4	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
<i>Orchomenella japonica</i>	12,5	0,8	0,8	0,03	0,00	0,00	0,00	–	–	IN
<i>Orchomenella pinguis</i>	25,0	3,5	2,8	0,14	0,01	0,01	0,01	–	–	IN
<i>Orchomenella</i> sp.	37,5	19,9	10,4	0,78	0,04	0,02	0,03	S	S	IN
<i>Owenia fusiformis</i>	62,5	108,0	51,1	4,26	1,03	0,64	0,83	MT	E	IN
<i>Paranaitis polynoides</i>	75,0	5,7	2,6	0,22	0,24	0,11	0,19	S	S	IN
<i>Pherusa plumosa</i>	25,0	1,9	1,6	0,07	0,20	0,20	0,16	T	E	T
<i>Philine</i> sp.	37,5	3,8	2,2	0,15	0,28	0,17	0,22	S	E	IN
<i>Pholoe minuta</i>	75,0	6,5	1,8	0,26	0,03	0,01	0,02	MT	SE	IN
<i>Phoronopsis harmeri</i>	25,0	1,5	1,2	0,06	0,02	0,01	0,01	T	E	T
<i>Photys reinhardi</i>	12,5	0,4	0,4	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
<i>Phyllodoce groenlandica</i>	87,5	9,3	3,2	0,37	0,90	0,30	0,73	MT	E	OP2
<i>Pleustes incarinatus</i>	25,0	0,8	0,5	0,03	0,00	0,00	0,00	–	–	–
<i>Pleusymtes glaber</i>	12,5	0,4	0,4	0,01	0,01	0,01	0,00	–	–	IN
<i>Pleusymtes</i> sp.	62,5	8,3	3,6	0,33	0,01	0,00	0,01	–	–	T
<i>Polydora</i> sp.	12,5	0,4	0,4	0,02	0,01	0,01	0,01	I	E	T
<i>Pontogeneia rostrata</i>	25,0	6,8	6,3	0,27	0,01	0,01	0,01	I	S	IN
<i>Pontogeneia</i> sp.	50,0	22,9	20,0	0,90	0,03	0,03	0,02	S	S	ES
<i>Praxillella gracilis</i>	62,5	150,8	73,6	5,94	2,42	1,22	1,95	I	E	T
<i>Praxillella praetermissa</i>	37,5	15,4	12,2	0,61	0,50	0,43	0,40	MT	E	T
<i>Praxillella</i> sp.	25,0	4,5	3,1	0,18	0,03	0,02	0,03	I	SE	T
<i>Priapulus caudatus</i>	12,5	0,4	0,4	0,01	0,00	0,00	0,00	T	E	T
<i>Prionospio</i> sp.	37,5	8,8	5,8	0,35	0,02	0,01	0,01	MT	E	IN
<i>Protomedeia microdactyla</i>	50,0	5,9	3,3	0,23	0,02	0,01	0,02	S	S	IN
<i>Protomedeia</i> sp.	62,5	12,0	8,5	0,47	0,05	0,03	0,04	S	S	IN
<i>Scalibregma inflatum</i>	37,5	1,3	0,7	0,05	0,10	0,08	0,08	T	E	T
<i>Scoloplos armiger</i>	100,0	34,2	18,0	1,35	0,76	0,37	0,61	MT	E	T
<i>Serripes groenlandicus</i>	37,5	1,3	0,7	0,05	0,11	0,07	0,09	S	S	ES
<i>Sigambra bassi</i>	25,0	1,1	0,8	0,04	0,00	0,00	0,00	T	E	OP2
<i>Sipuncula</i> fam. gen. sp.	25,0	0,8	0,6	0,03	0,02	0,01	0,01	MT	SE	ES
<i>Solamen leanum</i>	12,5	0,6	0,6	0,02	0,00	0,00	0,00	–	–	IN
<i>Solenogastres</i> fam. gen. sp.	50,0	6,0	5,1	0,24	0,14	0,13	0,11	I	SE	ES
<i>Spionidae</i> gen. sp.	75,0	21,3	11,6	0,84	0,06	0,03	0,05	MT	E	T
<i>Spiophanes bombyx</i>	25,0	12,2	8,5	0,48	0,12	0,09	0,10	I	E	IN
<i>Sternaspis scutata</i>	62,5	12,0	6,8	0,47	0,93	0,63	0,75	S	S	T
<i>Syllidae</i> gen. sp.	12,5	0,4	0,4	0,01	0,02	0,03	0,02	S	S	–
<i>Synidotea epimerata</i>	12,5	3,8	4,0	0,15	0,04	0,04	0,03	S	S	–
<i>Syrrhoe crenulata</i>	37,5	3,0	2,3	0,12	0,00	0,00	0,00	–	–	IN
<i>Terebellides stroemii</i>	12,5	1,1	1,2	0,04	0,27	0,29	0,22	–	–	ES
<i>Thyasira gouldi</i>	12,5	0,4	0,4	0,01	0,01	0,01	0,01	–	–	ES
<i>Urothoe orientalis</i>	12,5	0,4	0,4	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
<i>Urticina</i> sp.	12,5	0,4	0,4	0,01	0,63	0,67	0,50	–	–	ES
<i>Velutina coriacea</i>	12,5	0,6	0,6	0,02	0,01	0,01	0,01	–	–	T
<i>Westwoodilla caecula</i>	12,5	1,2	1,3	0,05	0,00	0,00	0,00	–	–	IN
<i>Yoldia johanni</i>	25,0	1,5	1,2	0,06	0,36	0,34	0,29	S	S	ES

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Yoldia</i> sp.	37,5	3,0	2,2	0,12	0,02	0,01	0,01	MT	SE	ES
10. « <i>Lumbrineris longifolia</i> » + <i>Ophiura sarsii</i>										
<i>Acanthomysis stelleri</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,01	0,01	0,00	–	–	IN
<i>Acila insignis</i>	44,4	87,2	58,8	3,73	46,13	30,56	16,36	S	SE	–
Actiniaria fam. gen. sp.	11,1	0,4	0,4	0,02	0,02	0,02	0,01	MT	E	IN
<i>Alpheus brevicristatus</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,002	0,002	0,001	–	–	ES
<i>Alveinus ojanus</i>	11,1	0,9	0,9	0,04	0,002	0,002	0,001	S	S	ES
<i>Ampelisca macrocephala</i>	66,7	4,5	2,0	0,19	0,04	0,02	0,02	MT	E	ES
<i>Ampelisca</i> sp.	11,1	0,3	0,3	0,01	0,0003	0,0003	0,0001	–	–	ES
<i>Ampharete acutifrons</i>	11,1	0,9	0,9	0,04	0,03	0,03	0,01	–	–	IN
Ampharetidae gen. sp.	55,7	5,3	2,7	0,23	0,14	0,11	0,05	S	SE	T
<i>Amphiodia periercta</i>	77,8	4,0	1,2	0,17	0,44	0,18	0,16	S	S	ES
<i>Anonyx nugax</i>	11,1	1,1	1,1	0,05	0,002	0,002	0,001	–	–	–
<i>Apoprionospio nova</i>	66,7	25,5	20,0	1,09	0,11	0,06	0,04	–	–	–
<i>Arctolembos arcticus</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,06	0,06	0,02	–	–	ES
<i>Asterias amurensis</i>	11,1	0,4	0,4	0,02	1,81	1,81	0,64	ET	SE	OP2
<i>Asterina pectinifera</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	8,50	8,50	3,01	–	–	IN
<i>Asychis</i> sp.	11,1	0,3	0,3	0,01	0,03	0,03	0,01	S	S	IN
<i>Axinopsida subquadrata</i>	77,8	14,2	7,3	0,61	0,06	0,02	0,02	MT	E	IN
<i>Bathymedon ivanovi</i>	11,1	0,6	0,6	0,03	0,0003	0,0003	0,0001	–	–	IN
<i>Bela erosa</i>	55,6	15,4	9,5	0,66	1,26	0,69	0,45	MT	E	IN
Brachiura fam. gen. sp.	11,1	0,7	0,7	0,03	0,002	0,002	0,001	–	–	–
<i>Brada</i> sp.	11,1	1,5	1,5	0,07	0,32	0,32	0,11	–	–	ES
<i>Calianassa japonica</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,0009	0,0009	0,0003	–	–	–
<i>Callinera</i> sp.	44,4	3,7	2,7	0,16	0,06	0,04	0,02	–	–	–
<i>Cancer amphioeticus</i>	11,1	0,7	0,7	0,03	0,004	0,004	0,001	–	–	IN
Capitellidae gen. sp.	22,2	6,3	4,2	0,27	0,03	0,02	0,01	MT	SE	OP1
<i>Caprella scaursa diceros</i>	11,1	0,4	0,4	0,02	0,0011	0,0011	0,0004	–	–	IN
Caprellidae gen. sp.	11,1	0,6	0,6	0,03	0,002	0,002	0,001	I	SE	IN
Caudofoviata fam. gen. sp.	33,3	2,6	1,6	0,11	0,07	0,06	0,03	–	–	–
<i>Cerebratulus marginatus</i>	77,8	9,9	4,9	0,43	3,21	1,46	1,14	MT	SE	T
<i>Cerebratulus</i> sp.	11,1	1,0	1,0	0,04	0,05	0,05	0,02	–	–	T
<i>Chaetozone setosa</i>	66,7	59,4	44,4	2,54	0,21	0,12	0,08	ET	E	T
<i>Chlamys farreri nipponensis</i>	11,1	0,7	0,7	0,03	0,008	0,008	0,003	–	–	ES
<i>Chone teres</i>	11,1	1,0	1,0	0,04	0,04	0,04	0,01	–	–	IN
<i>Cistenides granulata</i>	44,4	1,9	0,9	0,08	0,43	0,26	0,15	–	–	IN
<i>Crangon amurensis</i>	44,4	1,7	0,8	0,07	0,13	0,08	0,05	T	E	ES
<i>Crangon</i> sp.	33,3	2,5	1,5	0,11	0,02	0,02	0,01	S	SE	ES
Cumacea fam. gen. sp.	44,4	4,0	2,4	0,17	0,01	0,00	0,00	S	SE	ES
Decapoda fam. gen. sp.	44,4	4,5	2,5	0,19	2,06	2,04	0,73	S	SE	IN
<i>Derjuginella rufofasciata</i>	44,4	3,0	1,3	0,13	0,06	0,03	0,02	–	–	ES
<i>Diastylis rathkei</i>	33,3	7,3	4,0	0,31	0,03	0,01	0,01	–	–	–
<i>Dipolydora cardalia</i>	66,7	496,6	355,5	21,24	7,20	6,04	2,55	T	E	OP2
<i>Echinocardium cordatum</i>	44,4	7,6	3,9	0,32	81,57	40,58	28,93	I	S	ES
<i>Echiurus echiurus</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,07	0,07	0,03	–	–	ES
<i>Ennucula tenuis</i>	55,6	37,7	20,7	1,61	1,33	0,89	0,47	T	E	IN
<i>Eteone longa</i>	22,2	2,2	1,8	0,09	0,02	0,01	0,01	T	E	T

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Eteone</i> sp.	11,1	0,9	0,9	0,04	0,008	0,008	0,003	–	–	T
<i>Eugilina gracilis</i>	11,1	0,6	0,6	0,03	0,004	0,004	0,001	–	–	–
<i>Eulalia bilineata</i>	66,7	3,6	1,3	0,15	0,06	0,02	0,02	T	E	IN
<i>Eumida</i> sp.	11,1	0,3	0,3	0,01	0,003	0,003	0,001	–	–	IN
Eunicidae gen. sp.	11,1	0,4	0,4	0,02	0,04	0,04	0,01	–	–	IN
<i>Felaniella usta</i>	22,2	7,2	5,3	0,31	0,03	0,02	0,01	I	S	ES
<i>Gaetice depressus</i>	33,3	3,7	2,0	0,16	0,006	0,003	0,002	MT	SE	ES
Gammaridae fam. gen. sp.	44,4	2,9	1,5	0,13	0,014	0,009	0,005	–	–	ES
<i>Glycera nana</i>	11,1	1,8	1,8	0,08	0,03	0,03	0,01	–	–	IN
<i>Glycera</i> sp.	100,0	34,6	15,6	1,48	0,40	0,19	0,14	I	SE	IN
<i>Glycera tessellata</i>	33,3	7,3	4,8	0,31	0,67	0,49	0,24	S	S	IN
<i>Glycinde armigera</i>	33,3	5,7	3,0	0,24	0,09	0,05	0,03	MT	E	IN
<i>Goniada maculata</i>	88,9	39,1	11,7	1,67	2,30	0,96	0,82	MT	E	IN
<i>Haploops tubicola</i>	11,1	0,4	0,4	0,02	0,0004	0,0004	0,0001	–	–	T
<i>Hemigrapsus</i> sp.	11,1	0,4	0,4	0,02	0,0011	0,0011	0,0004	–	–	IN
<i>Homalopoma amussitata</i>	11,1	0,4	0,4	0,02	0,12	0,12	0,04	–	–	IN
<i>Hubrechtella</i> sp.	33,3	4,9	3,0	0,21	0,03	0,02	0,01	–	–	T
<i>Hyas alutaceus</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,0009	0,0009	0,0003	–	–	ES
<i>Lanassa</i> sp.	11,1	0,5	0,5	0,02	0,03	0,03	0,01	S	E	ES
<i>Laonice cirrata</i>	55,6	6,1	2,6	0,26	0,10	0,05	0,04	I	S	IN
<i>Laonice</i> sp.	66,7	4,6	1,8	0,20	0,05	0,02	0,02	S	SE	T
<i>Leucon nasica</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,002	0,002	0,001	–	–	IN
Lineidae gen. sp.	22,2	4,6	3,9	0,20	0,09	0,09	0,03	I	E	IN
<i>Liocyma fluctuosa</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,005	0,005	0,002	I	S	ES
«<i>Lumbrineris longifolia</i>»	100,0	140,1	38,2	5,99	1,45	0,42	0,52	T	E	IN
<i>Macoma calcarea</i>	11,1	0,7	0,7	0,03	0,005	0,005	0,002	MT	S	IN
<i>Macoma orientalis</i>	11,1	3,7	3,7	0,16	64,19	64,19	22,76	–	–	IN
<i>Macoma</i> sp.	33,3	2,7	1,5	0,11	0,24	0,17	0,08	T	E	IN
<i>Macoma tokyoensis</i>	33,3	1,2	0,7	0,05	0,014	0,007	0,005	MT	SE	IN
Macrura fam. gen. sp.	11,1	0,4	0,4	0,02	0,0011	0,0011	0,0004	–	–	–
<i>Magelona longicornis</i>	33,3	5,8	3,6	0,25	0,14	0,09	0,05	T	E	IN
<i>Magelona</i> sp.	11,1	0,4	0,4	0,02	0,005	0,005	0,002	–	–	ES
<i>Maldane sarsi</i>	66,7	304,0	215,4	13,00	11,26	9,34	3,99	T	E	IN
Maldanidae gen. sp. 1	11,1	0,3	0,3	0,01	0,02	0,02	0,01	I	E	ES
Maldanidae gen. sp. 2	11,1	0,3	0,3	0,01	0,0009	0,0009	0,0003	I	E	ES
Maldanidae gen. sp. 3	22,2	41,6	41,2	1,78	0,17	0,17	0,06	I	E	ES
<i>Mediomastus californiensis</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,005	0,005	0,002	MT	E	T
<i>Melinna elisabethae</i>	11,1	3,3	3,3	0,14	0,05	0,05	0,02	T	E	T
<i>Melita</i> sp.	22,2	30,1	19,9	1,29	0,30	0,24	0,11	–	–	IN
<i>Monoculodes breviops</i>	22,2	1,4	1,1	0,06	0,002	0,001	0,001	–	–	ES
<i>Monoculodes semenovi</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,0006	0,0006	0,0002	–	–	ES
<i>Monoculodes</i> sp. 1	11,1	0,3	0,3	0,01	0,0003	0,0003	0,0001	T	E	IN
<i>Monoculodes</i> sp. 2	11,1	0,3	0,3	0,01	0,0003	0,0003	0,0001	T	E	IN
<i>Monoculodes zernovi</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,003	0,003	0,001	I	S	ES
<i>Mya priapus</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,04	0,04	0,01	–	–	IN
<i>Mya pseudoarenaria</i>	33,3	1,1	0,6	0,05	0,07	0,05	0,03	T	E	T
<i>Mya</i> sp.	22,2	0,6	0,4	0,03	0,06	0,06	0,02	MT	E	T

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
Nemertea fam. gen. sp.	33,3	25,3	16,2	1,08	0,17	0,09	0,06	MT	E	T
<i>Neomysis czerniawskii</i>	22,2	0,6	0,4	0,03	0,02	0,02	0,01	–	–	IN
<i>Nephtys caeca</i>	11,1	0,7	0,7	0,03	0,86	0,86	0,30	S	S	IN
<i>Nephtys</i> sp.	44,4	6,7	3,1	0,29	0,61	0,37	0,22	I	SE	IN
<i>Nereis</i> sp.	33,3	3,2	1,8	0,14	0,43	0,30	0,15	ET	E	OP2
<i>Nereis zonata</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,010	0,010	0,004	MT	SE	T
<i>Nipponnemertes arenaria</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,05	0,05	0,02	–	–	IN
<i>Nothria</i> sp.	55,6	3,8	1,2	0,16	0,04	0,02	0,01	S	S	IN
<i>Notomastus latericeus</i>	77,8	206,6	102,5	8,84	0,62	0,29	0,22	ET	E	IN
<i>Odius kelleri</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,0003	0,0003	0,0001	T	E	–
<i>Oenopota</i> sp.	22,2	2,0	1,7	0,08	0,03	0,02	0,01	T	E	ES
<i>Onuphis iridescens</i>	33,3	5,7	4,4	0,24	0,18	0,11	0,07	I	SE	IN
<i>Ophilina acuminata</i>	11,1	0,9	0,9	0,04	0,08	0,08	0,03	I	SE	T
<i>Ophiura sarsii</i>	88,9	66,2	36,1	2,83	17,73	7,21	6,29	MT	E	IN
<i>Owenia fusiformis</i>	22,2	33,0	28,2	1,41	0,11	0,10	0,04	MT	E	IN
<i>Pagurus</i> sp.	22,2	1,1	0,7	0,05	1,82	1,81	0,64	–	–	IN
<i>Paradorippe granulata</i>	66,7	20,3	10,8	0,87	0,39	0,20	0,14	MT	E	IN
<i>Paranaitis polynoides</i>	22,2	6,1	4,9	0,26	0,13	0,11	0,05	S	S	IN
<i>Phascolosoma japonica</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,03	0,03	0,01	–	–	ES
<i>Philine argentata</i>	77,8	9,3	4,4	0,40	0,51	0,20	0,18	T	E	IN
<i>Pholoe minuta</i>	33,3	4,3	2,7	0,19	0,03	0,01	0,01	MT	SE	IN
<i>Phoronopsis harmeri</i>	33,3	14,7	11,3	0,63	0,09	0,05	0,03	T	E	T
<i>Phyllodoce groenlandica</i>	11,1	0,9	0,9	0,04	0,07	0,07	0,03	MT	E	OP2
<i>Phyllodoce</i> sp.	11,1	0,3	0,3	0,01	0,002	0,002	0,001	–	–	IN
Phyllodocidae gen. sp.	11,1	0,3	0,3	0,01	0,002	0,002	0,001	–	–	IN
<i>Pinnixa rathbuni</i>	77,9	27,5	12,9	1,18	0,23	0,09	0,08	T	E	ES
<i>Pleusymtes</i> sp.	22,2	1,2	0,9	0,05	0,002	0,001	0,001	–	–	T
Polynoidae gen. sp.	55,6	9,1	5,4	0,39	0,07	0,03	0,02	MT	S	ES
<i>Pontogeneia kondakovi</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,0006	0,0006	0,0002	–	–	IN
<i>Pontogeneia</i> sp.	11,1	0,3	0,3	0,01	0,0003	0,0003	0,0001	S	S	ES
<i>Praxillella gracilis</i>	55,6	42,5	25,3	1,82	1,03	0,58	0,37	I	E	T
<i>Praxillella</i> sp.	33,3	18,4	16,2	0,79	0,19	0,15	0,07	I	SE	T
<i>Priapulius caudatus</i>	22,2	2,8	2,4	0,12	0,73	0,70	0,26	T	E	T
<i>Prionospio</i> sp.	55,6	28,1	15,0	1,20	0,17	0,11	0,06	MT	E	IN
<i>Propebela</i> sp.	44,4	1,3	0,5	0,06	0,04	0,02	0,01	–	–	ES
<i>Protocallithaca adamsi</i>	22,2	0,6	0,4	0,03	1,13	1,00	0,40	MT	E	T
<i>Protomedeia epimerata</i>	11,1	4,6	4,6	0,20	0,02	0,02	0,01	MT	SE	ES
<i>Protomedeia popovi</i>	33,3	29,2	24,7	1,25	0,07	0,06	0,02	S	S	IN
<i>Protomedeia</i> sp.	22,2	0,6	0,4	0,02	0,0006	0,0004	0,0002	S	S	IN
<i>Raeta pulchella</i>	44,4	5,5	2,6	0,24	0,06	0,03	0,02	S	E	T
Sabellidae gen. sp.	66,8	8,7	3,0	0,37	0,17	0,07	0,06	MT	SE	I
<i>Scalibregma inflatum</i>	44,4	29,3	23,0	1,25	1,47	0,62	0,52	T	E	T
<i>Scalibregma</i> sp.	11,1	0,3	0,3	0,01	0,006	0,006	0,002	–	–	T
Scalibregmidae gen. sp.	11,1	0,3	0,3	0,01	0,02	0,02	0,01	–	–	–
<i>Scolecopsis</i> sp.	55,6	35,4	22,6	1,51	0,20	0,10	0,07	MT	E	T
<i>Scoloplos armiger</i>	88,9	112,4	61,2	4,81	1,43	0,57	0,51	MT	E	T
<i>Serripes groenlandicus</i>	22,2	1,2	0,9	0,05	6,33	5,58	2,24	S	S	ES

Продолжение таблицы А.1

Таксон	<i>Fq</i>	<i>A</i> , экз./м ²	<i>SE</i>	<i>A</i> , %	<i>B</i> , г/м ²	<i>SE</i>	<i>B</i> , %	<i>Cont</i>	<i>Bion</i>	<i>Eutr</i>
<i>Sigambra bassi</i>	33,3	6,4	4,2	0,27	0,07	0,05	0,03	T	E	OP2
<i>Siliqua alta</i>	22,2	1,0	0,7	0,04	0,006	0,004	0,002	I	S	IN
Sipuncula fam. gen. sp.	11,1	1,5	1,5	0,07	0,60	0,60	0,21	MT	SE	ES
<i>Solen krusensterni</i>	11,1	1,4	1,4	0,06	0,68	0,68	0,24	I	S	ES
<i>Spiophanes berkeleyorum</i>	22,2	0,7	0,5	0,03	0,004	0,003	0,001	MT	SE	T
<i>Spiophanes bombyx</i>	66,7	23,5	13,7	1,01	0,24	0,13	0,09	I	E	IN
<i>Sternaspis sculata</i>	22,2	10,4	9,4	0,44	0,65	0,58	0,23	S	S	T
Syllidae gen. sp.	11,1	0,6	0,6	0,03	0,003	0,003	0,001	S	S	–
<i>Synchelidium bulytschevae</i>	11,1	0,7	0,7	0,03	0,0007	0,0007	0,0003	–	–	ES
<i>Synchelidium bulytschevae</i>	11,1	0,7	0,7	0,03	0,0004	0,0004	0,0001	–	–	ES
Tanaidacea gen. sp.	11,1	0,3	0,3	0,01	0,0003	0,0003	0,0001	–	–	IN
<i>Telmessus cheiragonus</i>	11,1	0,8	0,8	0,04	0,008	0,008	0,003	–	–	ES
Terebellidae gen. sp.	33,3	2,1	1,2	0,09	0,39	0,27	0,14	MT	SE	T
<i>Themisto abyssorum</i>	11,1	0,4	0,4	0,02	0,0004	0,0004	0,0001	–	–	–
<i>Theora lubrica</i>	55,6	3,6	1,4	0,15	0,03	0,01	0,01	T	E	T
Thyasiridae gen. sp.	11,1	0,3	0,3	0,01	0,003	0,003	0,001	–	–	–
<i>Thysanocardia</i> sp.	33,3	1,3	0,7	0,05	0,05	0,03	0,02	–	–	ES
<i>Tjysanoessa</i> sp.	11,1	0,4	0,4	0,02	0,0007	0,0007	0,0003	–	–	–
<i>Tritodynamia rathbuni</i>	22,2	5,7	5,0	0,24	0,79	0,77	0,28	–	–	IN
Turridae gen. sp.	11,1	0,3	0,3	0,01	0,006	0,006	0,002	–	–	–
<i>Urechis unicinctus</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,03	0,03	0,01	–	–	IN
Valenciiniidae gen. sp.	11,1	2,8	2,8	0,12	0,02	0,02	0,01	–	–	–
<i>Westwoodilla rectangulata</i>	22,2	4,8	4,2	0,20	0,004	0,003	0,001	S	SE	IN
<i>Yoldia johanni</i>	22,2	1,2	0,8	0,05	0,02	0,01	0,01	S	S	ES
<i>Yoldia keppeliana</i>	33,3	3,2	1,7	0,14	2,59	2,03	0,92	MT	S	ES
<i>Yoldia notabilis</i>	11,1	0,3	0,3	0,01	0,63	0,63	0,22	–	–	ES
25. « <i>L. longifolia</i> » + <i>M. scarlatoi</i>										
<i>Ampelisca macrocephala</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,01	0,01	0,00	MT	E	ES
<i>Ampharete</i> sp.	10,0	1,4	1,4	0,04	0,04	0,04	0,01	MT	E	IN
<i>Anisocorbula venusta</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,02	0,02	0,00	ET	E	OP2
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	90,0	995,0	489,5	31,63	18,59	14,84	3,37	ET	E	OP2
<i>Argis dentata</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,69	0,73	0,13	–	–	–
<i>Asabellides sibirica</i>	20,0	4,5	3,8	0,14	0,03	0,02	0,00	T	SE	ES
<i>Axinopsida subquadrata</i>	60,0	7,2	2,7	0,23	0,14	0,07	0,02	MT	E	IN
<i>Capitella capitata</i>	10,0	2,7	2,8	0,09	0,05	0,05	0,01	ET	E	OP1
<i>Cerebratulus signatus</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,01	0,01	0,00	–	–	T
<i>Chaetozone setosa</i>	50,0	211,1	206,8	6,71	4,65	4,28	0,84	ET	E	T
<i>Cheilonereis cyclurus</i>	20,0	11,3	10,8	0,36	0,41	0,34	0,07	ET	SE	OP1
<i>Chone cincta</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,00	0,00	0,00	ET	S	OP2
<i>Chone</i> sp.	10,0	0,9	0,9	0,03	0,05	0,06	0,01	T	E	IN
<i>Cirratulus cirratus</i>	20,0	16,2	16,6	0,52	0,53	0,54	0,10	T	E	T
<i>Crangon amurensis</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,01	0,01	0,00	T	E	ES
<i>Cryptonatica clausa</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,03	0,03	0,00	–	–	–
<i>Diastilys alaskensis</i>	20,0	0,9	0,6	0,03	0,01	0,00	0,00	T	SE	IN
<i>Dipolydora cardalia</i>	70,0	140,9	65,3	4,48	3,15	1,50	0,57	T	E	OP2
<i>Dosinia</i> sp.	10,0	0,5	0,5	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
<i>Ennucula tenuis</i>	60,0	55,4	29,5	1,76	3,86	2,02	0,70	T	E	IN

Продолжение таблицы А.1

Таксон	<i>Fq</i>	<i>A</i> , экз./м ²	<i>SE</i>	<i>A</i> , %	<i>B</i> , г/м ²	<i>SE</i>	<i>B</i> , %	<i>Cont</i>	<i>Bion</i>	<i>Eutr</i>
<i>Eteone bistrata</i>	10,0	0,9	0,9	0,03	0,03	0,03	0,00	–	–	OP2
<i>Eteone longa</i>	10,0	3,2	3,3	0,10	0,06	0,06	0,01	T	E	T
<i>Eteone ornata</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,01	0,01	0,00	–	–	–
<i>Eteone</i> sp.	60,0	7,7	3,7	0,24	0,16	0,11	0,03	–	–	T
<i>Eulalia bilineata</i>	30,0	1,8	1,0	0,06	0,07	0,05	0,01	T	E	IN
<i>Glycera capitata</i>	80,0	18,5	5,0	0,59	0,40	0,14	0,07	T	E	IN
<i>Glycera</i> sp.	10,0	0,5	0,5	0,01	0,00	0,00	0,00	I	SE	IN
<i>Glycinde armigera</i>	40,0	3,6	1,7	0,11	0,07	0,04	0,01	MT	E	IN
<i>Goniada maculata</i>	50,0	4,1	1,9	0,13	0,20	0,11	0,04	MT	E	IN
<i>Harmothoe imbricata</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,01	0,01	0,00	T	E	IN
<i>Harmothoe</i> sp.	10,0	0,5	0,5	0,01	0,00	0,00	0,00	T	E	IN
<i>Hiatella arctica</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,08	0,08	0,01	–	–	ES
<i>Ischyrocerus</i> sp.	10,0	0,5	0,5	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	IN
«Lumbrineris longifolia»	100,0	160,7	51,8	5,11	1,60	0,45	0,29	T	E	IN
<i>Macoma nipponica</i>	10,0	3,2	3,3	0,10	5,57	5,87	1,01	ET	E	T
<i>Macoma scarlatoi</i>	70,0	14,9	6,0	0,47	219,42	58,57	39,79	ET	SE	T
<i>Macoma</i> sp. 1	60,0	3,6	1,2	0,11	0,42	0,15	0,08	T	E	IN
<i>Macoma</i> sp. 2	20,0	5,0	4,7	0,16	31,86	28,45	5,78	T	E	IN
<i>Magelona longicornis</i>	20,0	5,9	5,7	0,19	0,22	0,22	0,04	T	E	IN
<i>Maldane sarsi</i>	30,0	5,9	4,2	0,19	0,63	0,52	0,11	T	E	IN
<i>Melinna elisabethae</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,00	0,00	0,00	T	E	T
<i>Mya</i> sp.	10,0	0,5	0,5	0,01	0,05	0,05	0,01	MT	E	T
<i>Mya truncata</i>	10,0	3,6	3,8	0,11	17,83	18,80	3,23	T	E	T
<i>Mya uzenensis</i>	50,0	6,3	3,7	0,20	5,59	5,11	1,01	T	SE	T
<i>Mytilus trossulus</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,02	0,02	0,00	–	–	–
Nemertea fam. gen. sp.	70,0	6,3	2,4	0,20	2,14	1,44	0,39	MT	E	T
<i>Nereis vexillosa</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,04	0,04	0,01	ET	SE	–
<i>Notomastus latericeus</i>	100,0	57,6	15,9	1,83	1,82	0,42	0,33	ET	E	IN
<i>Nymphon</i> sp.	10,0	0,5	0,5	0,01	0,02	0,02	0,00	–	–	ES
<i>Ophiura sarsii</i>	90,0	89,6	24,8	2,85	9,86	3,67	1,79	MT	E	IN
<i>Owenia fusiformis</i>	50,0	7,7	3,5	0,24	0,11	0,05	0,02	MT	E	IN
<i>Pectinaria soldatovi</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,05	0,05	0,01	–	–	–
<i>Pectinaria</i> sp.	20,0	0,9	0,6	0,03	0,05	0,04	0,01	–	–	ES
<i>Periploma</i> sp.	10,0	0,5	0,5	0,01	0,08	0,08	0,01	–	–	–
<i>Pherusa plumosa</i>	30,0	9,9	7,5	0,31	2,73	2,47	0,49	T	E	T
<i>Philine argentata</i>	40,0	2,7	1,3	0,09	0,38	0,32	0,07	T	E	IN
<i>Pholoe minuta</i>	40,0	4,5	2,0	0,14	0,09	0,04	0,02	MT	SE	IN
<i>Phoronopsis harmeri</i>	30,0	881,1	629,9	28,01	148,62	105,82	26,95	T	E	T
<i>Phylodoce groenlandica</i>	10,0	0,9	0,9	0,03	0,01	0,01	0,00	MT	E	OP2
<i>Pleusymtes uncigera</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Polydoridae gen. sp.	10,0	0,5	0,5	0,01	0,00	0,00	0,00	I	E	–
<i>Potamilla reniformis</i>	20,0	0,9	0,6	0,03	1,24	0,91	0,23	T	SE	IN
<i>Praxillella gracilis</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,03	0,03	0,00	I	E	T
<i>Priapulius caudatus</i>	40,0	8,1	6,1	0,26	10,34	6,45	1,88	T	E	T
<i>Prionospio malmgreni</i>	10,0	3,2	3,3	0,10	0,04	0,04	0,01	ET	E	OP2
<i>Prionospio</i> sp.	10,0	0,5	0,5	0,01	0,01	0,01	0,00	MT	E	IN
<i>Protocallithaca adamsi</i>	40,0	3,2	1,6	0,10	34,91	35,79	6,33	MT	E	T

Продолжение таблицы А.1

Таксон	<i>Fq</i>	<i>A</i> , экз./м ²	<i>SE</i>	<i>A</i> , %	<i>B</i> , г/м ²	<i>SE</i>	<i>B</i> , %	<i>Cont</i>	<i>Bion</i>	<i>Eutr</i>
<i>Pugettia quadridens</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,09	0,10	0,02	–	–	–
<i>Scalibregma inflatum</i>	70,0	20,3	10,6	0,64	12,66	6,48	2,30	T	E	T
<i>Schistomeringos japonica</i>	100,0	150,8	49,9	4,79	1,34	0,41	0,24	ET	E	OP1
<i>Scoloplos armiger</i>	90,0	123,8	25,4	3,93	7,49	2,56	1,36	MT	E	T
<i>Sigambra bassi</i>	80,0	55,4	35,1	1,76	0,59	0,33	0,11	T	E	OP2
<i>Spio goniocephala</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Spionidae gen. sp.	20,0	8,6	8,5	0,27	0,09	0,08	0,02	MT	E	T
<i>Spiophanes bombyx</i>	10,0	0,5	0,5	0,01	0,00	0,00	0,00	I	E	IN
<i>Synidotea cinerea</i>	20,0	0,9	0,6	0,03	0,02	0,02	0,00	T	SE	T
<i>Theora lubrica</i>	10,0	1,4	1,4	0,04	0,06	0,07	0,01	T	E	T
<i>2. Aphelochaeta pacifica</i>										
Annelida fam. gen. sp.	14,3	1,4	1,5	0,09	0,01	0,01	0,06	–	–	–
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	85,7	301,4	140,9	19,76	6,24	3,86	30,31	ET	E	OP2
<i>Asabellides sibirica</i>	14,3	21,4	23,1	1,40	0,07	0,08	0,35	T	SE	ES
<i>Asterias amurensis</i>	14,3	1,4	1,5	0,09	0,01	0,01	0,03	ET	SE	OP2
<i>Capitella capitata</i>	57,1	117,1	61,9	7,68	0,43	0,23	2,07	ET	E	OP1
Capitellidae gen.sp.	14,3	2,9	3,1	0,19	0,01	0,01	0,03	MT	SE	OP1
<i>Cirratulus cirratus</i>	14,3	11,4	12,3	0,75	0,11	0,12	0,55	T	E	T
Crangonidae gen. sp.	14,3	1,4	1,5	0,09	0,03	0,04	0,16	–	–	–
<i>Ennucula tenuis</i>	14,3	1,4	1,5	0,09	0,06	0,06	0,28	T	E	IN
<i>Eteone</i> sp.	28,6	8,6	7,6	0,56	0,20	0,16	0,97	–	–	T
Gammaridae fam. gen. sp. 2	14,3	1,4	1,5	0,09	0,00	0,00	0,01	–	–	ES
Gammaridae fam. gen. sp. 3	14,3	1,4	1,5	0,09	0,00	0,00	0,01	–	–	ES
<i>Glycera</i> sp.	57,1	10,0	4,7	0,66	0,04	0,03	0,21	I	SE	IN
<i>Goniada maculata</i>	14,3	1,4	1,5	0,09	0,01	0,01	0,03	MT	E	IN
<i>Heteromastus</i> sp.	14,3	1,4	1,5	0,09	0,00	0,00	0,01	–	–	OP2
Hirudinea fam. gen. sp.	14,3	1,4	1,5	0,09	0,14	0,15	0,69	–	–	OP2
<i>Laonice cirrata</i>	42,9	21,4	14,4	1,40	0,69	0,56	3,36	I	S	IN
«<i>Lumbrineris longifolia</i>»	85,7	268,6	108,9	17,60	1,30	0,63	6,31	T	E	IN
<i>Macoma orientalis</i>	14,3	1,4	1,5	0,09	2,51	2,72	12,21	–	–	IN
<i>Magelona pacifica</i>	28,6	45,7	47,6	3,00	1,02	1,08	4,96	S	S	ES
<i>Mediomastus</i> sp.	28,6	57,1	46,3	3,75	0,31	0,30	1,53	–	–	T
Nemertea fam. gen. sp.	71,4	18,6	8,6	1,22	1,00	0,73	4,85	MT	E	T
<i>Nephtys</i> sp.	14,3	1,4	1,5	0,09	0,01	0,01	0,03	I	SE	IN
<i>Nereis</i> sp.	28,6	2,9	2,0	0,19	0,26	0,26	1,28	ET	E	OP2
<i>Ophiura sarsii</i>	71,4	22,9	12,0	1,50	0,11	0,05	0,52	MT	E	IN
<i>Paranaitis polynoides</i>	28,6	2,9	2,0	0,19	0,06	0,05	0,31	S	S	IN
<i>Pectinaria</i> sp.	14,3	10,0	10,8	0,66	0,36	0,39	1,73	–	–	ES
<i>Philine</i> sp.	57,1	27,1	11,2	1,78	0,82	0,56	4,00	S	E	IN
<i>Pholoe minuta</i>	14,3	2,9	3,1	0,19	0,01	0,01	0,06	MT	SE	IN
<i>Phyllodoce groenlandica</i>	42,9	5,7	3,2	0,37	0,24	0,18	1,14	MT	E	OP2
<i>Phyllodoce</i> sp.	14,3	1,4	1,5	0,09	0,00	0,00	0,01	–	–	IN
<i>Polydora</i> sp.	28,6	192,9	206,5	12,64	0,26	0,28	1,28	I	E	T
<i>Praxillella praetermissa</i>	14,3	5,7	6,2	0,37	0,14	0,15	0,69	MT	E	T
<i>Protocallithaca adamsi</i>	14,3	1,4	1,5	0,09	0,04	0,05	0,21	MT	E	T
<i>Raeta pulchella</i>	28,6	2,9	2,0	0,19	0,47	0,44	2,26	S	E	T
<i>Scalibregma inflatum</i>	42,9	42,9	31,3	2,81	1,44	0,99	7,00	T	E	T

Продолжение таблицы А.1

Таксон	<i>Fq</i>	<i>A</i> , экз./м ²	<i>SE</i>	<i>A</i> , %	<i>B</i> , г/м ²	<i>SE</i>	<i>B</i> , %	<i>Cont</i>	<i>Bion</i>	<i>Eutr</i>
<i>Schistomeringos japonica</i>	71,4	125,7	50,3	8,24	0,38	0,18	1,84	ET	E	OP1
<i>Scoloplos armiger</i>	57,1	115,7	68,8	7,58	1,37	0,84	6,63	MT	E	T
<i>Sigambra bassi</i>	42,9	22,9	12,0	1,50	0,07	0,04	0,36	T	E	OP2
<i>Spio</i> sp.	14,3	2,9	3,1	0,19	0,01	0,01	0,03	–	–	T
Spionidae gen. sp. 1	14,3	7,1	7,7	0,47	0,04	0,04	0,17	MT	E	T
Spionidae gen. sp. 2	14,3	4,3	4,6	0,28	0,03	0,03	0,14	MT	E	T
Spionidae gen. sp. 3	42,9	20,0	14,9	1,31	0,09	0,06	0,45	MT	E	T
<i>Theora lubrica</i>	14,3	4,3	4,6	0,28	0,10	0,11	0,48	T	E	T
<i>Yoldia johani</i>	14,3	1,4	1,5	0,09	0,04	0,04	0,20	S	S	ES
6. <i>Acila insignis</i>										
<i>Acila insignis</i>	63,6	20,5	8,5	9,39	18,50	8,24	2,27	S	SE	–
Annelida fam. gen. sp.	9,1	1,3	1,3	0,58	0,04	0,04	0,00	–	–	–
Aphroditidae gen.sp.	9,1	1,3	1,3	0,58	0,02	0,02	0,00	S	S	OP2
<i>Arca boucardi</i>	27,3	23,7	16,1	10,84	158,40	111,39	19,43	MT	SE	ES
Ascidia fam. gen. sp.	9,1	2,5	2,7	1,16	2,56	2,68	0,31	MT	SE	T
<i>Asterina pectinifera</i>	18,2	2,5	1,7	1,12	20,72	14,58	2,54	–	–	IN
Decapoda fam. gen. sp.	9,1	2,0	2,1	0,91	0,05	0,05	0,01	S	SE	IN
<i>Glycera</i> sp.	45,5	6,5	2,6	2,99	1,21	0,93	0,15	I	SE	IN
<i>Goniada maculata</i>	9,1	0,8	0,9	0,37	0,00	0,00	0,00	MT	E	IN
Holothuroidea fam. gen. sp.	18,2	1,6	1,2	0,75	0,85	0,77	0,10	S	S	ES
Isopoda fam. gen. sp.	9,1	1,3	1,3	0,58	0,67	0,71	0,08	S	S	–
<i>Laonice cirrata</i>	36,4	5,0	2,6	2,29	0,62	0,36	0,08	I	S	IN
<i>Lumbrineris</i> sp.	9,1	7,1	7,4	3,24	0,21	0,22	0,03	T	E	IN
<i>Macoma nipponica</i>	9,1	2,4	2,5	1,08	0,03	0,03	0,00	ET	E	T
<i>Macoma orientalis</i>	9,1	0,8	0,9	0,37	6,26	6,56	0,77	–	–	IN
<i>Maldane sarsi</i>	45,5	13,5	8,5	6,15	1,43	1,02	0,18	T	E	IN
<i>Mediomastus californiensis</i>	9,1	1,0	1,0	0,46	0,00	0,00	0,00	MT	E	T
<i>Mizuhopecten yessoensis</i>	9,1	4,7	5,0	2,16	590,91	619,75	72,50	–	–	ES
<i>Modiolus difficilis</i>	9,1	1,3	1,3	0,58	0,32	0,33	0,04	–	–	ES
<i>Musculista senhousia</i>	18,2	73,6	52,4	33,65	5,83	4,10	0,71	–	–	T
Nemertea fam. gen. sp.	36,4	4,6	2,1	2,12	0,92	0,55	0,11	MT	E	T
<i>Pherusa plumosa</i>	18,2	7,6	5,7	3,49	1,93	1,37	0,24	T	E	T
<i>Phyllodoce groenlandica</i>	9,1	0,8	0,9	0,37	0,00	0,00	0,00	MT	E	OP2
<i>Pillucina pisidium</i>	9,1	7,1	7,4	3,24	0,35	0,37	0,04	–	–	ES
Polychaeta fam. gen. sp.	18,2	5,5	4,9	2,53	0,02	0,02	0,00	–	–	–
<i>Praxillella</i> sp.	9,1	1,2	1,2	0,54	0,01	0,01	0,00	I	SE	T
<i>Scalibregma inflatum</i>	36,4	7,4	4,3	3,37	2,91	2,81	0,36	T	E	T
<i>Scoloplos armiger</i>	54,5	9,8	4,0	4,49	0,27	0,13	0,03	MT	E	T
<i>Yoldia pseudonatable</i>	9,1	1,3	1,3	0,58	0,08	0,08	0,01	–	–	–
14. <i>Aphelochaeta pacifica</i> + <i>Phoronopsis harmeri</i>										
<i>Alamprops longispina</i>	12,5	0,6	0,2	0,02	0,0023	0,0009	0,0002	–	–	ES
<i>Ampharete acutifrons</i>	12,5	1,3	0,5	0,04	0,11	0,05	0,01	–	–	IN
<i>Ampharete</i> sp.	25,0	1,8	0,5	0,06	0,15	0,05	0,01	MT	E	IN
Ampharetidae gen. sp.	25,0	3,9	1,4	0,13	0,014	0,005	0,001	S	SE	T
Amphipoda fam. gen. sp.	37,5	4,6	0,9	0,15	0,007	0,001	0,001	–	–	–
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	87,5	905,2	122,5	29,91	5,73	0,93	0,55	ET	E	OP2
<i>Arca boucardi</i>	37,5	130,4	50,8	4,31	145,09	53,30	14,04	MT	SE	ES

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Ascidia</i> fam. gen. sp.	25,0	6,3	1,7	0,21	12,93	3,85	1,25	MT	SE	T
<i>Athenaria</i> sp.	12,5	3,4	1,4	0,11	0,0028	0,0011	0,0003	–	–	IN
<i>Axinopsida subquadrata</i>	12,5	1,3	0,5	0,04	0,013	0,005	0,001	MT	E	IN
<i>Balanus crenatus</i>	12,5	2,5	1,0	0,08	0,13	0,05	0,01	–	–	IN
<i>Balanus rostratus</i>	37,5	48,7	16,9	1,61	394,64	137,52	38,18	MT	SE	T
<i>Bela erosa</i>	12,5	0,6	0,2	0,02	0,07	0,03	0,01	MT	E	IN
Bryozoa gen. sp.	25,0	2,5	0,7	0,08	0,16	0,04	0,02	–	–	–
Calcarea gen. sp.	12,5	1,3	0,5	0,04	0,06	0,03	0,01	–	–	–
<i>Capitella capitata</i>	37,5	182,6	47,4	6,03	0,33	0,09	0,03	ET	E	OP1
Capitellidae gen. sp.	50,0	154,9	37,7	5,12	0,29	0,09	0,03	MT	SE	OP1
<i>Cerebratulus marginatus</i>	25,0	2,5	0,7	0,08	0,20	0,06	0,02	MT	SE	T
Chironomidae gen. sp.	12,5	0,6	0,2	0,02	0,006	0,002	0,001	–	–	T
<i>Cirratulus cirratus</i>	37,5	17,7	5,5	0,58	2,38	0,48	0,23	T	E	T
Copepoda gen. sp.	25,0	3,8	1,1	0,12	0,010	0,003	0,001	–	–	–
<i>Crassikorophium crassicorne</i>	75,0	110,1	17,2	3,64	0,13	0,02	0,01	–	–	T
<i>Crenomytilus grayanus</i>	12,5	3,8	1,5	0,12	6,75	2,73	0,65	–	–	–
<i>Diastylis alaskensis</i>	25,0	1,8	0,5	0,06	0,033	0,009	0,003	T	SE	IN
<i>Diastylopsis dawsoni</i>	100,0	69,8	7,6	2,31	0,81	0,09	0,08	MT	S	OP2
<i>Enipo tarasovi</i>	12,5	2,5	1,0	0,08	0,13	0,05	0,01	–	–	–
<i>Eudistylia polymorpha</i>	12,5	1,1	0,5	0,04	0,68	0,27	0,07	–	–	ES
<i>Eulalia</i> sp.	12,5	0,6	0,2	0,02	0,0011	0,0005	0,0001	–	–	IN
<i>Eyakia</i> sp.	12,5	2,8	1,1	0,09	0,006	0,002	0,001	–	–	ES
<i>Glycera rouxii</i>	25,0	2,5	0,7	0,08	0,35	0,11	0,03	–	–	–
<i>Glycera</i> sp.	12,5	0,6	0,2	0,02	0,11	0,05	0,01	I	SE	IN
<i>Glycinde armigera</i>	12,5	1,3	0,5	0,04	0,014	0,006	0,001	MT	E	IN
<i>Grandifoxus robustus</i>	12,5	1,7	0,7	0,06	0,0034	0,0014	0,0003	I	S	ES
<i>Halocynthia aurantium</i>	12,5	3,8	1,5	0,12	28,38	11,47	2,75	–	–	IN
<i>Harmothoe imbricata</i>	37,5	4,2	1,0	0,14	0,32	0,08	0,03	T	E	IN
<i>Hiatella arctica</i>	12,5	1,3	0,5	0,04	0,25	0,10	0,02	–	–	ES
<i>Lanassa</i> sp.	12,5	0,6	0,2	0,02	0,0028	0,0011	0,0003	S	E	ES
«<i>Lumbrineris longifolia</i>»	100,0	153,8	13,3	5,08	0,64	0,05	0,06	T	E	IN
<i>Maldane sarsi</i>	62,5	91,9	22,4	3,04	3,86	0,63	0,37	T	E	IN
<i>Melinna elisabethae</i>	12,5	1,3	0,5	0,04	0,006	0,003	0,001	T	E	T
<i>Menestho exarata</i>	87,5	113,3	17,9	3,74	0,72	0,09	0,07	MT	S	ES
<i>Metridium senile fimbriatum</i>	25,0	1,1	0,3	0,04	40,03	15,87	3,87	–	–	IN
<i>Modiolus difficilis</i>	12,5	1,3	0,5	0,04	0,80	0,32	0,08	–	–	ES
<i>Modiolus kurilensis</i>	12,5	7,5	3,0	0,25	27,45	11,09	2,66	–	–	ES
<i>Monoculodes crassirostris</i>	25,0	1,8	0,5	0,06	0,012	0,005	0,001	–	–	ES
<i>Monoculodes diamesus</i>	62,5	7,7	1,0	0,25	0,016	0,002	0,001	MT	S	OP2
<i>Monoculodes</i> sp.	37,5	4,3	1,0	0,14	0,010	0,003	0,001	T	E	IN
Mysidacea gen. sp.	25,0	4,5	1,4	0,15	0,12	0,04	0,01	–	–	–
<i>Nectoneanthes latipoda</i>	12,5	1,3	0,5	0,04	0,038	0,015	0,004	–	–	T
Nemertea fam. gen. sp.	37,5	29,8	11,0	0,98	0,52	0,20	0,05	MT	E	T
<i>Nereis longior galinae</i>	37,5	2,4	0,5	0,08	0,08	0,02	0,01	T	S	T
<i>Nymphon striatum</i>	12,5	1,3	0,5	0,04	0,013	0,005	0,001	–	–	ES
<i>Odostomia culta</i>	12,5	1,3	0,5	0,04	0,013	0,005	0,001	–	–	IN
Oenopotinae gen. sp.	12,5	1,3	0,5	0,04	0,11	0,05	0,01	–	–	–

Продолжение таблицы А.1

Таксон	<i>Fq</i>	<i>A</i> , экз./м ²	<i>SE</i>	<i>A</i> , %	<i>B</i> , г/м ²	<i>SE</i>	<i>B</i> , %	<i>Cont</i>	<i>Bion</i>	<i>Eutr</i>
<i>Pherusa plumosa</i>	12,5	1,3	0,5	0,04	0,025	0,010	0,002	T	E	T
<i>Pherusa schmidti</i>	12,5	1,3	0,5	0,04	0,025	0,010	0,002	–	–	–
<i>Philine argenata</i>	75,0	12,3	2,3	0,40	2,07	0,37	0,20	T	E	IN
<i>Pholoe minuta</i>	37,5	9,6	2,0	0,32	0,020	0,004	0,002	MT	SE	IN
<i>Phoronopsis harmeri</i>	37,5	540,0	177,7	17,84	246,26	81,92	23,83	T	E	T
Phyllodocidae gen. sp.	12,5	0,6	0,2	0,02	0,002	0,001	0,000	–	–	IN
<i>Pinnixa</i> sp.	50,0	12,0	2,2	0,40	0,35	0,06	0,03	–	–	ES
Polynoidae gen. sp.	25,0	3,1	1,0	0,10	0,28	0,11	0,03	MT	S	ES
<i>Potamocorbula amurensis</i>	12,5	25,0	10,1	0,83	3,48	1,40	0,34	MT	S	OP1
<i>Protocallithaca adamsi</i>	12,5	1,3	0,5	0,04	97,68	39,47	9,45	MT	E	T
<i>Protomedeia</i> sp.	12,5	3,8	1,5	0,12	0,010	0,004	0,001	S	S	IN
<i>Pusilona plicosa</i>	12,5	1,3	0,5	0,04	0,013	0,005	0,001	–	–	ES
<i>Raeta pulchella</i>	37,5	4,2	0,8	0,14	0,68	0,18	0,07	S	E	T
<i>Scalibregma inflatum</i>	50,0	21,3	4,7	0,70	3,83	0,91	0,37	T	E	T
<i>Schistomeringos japonica</i>	87,5	89,3	15,0	2,95	0,47	0,08	0,05	ET	E	OP1
<i>Scolelepis</i> sp.	25,0	3,4	0,9	0,11	0,037	0,010	0,004	MT	E	T
<i>Setia candida</i>	12,5	1,3	0,5	0,04	0,013	0,005	0,001	–	–	ES
<i>Sigambra bassi</i>	75,0	176,3	22,8	5,83	0,57	0,07	0,06	T	E	OP2
Styelidae gen. sp.	12,5	1,3	0,5	0,04	2,75	1,11	0,27	–	–	–
<i>Teinostoma atomaria</i>	12,5	3,8	1,5	0,12	0,025	0,010	0,002	–	–	IN
Terebellidae gen. sp.	12,5	0,0	0,0	0,00	0,034	0,014	0,003	MT	SE	T
Tubulanidae gen. sp.	12,5	1,3	0,5	0,04	0,08	0,03	0,01	–	–	–
<i>Turbonilla multigrata</i>	25,0	2,5	0,7	0,08	0,14	0,04	0,01	–	–	ES
<i>Westwoodilla</i> sp.	25,0	1,1	0,3	0,04	0,0023	0,0007	0,0002	T	S	IN
15. <i>Dipolydora cardalia</i>										
<i>Alitta brandti</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,13	0,13	0,19	–	–	ES
<i>Ampharete acutifrons</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,03	0,03	0,05	–	–	IN
<i>Ampharete</i> sp.	63,6	38,8	21,9	1,53	0,59	0,27	0,90	MT	E	IN
<i>Amphipholis kochii</i>	18,2	6,1	4,4	0,24	0,51	0,36	0,78	–	–	ES
Amphipoda fam. gen. sp.	9,1	1,2	1,3	0,05	0,005	0,005	0,007	–	–	–
<i>Anisocorbula venusta</i>	18,2	13,3	11,5	0,53	0,69	0,50	1,06	ET	E	OP2
<i>Anobothrus gracilis</i>	18,2	2,4	1,7	0,10	0,06	0,05	0,09	–	–	T
<i>Anonyx laticoxae</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,20	0,20	0,30	–	–	IN
<i>Anonyx nugax</i>	9,1	2,4	2,5	0,10	0,37	0,39	0,57	–	–	–
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	54,5	23,0	9,8	0,91	0,48	0,25	0,73	ET	E	OP2
<i>Axinopsida subquadrata</i>	63,6	18,2	9,7	0,72	0,15	0,06	0,22	MT	E	IN
<i>Bela erosa</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,01	0,01	0,01	MT	E	IN
<i>Capitella capitata</i>	9,1	2,4	2,5	0,10	0,01	0,01	0,02	ET	E	OP1
<i>Caprella acanthogaster</i>	18,2	59,4	60,9	2,35	0,57	0,59	0,87	–	–	IN
<i>Cerebratulus marginatus</i>	27,3	15,8	12,6	0,62	1,16	0,81	1,77	MT	SE	T
<i>Chaetozone setosa</i>	72,7	29,1	11,3	1,15	0,41	0,21	0,63	ET	E	T
<i>Crangon septemspinosa</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,16	0,17	0,24	–	–	ES
<i>Crenella decussata</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,01	0,01	0,02	–	–	IN
<i>Demonax fullo</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,03	0,03	0,04	–	–	ES
<i>Derjuginella rufofasciata</i>	18,2	4,8	3,4	0,19	0,28	0,21	0,43	–	–	ES
<i>Diastilyx alaskensis</i>	54,5	26,7	13,1	1,05	0,20	0,08	0,31	T	SE	IN
<i>Dipolydora cardalia</i>	100,0	969,7	348,9	38,35	12,78	4,49	19,52	T	E	OP2

Продолжение таблицы А.1

Таксон	<i>Fq</i>	<i>A</i> , экз./м ²	<i>SE</i>	<i>A</i> , %	<i>B</i> , г/м ²	<i>SE</i>	<i>B</i> , %	<i>Cont</i>	<i>Bion</i>	<i>Eutr</i>
<i>Ennucula tenuis</i>	81,8	77,6	24,9	3,07	2,80	0,94	4,28	T	E	IN
<i>Eteone longa</i>	63,6	36,4	18,5	1,44	0,49	0,23	0,74	T	E	T
<i>Euchone</i> sp.	9,1	1,2	1,3	0,05	0,004	0,004	0,006	–	–	IN
<i>Eulalia bilineata</i>	100,0	104,2	37,3	4,12	1,54	0,62	2,36	T	E	IN
<i>Eumida sanguinea</i>	45,5	14,5	6,1	0,58	0,04	0,02	0,06	T	S	IN
<i>Glycera capitata</i>	100,0	93,3	16,8	3,69	1,69	0,51	2,59	T	E	IN
<i>Glycera chirori</i>	18,2	4,8	3,9	0,19	1,01	1,00	1,54	T	S	IN
<i>Glycinde armigera</i>	27,3	10,9	6,8	0,43	0,12	0,10	0,18	MT	E	IN
<i>Goniada maculata</i>	81,8	41,2	12,4	1,63	2,24	0,77	3,42	MT	E	IN
<i>Harmothoe imbricata</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,15	0,16	0,23	T	E	IN
<i>Hemigrapsus sanguineus</i>	18,2	2,4	1,7	0,10	0,35	0,33	0,54	–	–	IN
<i>Heteromastus giganteus</i>	45,5	18,2	9,1	0,72	0,16	0,11	0,24	T	S	OP2
<i>Heteromastus</i> sp.	18,2	3,6	2,7	0,14	0,03	0,02	0,04	–	–	OP2
<i>Homalopoma amussitata</i>	9,1	2,4	2,5	0,10	0,01	0,01	0,02	–	–	IN
<i>Hyas coarctatus</i>	18,2	3,6	2,7	0,14	0,82	0,64	1,26	–	–	ES
<i>Laonice cirrata</i>	18,2	2,4	1,7	0,10	0,21	0,18	0,33	I	S	IN
<i>Lumbrineris japonica</i>	45,5	12,1	5,8	0,48	2,52	1,29	3,85	T	SE	IN
« <i>Lumbrineris longifolia</i> »	90,9	201,2	48,5	7,96	0,99	0,24	1,51	T	E	IN
<i>Lumbrineris</i> sp.	18,2	3,6	2,7	0,14	0,04	0,03	0,05	T	E	IN
<i>Macoma</i> sp.	45,5	6,1	2,2	0,24	0,61	0,23	0,93	T	E	IN
<i>Maldane sarsi</i>	63,6	204,8	167,0	8,10	4,55	2,77	6,95	T	E	IN
Maldanidae sp.	63,6	20,6	8,3	0,81	0,48	0,25	0,74	I	E	ES
<i>Mediomastus californiensis</i>	54,5	35,2	19,0	1,39	0,03	0,02	0,05	MT	E	T
<i>Melanochlamys diomedea</i>	27,3	4,8	2,8	0,19	0,10	0,06	0,15	MT	S	ES
<i>Melinna elisabethae</i>	36,4	46,1	34,8	1,82	3,45	2,36	5,26	T	E	T
<i>Melita</i> sp.	18,2	2,4	1,7	0,10	0,005	0,004	0,007	–	–	IN
<i>Menestho exarata</i>	18,2	3,6	2,7	0,14	0,05	0,05	0,08	MT	S	ES
<i>Monoculodes latimanus</i>	9,1	2,4	2,5	0,10	0,002	0,003	0,004	–	–	ES
<i>Monoculodes</i> sp.	54,5	14,5	5,8	0,58	0,08	0,04	0,13	–	–	IN
<i>Monoculodes tuberculatus</i>	18,2	2,4	1,7	0,10	0,02	0,01	0,03	–	–	ES
<i>Mya japonica</i>	9,1	3,6	3,8	0,14	0,57	0,60	0,87	MT	S	ES
<i>Mya uzenensis</i>	54,5	20,6	8,9	0,81	8,39	4,02	12,81	T	SE	T
<i>Nectocrangon lar lar</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,12	0,13	0,19	–	–	–
<i>Nephtys longosetosa</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,25	0,26	0,38	I	S	IN
<i>Nereis longior galinae</i>	63,6	23,0	9,3	0,91	0,48	0,26	0,73	T	S	T
<i>Notomastus annenkovae</i>	9,1	2,4	2,5	0,10	0,07	0,07	0,10	–	–	T
<i>Notomastus</i> sp.	18,2	4,8	3,9	0,19	0,04	0,03	0,07	–	–	T
<i>Odius kelleri</i>	18,2	3,6	2,7	0,14	0,01	0,01	0,01	T	E	–
<i>Oenopota</i> sp.	27,3	6,1	3,5	0,24	0,18	0,15	0,28	T	E	ES
<i>Onuphis iridescens</i>	18,2	14,5	12,7	0,58	0,43	0,43	0,66	I	SE	IN
<i>Onuphis shirikishinaiensis</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,01	0,01	0,01	I	SE	IN
<i>Onuphis</i> sp.	9,1	2,4	2,5	0,10	0,03	0,04	0,05	I	S	IN
<i>Ophiura sarsii</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,61	0,64	0,93	MT	E	IN
<i>Paranaitis polynoides</i>	18,2	3,6	2,7	0,14	0,03	0,03	0,05	S	S	IN
<i>Paraphoxus simplex</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,002	0,003	0,004	–	–	IN
<i>Pectinaria hyperborea</i>	18,2	3,6	2,7	0,14	0,07	0,05	0,11	MT	SE	ES
<i>Pectinaria koreni</i>	18,2	3,6	2,7	0,14	0,47	0,41	0,71	–	–	–

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Pherusa plumosa</i>	27,3	6,1	3,5	0,24	0,81	0,60	1,24	T	E	T
<i>Philine</i> sp.	63,6	18,2	6,0	0,72	0,49	0,20	0,75	S	E	IN
<i>Phyllodoce groenlandica</i>	9,1	2,4	2,5	0,10	0,05	0,05	0,07	MT	E	OP2
<i>Phyllodoce maculata</i>	18,2	3,6	2,7	0,14	0,01	0,01	0,01	–	–	IN
<i>Phyllodoce</i> sp.	27,3	6,1	3,9	0,24	0,11	0,11	0,17	–	–	IN
<i>Pinnixa rathbuni</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,01	0,01	0,02	–	–	ES
<i>Platynereis bicanaculata</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,03	0,03	0,04	–	–	IN
<i>Pleusymtes</i> sp.	18,2	4,8	3,4	0,19	0,05	0,03	0,07	–	–	T
<i>Potamilla</i> sp.	9,1	1,2	1,3	0,05	0,05	0,05	0,07	–	–	IN
<i>Praxillella praetermissa</i>	9,1	8,5	8,9	0,34	0,65	0,68	0,99	MT	E	T
<i>Priapulius caudatus</i>	36,4	7,3	3,5	0,29	3,64	1,73	5,55	T	E	T
<i>Prionospio steenstrupi</i>	18,2	2,4	1,7	0,10	0,002	0,002	0,004	–	–	OP2
<i>Protocallithaca adamsi</i>	27,3	6,1	3,5	0,24	0,33	0,22	0,50	MT	E	T
<i>Protomedeia</i> sp.	9,1	1,2	1,3	0,05	0,02	0,02	0,03	S	S	IN
<i>Pseudoscalibregma parvum</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,01	0,01	0,01	–	–	T
<i>Raeta pulchella</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,19	0,20	0,30	S	E	T
Rissoidae gen. sp.	18,2	2,4	1,7	0,10	0,07	0,05	0,11	–	–	ES
Sabellidae gen. sp.	18,2	2,4	1,7	0,10	0,09	0,08	0,13	MT	SE	ES
<i>Samythella</i> sp.	9,1	2,4	2,5	0,10	0,04	0,05	0,07	–	–	IN
<i>Saxidomus purpuratus</i>	18,2	3,6	2,7	0,14	0,19	0,14	0,30	–	–	IN
<i>Scalibregma inflatum</i>	54,5	15,8	6,8	0,62	0,72	0,48	1,09	T	E	T
<i>Schistomeringos japonica</i>	18,2	4,8	3,4	0,19	0,08	0,06	0,11	ET	E	OP1
<i>Scolelepis</i> sp.	36,4	17,0	8,7	0,67	0,15	0,07	0,22	MT	E	T
<i>Scoloplos armiger</i>	72,7	52,1	18,0	2,06	1,98	0,70	3,03	MT	E	T
<i>Sphaerodoropsis minuta</i>	45,5	6,1	2,2	0,24	0,04	0,03	0,07	T	S	IN
<i>Spiophanes bombyx</i>	63,6	21,8	9,8	0,86	0,20	0,09	0,31	I	E	IN
<i>Tiron spiniferus</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,004	0,004	0,006	–	–	ES
<i>Turbonilla</i> sp.	9,1	2,4	2,5	0,10	0,09	0,10	0,14	–	–	ES
<i>Turtonia minuta</i>	18,2	13,3	10,5	0,53	0,07	0,06	0,11	–	–	IN
<i>Typosyllis orstedii</i>	9,1	1,2	1,3	0,05	0,001	0,001	0,002	–	–	IN
<i>Volvulella sculpturata</i>	9,1	3,6	3,8	0,14	0,09	0,10	0,14	–	–	IN
<i>Westwoodilla caecula</i>	18,2	2,4	1,7	0,10	0,005	0,003	0,007	–	–	IN
<i>Westwoodilla</i> sp.	18,2	2,4	1,7	0,10	0,01	0,01	0,01	T	S	IN
<i>Yoldia</i> sp.	18,2	2,4	1,7	0,10	0,03	0,03	0,04	MT	SE	ES
11. <i>Philine argentata</i> + <i>Macoma</i> sp.										
<i>Acila insignis</i>	20,0	7,3	7,3	0,51	2,19	2,19	2,14	S	SE	–
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	60,4	450,0	407,9	31,25	2,05	1,98	2,01	ET	E	OP2
<i>Arabella</i> sp.	40,0	3,6	2,7	0,25	0,09	0,09	0,09	–	–	ES
<i>Asterias amurensis</i>	20,0	0,9	0,9	0,06	9,09	9,09	8,91	ET	SE	OP2
<i>Asterina pectinifera</i>	60,0	1,8	0,9	0,13	7,68	3,51	7,53	–	–	IN
Atelecyclidae fam. gen. sp.	20,0	0,9	0,9	0,06	0,002	0,002	0,002	–	–	–
<i>Bela erosa</i>	20,0	4,5	4,5	0,32	0,39	0,39	0,38	MT	E	IN
Brachiura fam. gen. sp.	20,0	0,9	0,9	0,06	0,01	0,01	0,01	–	–	–
<i>Calianassa japonica</i>	20,0	0,9	0,9	0,06	0,003	0,003	0,003	–	–	–
<i>Capitella capitata</i>	60,4	52,3	47,8	3,63	0,44	0,41	0,43	ET	E	OP1
<i>Cerebratulus marginatus</i>	40,0	1,4	0,9	0,09	0,95	0,59	0,94	MT	SE	T
<i>Cerebratulus</i> sp.	20,0	0,5	0,5	0,03	0,07	0,07	0,07	–	–	T

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Chaetozone setosa</i>	20,0	4,5	4,5	0,32	0,02	0,02	0,02	ET	E	T
<i>Chone cincta</i>	40,2	2,3	1,8	0,16	0,01	0,01	0,01	ET	S	OP2
<i>Cistenides</i> sp.	20,0	0,9	0,9	0,06	0,01	0,01	0,01	–	–	ES
<i>Dipolydora cardalia</i>	60,0	210,9	93,2	14,65	0,95	0,45	0,93	T	E	OP2
<i>Echinocardium cordatum</i>	20,2	1,8	1,8	0,13	3,20	3,20	3,14	I	S	ES
<i>Edwardsia japonica</i>	20,0	0,5	0,5	0,03	0,01	0,01	0,01	MT	SE	T
<i>Ennucula tenuis</i>	20,0	0,9	0,9	0,06	0,02	0,02	0,02	T	E	IN
<i>Eriocheir japonica</i>	20,0	0,5	0,5	0,03	0,05	0,05	0,05	–	–	IN
<i>Eteone longa</i>	20,0	10,9	10,9	0,76	0,03	0,03	0,03	T	E	T
<i>Felaniella usta</i>	20,0	6,4	6,4	0,44	0,05	0,05	0,05	I	S	ES
Gammaridae fam. gen. sp.	20,0	0,5	0,5	0,03	0,0005	0,0005	0,0004	–	–	ES
<i>Genetyllis costanea</i>	40,0	4,1	2,7	0,28	0,03	0,02	0,03	–	–	–
<i>Glycera capitata</i>	60,2	205,9	136,8	14,30	1,12	0,84	1,10	T	E	IN
<i>Glycera tessellata</i>	20,0	0,9	0,9	0,06	0,23	0,23	0,22	S	S	IN
<i>Grandifoxus longirostris</i>	20,0	6,4	6,4	0,44	0,01	0,01	0,01	I	S	ES
<i>Harmothoe</i> sp.	20,0	1,4	1,4	0,09	0,005	0,005	0,004	T	E	IN
<i>Hiatella arctica</i>	20,0	0,9	0,9	0,06	0,02	0,02	0,02	–	–	ES
<i>Leucon nasica</i>	20,0	0,9	0,9	0,06	0,18	0,18	0,18	–	–	IN
«<i>Lumbrineris longifolia</i>»	60,0	27,3	14,4	1,89	0,84	0,55	0,83	T	E	IN
<i>Macoma calcarea</i>	20,0	6,4	6,4	0,44	0,20	0,20	0,20	MT	S	IN
<i>Macoma incongrua</i>	20,0	7,7	7,7	0,54	0,13	0,13	0,13	MT	S	IN
<i>Macoma</i> sp.	80,2	10,5	6,6	0,73	68,45	68,11	67,11	T	E	IN
<i>Macoma tokyoensis</i>	20,0	2,7	2,7	0,19	0,01	0,01	0,01	MT	SE	IN
<i>Magelona longicornis</i>	20,0	0,5	0,5	0,03	0,02	0,02	0,02	T	E	IN
<i>Magelona pacifica</i>	20,0	2,3	2,3	0,16	0,01	0,01	0,01	S	S	ES
<i>Mediomastus californiensis</i>	20,0	151,3	151,3	10,51	0,11	0,11	0,11	MT	E	T
<i>Monoculodes breviops</i>	20,0	0,9	0,9	0,06	0,005	0,005	0,004	–	–	ES
<i>Mya pseudoarenaria</i>	20,0	1,4	1,4	0,09	0,19	0,19	0,19	T	E	T
<i>Mya</i> sp.	20,0	0,9	0,9	0,06	0,01	0,01	0,01	MT	E	T
<i>Neomysis czerniawskii</i>	20,0	0,5	0,5	0,03	0,05	0,05	0,05	–	–	IN
<i>Nephtys caeca</i>	20,0	0,9	0,9	0,06	0,11	0,11	0,11	S	S	IN
<i>Nereis</i> sp.	20,0	2,7	2,7	0,19	0,12	0,12	0,12	ET	E	OP2
<i>Nereis zonata</i>	20,2	1,8	1,8	0,13	0,03	0,03	0,03	MT	SE	T
<i>Nothria holobranchiata</i>	40,0	24,1	14,8	1,67	0,21	0,14	0,21	–	–	IN
<i>Obesotoma</i> sp.	20,0	0,5	0,5	0,03	0,005	0,005	0,004	–	–	ES
<i>Onuphis iridescens</i>	20,0	20,0	20,0	1,39	0,14	0,14	0,14	I	SE	IN
<i>Ophiodermella ogurana</i>	20,0	0,9	0,9	0,06	0,02	0,02	0,02	–	–	ES
<i>Ophiura sarsii</i>	20,0	0,5	0,5	0,03	0,05	0,05	0,04	MT	E	IN
<i>Paradorippe granulata</i>	40,2	2,3	1,8	0,16	0,02	0,02	0,02	MT	E	IN
<i>Philine argentata</i>	100,0	59,5	16,9	4,13	0,90	0,40	0,89	T	E	IN
<i>Pinnixa rathbuni</i>	40,0	7,7	7,2	0,54	0,19	0,19	0,19	T	E	ES
<i>Prionospio malmgreni</i>	20,0	2,7	2,7	0,19	0,001	0,001	0,001	ET	E	OP2
<i>Protocallithaca adamsi</i>	20,0	1,4	1,4	0,09	0,18	0,18	0,18	MT	E	T
<i>Scalibregma inflatum</i>	20,0	9,1	9,1	0,63	0,10	0,10	0,10	T	E	T
<i>Schistomeringos japonica</i>	20,0	21,4	21,4	1,48	0,02	0,02	0,02	ET	E	OP1
<i>Scolecopsis fuliginosa</i>	60,0	53,2	32,0	3,69	0,31	0,15	0,31	–	–	–
<i>Sigambra bassi</i>	20,0	2,7	2,7	0,19	0,003	0,003	0,003	T	E	OP2

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Spiophanes bombyx</i>	40,0	26,4	19,4	1,83	0,13	0,10	0,12	I	E	IN
<i>Spiophanes uschakovi</i>	20,0	1,4	1,4	0,09	0,005	0,005	0,004	–	–	T
<i>Telmessus cheiragonus</i>	40,0	1,8	1,1	0,13	0,01	0,01	0,01	–	–	ES
<i>Tritodynamia rathbuni</i>	40,0	1,4	0,9	0,09	0,01	0,01	0,01	–	–	IN
Turridae gen. sp.	20,0	0,5	0,5	0,03	0,47	0,47	0,46	–	–	–
18. <i>Ophiura sarsii</i> + <i>Macoma scarlatoi</i>										
<i>Ampharete</i> sp.	50,0	2,5	1,7	0,16	0,09	0,08	0,02	MT	E	IN
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	100,0	242,5	96,9	15,26	6,22	3,36	1,63	ET	E	OP2
<i>Arabella iricolor</i>	25,0	3,8	4,3	0,24	2,25	2,60	0,59	–	–	ES
<i>Asterias amurensis</i>	50,0	2,5	1,7	0,16	1,05	1,08	0,27	ET	SE	OP2
<i>Axinopsida subquadrata</i>	50,0	11,3	11,1	0,71	0,07	0,04	0,02	MT	E	IN
<i>Cerebratulus signatus</i>	25,0	1,3	1,4	0,08	0,06	0,07	0,02	–	–	T
<i>Cerebratulus</i> sp.	50,0	2,5	1,7	0,16	1,46	1,03	0,38	–	–	T
<i>Chaetozone setosa</i>	100,0	15,0	9,7	0,94	1,11	0,90	0,29	ET	E	T
<i>Cistenides granulata</i>	25,0	1,3	1,4	0,08	0,09	0,10	0,02	–	–	IN
<i>Cryptonatica janthostoma</i>	25,0	1,3	1,4	0,08	5,76	6,65	1,51	I	SE	ES
<i>Diastylis bidentata</i>	25,0	1,3	1,4	0,08	0,005	0,006	0,001	–	–	ES
<i>Dipolydora cardalia</i>	50,0	203,8	157,1	12,82	3,58	3,07	0,93	T	E	OP2
<i>Edwardsia japonica</i>	25,0	1,3	1,4	0,08	0,10	0,12	0,03	MT	SE	T
<i>Ennucula tenuis</i>	50,0	3,8	2,8	0,24	0,21	0,15	0,06	T	E	IN
<i>Eteone longa</i>	100,0	8,8	2,8	0,55	0,10	0,03	0,03	T	E	T
<i>Eulalia bilineata</i>	25,0	2,5	2,9	0,16	0,05	0,05	0,01	T	E	IN
<i>Glycera capitata</i>	100,0	55,0	31,5	3,46	0,93	0,51	0,24	T	E	IN
<i>Goniada maculata</i>	75,0	10,0	5,3	0,63	0,55	0,25	0,14	MT	E	IN
<i>Harmothoe imbricata</i>	25,0	2,5	2,9	0,16	0,08	0,09	0,02	T	E	IN
<i>Laonice cirrata</i>	25,0	1,3	1,4	0,08	0,19	0,22	0,05	I	S	IN
Lineidae gen. sp.	25,0	1,3	1,4	0,08	0,98	1,13	0,25	I	E	IN
«<i>Lumbrineris longifolia</i>»	100,0	73,8	27,9	4,64	0,78	0,17	0,20	T	E	IN
<i>Macoma scarlatoi</i>	100,0	35,0	13,5	2,20	274,88	97,57	71,86	ET	SE	T
<i>Maldane sarsi</i>	25,0	1,3	1,4	0,08	0,03	0,03	0,01	T	E	IN
<i>Mya</i> sp.	25,0	2,5	2,9	0,16	3,70	4,27	0,97	MT	E	T
<i>Mya truncata</i>	50,0	3,8	2,8	0,24	6,13	4,24	1,60	T	E	T
<i>Najna consiliorum</i>	25,0	1,3	1,4	0,08	0,013	0,014	0,003	–	–	–
Nemertea fam. gen. sp.	25,0	1,3	1,4	0,08	0,06	0,07	0,02	MT	E	T
<i>Notomastus latericeus</i>	50,0	5,0	4,1	0,31	0,11	0,08	0,03	ET	E	IN
<i>Ophiura sarsii</i>	100,0	618,8	270,9	38,94	35,70	13,03	9,33	MT	E	IN
<i>Orbinia</i> sp.	25,0	1,3	1,4	0,08	0,013	0,014	0,003	–	–	ES
<i>Owenia fusiformis</i>	25,0	7,5	8,7	0,47	0,08	0,09	0,02	MT	E	IN
<i>Pandalus goniurus</i>	25,0	3,8	4,3	0,24	6,54	7,55	1,71	–	–	IN
<i>Pherusa plumosa</i>	50,0	32,5	35,6	2,05	16,14	17,18	4,22	T	E	T
<i>Philine orientalis</i>	50,0	3,8	2,8	0,24	0,42	0,30	0,11	T	E	IN
<i>Phoronopsis harmeri</i>	75,0	11,3	9,2	0,71	0,06	0,04	0,02	T	E	T
<i>Pinnixa rathbuni</i>	25,0	1,3	1,4	0,08	0,03	0,03	0,01	T	E	ES
<i>Priapulius caudatus</i>	75,0	6,3	2,8	0,39	6,23	4,24	1,63	T	E	T
<i>Scalibregma inflatum</i>	25,0	1,3	1,4	0,08	0,09	0,10	0,02	T	E	T
<i>Schistomeringos japonica</i>	100,0	42,5	27,3	2,67	0,40	0,29	0,10	ET	E	OP1
<i>Scoloplos armiger</i>	100,0	148,8	65,5	9,36	5,13	2,69	1,34	MT	E	T

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Sigambra bassi</i>	25,0	6,3	7,2	0,39	0,06	0,07	0,02	T	E	OP2
<i>Spiophanes bombyx</i>	25,0	1,3	1,4	0,08	0,013	0,014	0,003	I	E	IN
<i>Synidotea cinerea</i>	50,0	2,5	1,7	0,16	0,08	0,05	0,02	T	SE	T
<i>Yoldia johanni</i>	25,0	1,3	1,4	0,08	0,91	1,05	0,24	S	S	ES
<i>20. Phoronopsis harmeri</i>										
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	100	500	297	10,1	10,42	5,82	1,17	ET	E	OP2
Ascidia fam. gen. sp.	33,3	5	6,1	0,1	15,53	19,02	1,74	MT	SE	T
<i>Bispira</i> sp.	33,3	1,7	2	0,03	0,47	0,57	0,05	–	–	ES
<i>Cheilonereis</i> sp.	33,3	6,7	8,2	0,13	1,18	1,45	0,13	ET	SE	OP1
<i>Cirratulus cirratus</i>	66,7	8,3	7,4	0,17	0,23	0,2	0,03	T	E	T
<i>Diastylopsis dawsoni</i>	33,3	1,7	2	0,03	0,005	0,006	0,001	MT	S	OP2
<i>Harmothoe imbricata</i>	33,3	1,7	2	0,03	0,37	0,45	0,04	T	E	IN
<i>Harmothoe</i> sp.	33,3	3,3	4,1	0,07	0,18	0,22	0,02	T	E	IN
« <i>Lumbrineris longifolia</i> »	66,7	31,7	25,1	0,64	0,3	0,23	0,03	T	E	IN
<i>Magelona longicornis</i>	66,7	10	9,4	0,2	0,25	0,25	0,03	T	E	IN
<i>Maldane sarsi</i>	100	13,3	10,2	0,27	0,73	0,78	0,08	T	E	IN
<i>Nereis</i> sp.	33,3	1,7	2	0,03	0,05	0,06	0,01	ET	E	OP2
<i>Nereis zonata</i>	33,3	1,7	2	0,03	0,23	0,29	0,03	MT	SE	T
<i>Notomastus latericeus</i>	66,7	60	40,8	1,21	1,75	1,16	0,2	ET	E	IN
<i>Ophiura sarsii</i>	66,7	58,3	68,4	1,18	10,21	12,49	1,14	MT	E	IN
<i>Philine orientalis</i>	33,3	3,3	4,1	0,07	1,02	1,25	0,11	T	E	IN
<i>Phoronopsis harmeri</i>	100	4000	2392	80,7	822,8	640	92,03	T	E	T
<i>Pinnixa rathbuni</i>	66,7	5	3,5	0,1	0,22	0,16	0,02	T	E	ES
<i>Polydora</i> sp.	66,7	25	17,7	0,5	0,9	0,98	0,1	I	E	T
<i>Priapulius caudatus</i>	66,7	6,7	4,1	0,13	11,8	14,18	1,32	T	E	T
<i>Scalibregma inflatum</i>	66,7	33,3	20,7	0,67	13,15	8,23	1,47	T	E	T
Scalibregmidae gen. sp.	33,3	3,3	4,1	0,07	0,07	0,08	0,01	–	–	–
<i>Schistomeringos japonica</i>	100	36,7	17,4	0,74	0,38	0,17	0,04	ET	E	OP1
<i>Scoloplos armiger</i>	66,7	13,3	8,9	0,27	0,25	0,2	0,03	MT	E	T
<i>Sigambra bassi</i>	66,7	125	135,1	2,52	1,6	1,75	0,18	T	E	OP2
<i>22. «Lumbrineris longifolia»</i>										
<i>Acila insignis</i>	50,0	7,5	6,9	0,33	0,69	0,74	0,22	S	SE	–
Actiniaria fam. gen. sp.	50,0	2,5	1,7	0,11	0,61	0,43	0,19	MT	E	IN
<i>Ampharete</i> sp.	75,0	46,3	28,2	2,03	1,04	0,69	0,33	MT	E	IN
Ampharetidae gen. sp.	25,0	28,8	33,2	1,26	0,34	0,39	0,11	S	SE	T
<i>Aricidea catherinae</i>	75,0	61,3	48,3	2,69	0,93	0,70	0,29	MT	SE	ES
<i>Asabellides sibirica</i>	25,0	68,8	79,4	3,02	0,36	0,42	0,11	T	SE	ES
Ascidia fam. gen. sp.	50,0	25,0	25,2	1,10	1,63	1,52	0,51	MT	SE	T
<i>Chone</i> sp.	50,0	11,3	11,1	0,49	0,12	0,13	0,04	T	E	IN
<i>Crangon amurensis</i>	50,0	2,5	1,7	0,11	0,50	0,47	0,16	T	E	ES
<i>Diastyls alaskensis</i>	25,0	1,3	1,4	0,05	0,01	0,01	0,00	T	SE	IN
<i>Diastylopsis dawsoni</i>	25,0	1,3	1,4	0,05	0,00	0,00	0,00	MT	S	OP2
<i>Dosinia angulosa</i>	25,0	1,3	1,4	0,05	43,54	50,27	13,66	–	–	ES
<i>Edwardsia</i> sp.	50,0	13,8	12,3	0,60	4,65	4,01	1,46	–	–	–
<i>Eteone</i> sp.	25,0	2,5	2,9	0,11	0,01	0,01	0,00	–	–	T
<i>Glycera capitata</i>	50,0	25,0	25,2	1,10	0,89	0,60	0,28	T	E	IN
<i>Glycinde armigera</i>	75,0	56,3	32,8	2,47	0,59	0,34	0,18	MT	E	IN

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Harmothoe</i> sp.	25,0	2,5	2,9	0,11	0,13	0,14	0,04	T	E	IN
Lineidae gen. sp.	25,0	2,5	2,9	0,11	0,99	1,14	0,31	I	E	IN
<i>Liocyma fluctuosa</i>	25,0	1,3	1,4	0,05	0,02	0,02	0,01	I	S	ES
<i>Luidia quinaria bispinosa</i>	25,0	1,3	1,4	0,05	21,13	24,39	6,63	–	–	ES
«Lumbrineris longifolia»	100,0	686,3	221,9	30,15	6,66	2,11	2,09	T	E	IN
<i>Macoma calcarea</i>	25,0	2,5	2,9	0,11	15,25	17,61	4,78	MT	S	IN
<i>Macoma</i> sp.	50,0	3,8	2,8	0,16	0,31	0,27	0,10	T	E	IN
<i>Macoma tokyoensis</i>	50,0	5,0	4,1	0,22	31,46	24,34	9,87	MT	SE	IN
<i>Magelona longicornis</i>	25,0	2,5	2,9	0,11	0,14	0,16	0,04	T	E	IN
<i>Maldane sarsi</i>	75,0	720,0	635,5	31,63	47,68	34,63	14,95	T	E	IN
Maldanidae gen. sp.	25,0	2,5	2,9	0,11	0,06	0,07	0,02	I	E	ES
<i>Melinna elisabethae</i>	25,0	3,8	4,3	0,16	0,13	0,14	0,04	T	E	T
<i>Monoculodes breviops</i>	25,0	1,3	1,4	0,05	0,00	0,00	0,00	–	–	ES
<i>Mya japonica</i>	50,0	3,8	2,8	0,16	0,07	0,05	0,02	MT	S	ES
<i>Mya</i> sp.	50,0	2,5	1,7	0,11	0,31	0,27	0,10	MT	E	T
Nemertea fam. gen. sp.	50,0	8,8	8,3	0,38	0,79	0,59	0,25	MT	E	T
Nereidae gen. sp.	50,0	3,8	2,8	0,16	0,08	0,06	0,02	T	E	OP2
<i>Nereis</i> sp.	50,0	5,0	3,3	0,22	0,56	0,52	0,18	ET	E	OP2
<i>Notomastus latericeus</i>	50,0	42,5	34,0	1,87	0,40	0,31	0,13	ET	E	IN
<i>Obelia longissima</i>	25,0	61,3	70,7	2,69	3,71	4,29	1,16	–	–	IN
Oenopotinae gen. sp.	25,0	1,3	1,4	0,05	0,14	0,16	0,04	–	–	–
<i>Onuphis iridescens</i>	25,0	2,5	2,9	0,11	0,10	0,12	0,03	I	SE	IN
<i>Pectinaria</i> sp.	25,0	1,3	1,4	0,05	0,06	0,07	0,02	–	–	ES
<i>Philine argentata</i>	100,0	30,0	11,1	1,32	1,25	0,52	0,39	T	E	IN
<i>Phoronopsis harmeri</i>	25,0	100,0	115,5	4,39	5,25	6,06	1,65	T	E	T
<i>Pinnixa rathbuni</i>	25,0	7,5	8,7	0,33	0,26	0,29	0,08	T	E	ES
<i>Pontoporeia affinis</i>	25,0	23,8	27,4	1,04	0,32	0,37	0,10	–	–	–
<i>Potamilla reniformis</i>	25,0	2,5	2,9	0,11	2,86	3,31	0,90	T	SE	IN
<i>Potamocorbula amurensis</i>	25,0	5,0	5,8	0,22	2,73	3,15	0,85	MT	S	OP1
<i>Protothaca jedoyensis</i>	25,0	2,5	2,9	0,11	81,78	94,43	25,65	MT	SE	IN
<i>Raeta pulchella</i>	25,0	1,3	1,4	0,05	0,02	0,02	0,01	S	E	T
<i>Scapharca broughtoni</i>	25,0	2,5	2,9	0,11	0,23	0,26	0,07	–	–	OP2
<i>Serripes groenlandicus</i>	25,0	1,3	1,4	0,05	32,96	38,06	10,34	S	S	ES
<i>Sigambra bassi</i>	100,0	61,3	30,3	2,69	0,73	0,38	0,23	T	E	OP2
Sipuncula fam. gen. sp.	50,0	17,5	13,6	0,77	3,15	3,35	0,99	MT	SE	ES
Spionidae gen. sp.	25,0	22,5	26,0	0,99	0,25	0,29	0,08	MT	E	T
<i>Theora lubrica</i>	75,0	36,3	25,5	1,59	0,66	0,32	0,21	T	E	T
<i>Yoldia</i> sp.	75,0	40,0	25,5	1,76	0,31	0,19	0,10	MT	SE	ES
12. <i>Aphelochaeta pacifica</i>										
<i>Anonyx nugax</i>	25,3	9,1	6,4	0,58	0,15	0,15	1,67	–	–	–
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	100,0	902,2	513,4	57,32	5,86	4,70	65,15	ET	E	OP2
<i>Capitella capitata</i>	75,0	365,9	159,0	23,24	1,14	1,09	12,69	ET	E	OP1
Capitellidae gen. sp.	25,0	5,7	5,7	0,36	0,08	0,08	0,88	MT	SE	OP1
<i>Chaetozone setosa</i>	25,0	3,4	3,4	0,22	0,07	0,07	0,76	ET	E	T
<i>Chone cincta</i>	25,3	5,7	5,7	0,36	0,11	0,11	1,20	ET	S	OP2
<i>Crangon amurensis</i>	25,0	2,3	2,3	0,14	0,02	0,02	0,19	T	E	ES
Cyclobranchia fam. gen. sp.	25,0	2,3	2,3	0,14	0,02	0,02	0,19	–	–	–

Продолжение таблицы А.1

Таксон	<i>Fq</i>	<i>A</i> , экз./м ²	<i>SE</i>	<i>A</i> , %	<i>B</i> , г/м ²	<i>SE</i>	<i>B</i> , %	<i>Cont</i>	<i>Bion</i>	<i>Eutr</i>
<i>Nereis</i> sp.	50,3	262,5	253,5	16,68	0,98	0,63	10,86	ET	E	OP2
<i>Paradorippe granulata</i>	25,0	1,1	1,1	0,07	0,01	0,01	0,16	MT	E	IN
Sabellidae gen. sp.	25,0	1,1	1,1	0,07	0,01	0,01	0,08	MT	SE	ES
<i>Schistomeringos japonica</i>	50,0	12,5	12,5	0,79	0,87	0,48	9,67	ET	E	OP1
<i>17. Aphelochaeta pacifica + Capitella capitata</i>										
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	80,0	338,0	152,3	54,60	3,40	1,53	20,86	ET	E	OP2
<i>Capitella capitata</i>	80,0	65,0	37,6	10,50	0,62	0,39	3,78	ET	E	OP1
<i>Chaetozone setosa</i>	20,0	2,0	2,2	0,32	0,03	0,03	0,18	ET	E	T
<i>Cirratulus cirratus</i>	20,0	2,0	2,2	0,32	0,26	0,29	1,60	T	E	T
Lineidae gen. sp.	20,0	2,0	2,2	0,32	0,10	0,11	0,61	I	E	IN
<i>Lumbrineris longifolia</i>	20,0	4,0	4,5	0,65	0,01	0,01	0,07	T	E	IN
Maldanidae gen. sp.	20,0	2,0	2,2	0,32	0,01	0,01	0,06	I	E	ES
Nemertea fam. gen. sp.	20,0	2,0	2,2	0,32	0,04	0,04	0,25	MT	E	T
<i>Nereis</i> sp.	40,0	4,0	2,7	0,65	9,56	10,33	58,65	ET	E	OP2
<i>Notomastus latericeus</i>	20,0	2,0	2,2	0,32	0,06	0,07	0,37	ET	E	IN
<i>Philine orientalis</i>	20,0	1,0	1,1	0,16	0,03	0,03	0,18	T	E	IN
<i>Polydora</i> sp.	20,0	4,0	4,5	0,65	0,02	0,02	0,12	I	E	T
<i>Schistomeringos japonica</i>	60,0	191,0	127,9	30,86	2,13	1,71	13,07	ET	E	OP1
<i>21. Maldane sarsi</i>										
Actiniaria fam. gen. sp.	16,7	1,7	1,8	0,30	0,47	0,51	0,06	MT	E	IN
<i>Anadara broughtoni</i>	16,7	0,8	0,9	0,15	215,43	236,00	29,18	–	–	OP2
<i>Anisocorbula venusta</i>	16,7	3,3	3,7	0,60	0,32	0,35	0,04	–	–	OP2
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	33,3	4,2	3,0	0,75	0,44	0,41	0,06	ET	E	OP2
<i>Arca boucardi</i>	16,7	11,7	12,8	2,09	234,12	256,46	31,71	MT	SE	ES
<i>Aricidea catherinae</i>	16,7	1,7	1,8	0,30	0,033	0,037	0,005	MT	SE	ES
Ascidia fam. gen. sp.	50,0	5,0	3,5	0,90	1,39	1,34	0,19	MT	SE	T
<i>Asterina pectinifera</i>	16,7	0,8	0,9	0,15	13,25	14,51	1,79	–	–	IN
<i>Balanus rostratus</i>	16,7	10,8	11,9	1,94	111,29	121,91	15,07	MT	SE	T
<i>Cerebratulus</i> sp.	16,7	0,8	0,9	0,15	0,013	0,014	0,002	–	–	T
<i>Cirratulus cirratus</i>	16,7	0,8	0,9	0,15	0,59	0,65	0,08	T	E	T
<i>Diastylopsis dawsoni</i>	16,7	6,7	7,3	1,20	0,015	0,016	0,002	MT	S	OP2
<i>Edwardsia japonica</i>	16,7	0,8	0,9	0,15	0,06	0,06	0,01	MT	SE	T
<i>Ennucula tenuis</i>	33,3	21,7	21,6	3,89	0,98	0,95	0,13	T	E	IN
<i>Glycera</i> sp.	50,0	4,2	2,6	0,75	0,42	0,27	0,06	I	SE	IN
<i>Glycinde armigera</i>	16,7	3,3	3,7	0,60	0,04	0,05	0,01	MT	E	IN
<i>Goniada maculata</i>	16,7	0,8	0,9	0,15	0,013	0,014	0,002	MT	E	IN
<i>Gregariella difficilis</i>	16,7	1,7	1,8	0,30	63,24	69,28	8,56	–	–	ES
«<i>Lumbrineris longifolia</i>»	66,7	45,0	27,9	8,07	0,48	0,31	0,06	T	E	IN
<i>Macoma tokyoensis</i>	33,3	5,0	3,7	0,90	35,02	25,88	4,74	MT	SE	IN
<i>Maldane sarsi</i>	83,3	368,3	167,3	66,07	29,14	13,87	3,95	T	E	IN
<i>Melinna elisabethae</i>	16,7	0,8	0,9	0,15	0,025	0,027	0,003	T	E	T
Nemertea fam. gen. sp.	16,7	1,7	1,8	0,30	0,07	0,07	0,01	MT	E	T
<i>Notomastus latericeus</i>	16,7	7,5	8,2	1,35	0,022	0,024	0,003	ET	E	IN
<i>Patelloida heroldi</i>	16,7	6,7	7,3	1,20	0,38	0,42	0,05	–	–	–
<i>Pelonaia corrugata</i>	16,7	1,7	1,8	0,30	0,17	0,18	0,02	–	–	–
<i>Phoronopsis harmeri</i>	16,7	0,8	0,9	0,15	0,04	0,05	0,01	T	E	T
<i>Pinnixa rathbuni</i>	16,7	0,8	0,9	0,15	0,04	0,05	0,01	T	E	ES

Продолжение таблицы А.1

Таксон	Fq	A, экз./м ²	SE	A, %	B, г/м ²	SE	B, %	Cont	Bion	Eutr
<i>Plicifusus</i> sp.	16,7	0,8	0,9	0,15	0,20	0,22	0,03	–	–	–
<i>Polydora</i> sp.	16,7	0,8	0,9	0,15	0,017	0,018	0,002	I	E	T
Polynoidae gen. sp.	16,7	0,8	0,9	0,15	0,033	0,037	0,005	MT	S	ES
<i>Protocallithaca adamsi</i>	16,7	0,8	0,9	0,15	25,58	28,02	3,46	MT	E	T
<i>Pseudopotamilla</i> sp.	16,7	0,8	0,9	0,15	2,97	3,25	0,40	ET	S	IN
<i>Scalibregma inflatum</i>	50,0	17,5	16,0	3,14	1,43	1,50	0,19	T	E	T
Scalibregmidae gen. sp.	16,7	0,8	0,9	0,15	0,12	0,13	0,02	–	–	–
<i>Schistomeringos japonica</i>	16,7	0,8	0,9	0,15	0,008	0,009	0,001	ET	E	OP1
<i>Sigambra bassi</i>	83,3	10,8	3,0	1,94	0,16	0,04	0,02	T	E	OP2
Sipuncula fam. gen. sp.	16,7	1,7	1,8	0,30	0,17	0,18	0,02	MT	SE	ES
<i>Spiophanes bombyx</i>	16,7	1,7	1,8	0,30	0,008	0,009	0,001	I	E	IN
Terebellidae gen. sp.	16,7	0,8	0,9	0,15	0,23	0,26	0,03	MT	SE	T
<i>26. Aphelochaeta pacifica</i>										
<i>Anisocorbula venusta</i>	12,5	0,6	0,6	0,01	0,10	0,10	0,21	ET	E	OP2
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	87,5	1850	741	40,68	16,00	6,39	33,80	ET	E	OP2
<i>Asterias amurensis</i>	75,0	9,6	4,3	0,21	0,11	0,05	0,24	ET	SE	OP2
<i>Axinopsida subquadrata</i>	12,5	0,6	0,6	0,01	0,01	0,01	0,02	MT	E	IN
<i>Capitella capitata</i>	62,5	8,4	3,1	0,19	0,07	0,03	0,14	ET	E	OP1
<i>Chaetozone setosa</i>	37,5	106,3	104,9	2,34	7,06	7,27	14,91	ET	E	T
<i>Cheilonereis cyclurus</i>	75,0	42,2	14,8	0,93	2,84	1,01	6,01	ET	SE	OP1
<i>Chone cincta</i>	75,0	1725	1784	37,93	1,99	1,76	4,21	ET	S	OP2
<i>Dipolydora cardalia</i>	12,5	16,3	17,4	0,36	0,16	0,17	0,33	T	E	OP2
<i>Eteone</i> sp.	25,0	1,7	1,3	0,04	0,03	0,02	0,06	–	–	T
<i>Glycera capitata</i>	50,0	14,6	9,8	0,32	0,28	0,23	0,59	T	E	IN
<i>Harmothoe imbricata</i>	25,0	1,7	1,3	0,04	0,05	0,03	0,10	T	E	IN
<i>Lepidonotus helotypus</i>	12,5	0,6	0,6	0,01	0,01	0,01	0,02	–	–	–
« <i>Lumbrineris longifolia</i> »	25,0	1,7	1,3	0,04	0,01	0,01	0,03	T	E	IN
<i>Macoma nipponica</i>	12,5	0,6	0,6	0,01	0,44	0,47	0,93	ET	E	T
<i>Macoma scarlatoi</i>	12,5	0,6	0,6	0,01	0,24	0,26	0,51	ET	SE	T
<i>Macoma</i> sp.	25,0	4,5	3,3	0,10	0,71	0,54	1,51	T	E	IN
<i>Mizuhopecten yessoensis</i>	12,5	0,6	0,6	0,01	1,06	1,13	2,23	–	–	ES
<i>Modiolus difficilis</i>	12,5	0,6	0,6	0,01	0,02	0,02	0,05	–	–	ES
<i>Mya uzenensis</i>	12,5	1,1	1,2	0,02	0,01	0,01	0,03	T	SE	T
<i>Nebalia nemurensis</i>	12,5	0,6	0,6	0,01	0,01	0,01	0,03	–	–	–
Nemertea fam. gen. sp.	50,0	3,4	1,5	0,07	1,59	1,27	3,35	MT	E	T
Nereidae gen. sp.	12,5	0,6	0,6	0,01	0,00	0,00	0,01	T	E	OP2
<i>Nereis</i> sp.	12,5	0,6	0,6	0,01	0,00	0,00	0,00	ET	E	OP2
<i>Nereis vexillosa</i>	12,5	5,1	5,4	0,11	0,43	0,46	0,90	ET	SE	–
<i>Notomastus latericeus</i>	50,0	122,6	74,8	2,70	4,23	3,36	8,94	ET	E	IN
Paguridae gen. sp.	12,5	0,6	0,6	0,01	0,04	0,04	0,08	–	–	–
<i>Periploma</i> sp.	12,5	0,6	0,6	0,01	0,02	0,02	0,05	–	–	–
<i>Philine argentata</i>	37,5	5,1	3,6	0,11	0,95	0,87	2,00	T	E	IN
<i>Phoronopsis harmeri</i>	37,5	66,4	67,6	1,46	0,38	0,36	0,80	T	E	T
<i>Phyllodoce groenlandica</i>	12,5	1,7	1,8	0,04	0,02	0,02	0,04	MT	E	OP2
Phyllodocidae gen. sp.	25,0	1,1	0,8	0,02	0,03	0,03	0,07	–	–	IN
<i>Polydora</i> sp.	25,0	1,7	1,3	0,04	0,03	0,02	0,06	I	E	T
Polynoidae gen. sp. 4	12,5	1,1	1,2	0,02	0,01	0,01	0,01	ET	SE	ES

Продолжение таблицы А.1

Таксон	<i>Fq</i>	<i>A</i> , экз./м ²	<i>SE</i>	<i>A</i> , %	<i>B</i> , г/м ²	<i>SE</i>	<i>B</i> , %	<i>Cont</i>	<i>Bion</i>	<i>Eutr</i>
<i>Prionospio malmgreni</i>	25,0	12,4	11,9	0,27	0,15	0,15	0,31	ЕТ	Е	OP2
<i>Schistomeringos japonica</i>	87,5	464,6	285,7	10,22	4,80	3,01	10,14	ЕТ	Е	OP1
Spionidae gen. sp.	12,5	0,6	0,6	0,01	0,01	0,01	0,02	MT	Е	Т
<i>Thracia</i> sp.	12,5	0,6	0,6	0,01	0,01	0,01	0,02	–	–	–
<i>Theora lubrica</i>	50,0	72,0	70,2	1,58	3,42	3,50	7,23	Т	Е	Т

Примечание. Жирным шрифтом выделены наиболее значимые таксоны, выделенные при помощи процедуры SIMPER [3, 9]. Принадлежность: *Cont* – загрязнение (ЕТ – экстремально толерантные, Т – толерантные, MT – умеренно толерантные, S – чувствительные, ES – экстремально чувствительные); *Bion* – бионность (Е – эврибионты, SE – эври-стенобионты, S – стенобионты); *Eutr* – эвтрофикация (OP1 – оппортунисты 1-го порядка, OP2 – оппортунисты 2-го порядка, Т – толерантные, IN – индифферентные, ES – экстремально чувствительные).

Таблица А.2 – Результаты теста Крускала-Уоллиса

Параметр	Группа сообществ	<i>n</i>	Сумма рангов	Средний ранг	<i>KW</i> (<i>df</i> = 5, <i>N</i> = 245)	<i>p</i>
Параметры среды						
Глубина	I	70	9694	138,5	24,78	0,0002
	II	61	6757	110,8		
	III	37	5947	160,7		
	IV	37	3416	92,3		
	V	16	1865	116,6		
	VI	24	2457	102,4		
Уровень химического загрязнения, TPF_{chem}	I	70	4296	61,4	112,9	0,0000
	II	61	9389	153,9		
	III	37	3809	102,9		
	IV	37	4932	133,3		
	V	16	2583	161,4		
	VI	24	5128	213,6		
Содержание органического углерода, C_{org}	I	70	5553	79,3	58,40	0,0000
	II	61	7345	120,4		
	III	37	4893	132,2		
	IV	37	5396	145,8		
	V	16	2214	138,4		
	VI	24	4735	197,3		
Содержание алевропелитов (частиц <0,1 мм)	I	70	6611	94,4	49,65	0,0000
	II	61	8818	144,6		
	III	37	2830	76,5		
	IV	37	6048	163,5		
	V	16	2474	154,6		
	VI	24	3354	139,8		
Содержание алевритов (частиц 0,1–0,01 мм)	I	70	5966	85,2	24,77	0,0002
	II	61	7516	123,2		
	III	20	2457	122,8		
	IV	37	4302	116,3		
	V	16	2331	145,7		
	VI	24	3535	147,3		
Содержание псефитов (частиц >1 мм)	I	70	10815	154,49	38,83	0,0000
	II	61	5275	86,47		
	III	37	4212	113,82		
	IV	37	4008	108,31		
	V	16	2026	126,63		
	VI	24	3801	158,38		
Энтропия гранулометрического распределения, H_f	I	70	5827	83,2	39,91	0,0000
	II	61	8618	141,3		
	III	37	4720	127,6		
	IV	37	4528	122,4		
	V	16	2267	141,7		
	VI	24	4177	174,0		

Продолжение таблицы А.2

Параметр	Группа сообществ	<i>n</i>	Сумма рангов	Средний ранг	<i>KW</i> (<i>df</i> = 5, <i>N</i> = 245)	<i>p</i>
Биотические характеристики						
Плотность поселения, <i>A</i>	I	70	8169	116,7	7,56	0,1825
	II	61	8117	133,1		
	III	37	4799	129,7		
	IV	37	4399	118,9		
	V	16	2350	146,9		
	VI	24	2303	95,9		
Биомасса, <i>B</i>	I	70	9135	130,5	26,97	0,0001
	II	61	7417	121,6		
	III	37	5591	151,1		
	IV	37	3910	105,7		
	V	16	2473	154,6		
	VI	24	1610	67,1		
Индекс Маргалефа, <i>R</i>	I	70	8452	120,7	54,25	0,0000
	II	61	7596	124,5		
	III	37	6869	185,6		
	IV	37	4228	114,3		
	V	16	1741	108,8		
	VI	24	1252	52,1		
Индекс Маргалефа, <i>SR</i>	I	70	7700	110,0	83,92	0,0000
	II	61	8472	138,9		
	III	37	7283	196,8		
	IV	37	3925	106,1		
	V	16	1892	118,3		
	VI	24	864	36,0		
Индекс Шеннона-Винера, <i>H</i>	I	70	10292	147,0	42,76	0,0000
	II	61	7228	118,5		
	III	37	5422	146,5		
	IV	37	4630	125,1		
	V	16	1387	86,7		
	VI	24	1177	49,0		
Индекс Пиелу, <i>e</i>	I	70	10536	150,5	32,99	0,0000
	II	61	6605	108,3		
	III	37	3763	101,7		
	IV	36	5211	144,8		
	V	16	1339	83,7		
	VI	21	1707	81,3		
Индекс Симпсона, <i>Si</i>	I	70	6910	98,7	50,16	0,0000
	II	61	8272	135,6		
	III	37	3257	88,0		
	IV	37	4529	122,4		
	V	16	2337	146,1		
	VI	24	4831	201,3		

Продолжение таблицы А.2

Параметр	Сообщество	<i>n</i>	Сумма рангов	Средний ранг	<i>KW</i> (<i>df</i> = 5, <i>N</i> = 245)	<i>p</i>
Статистика Кларка, <i>W</i>	I	70	10626	151,8	39,91	0,0000
	II	61	5280	88,0		
	III	37	4815	130,1		
	IV	35	4682	130,0		
	V	14	1176	84,0		
	VI	20	1626	81,3		
Индекс <i>AMBI</i>	I	70	5630	80,4	59,95	0,0000
	II	61	8831	144,8		
	III	37	3726	100,7		
	IV	37	5111	138,1		
	V	16	2231	139,4		
	VI	24	4608	192,0		
Индекс <i>M-AMBI</i>	I	70	11135	159,1	70,10	0,0000
	II	61	6771	111,0		
	III	37	5451	147,3		
	IV	37	4619	124,8		
	V	16	1482	92,6		
	VI	24	678	28,3		
Индекс <i>TPF_{bio}</i>	I	70	4657	66,5	113,24	0,0000
	II	61	8814	144,5		
	III	37	3385	91,5		
	IV	37	5160	139,4		
	V	16	2873	179,6		
	VI	24	5247	218,6		

Примечание – *n* – объем групповой выборки, *KW* – статистика Крускала-Уоллиса, *df* – число степеней свободы, *N* – объем выборки (*u* и *W* *N* = 241 и 236, соответственно), *p* – вероятность справедливости *H*₀

Таблица А.3 – Состав сообществ макрозообентоса в бухте Западная (остров Фуругельма)

Таксон	<i>Fq</i>	<i>B</i> , г/м ²	± <i>SE</i>	<i>B</i> , %
<i>I. Spisula sachalinensis + Mactra chinensis</i>				
<i>Amphitoe japonica</i>	8,3	0,01	0,01	0,0
<i>Armandia brevis</i>	25,0	0,17	0,09	0,0
<i>Callista brevisiphonata</i>	16,7	6,49	6,77	1,4
<i>Cancer amphioetus</i>	8,3	0,50	0,52	0,1
<i>Chaustorius eous eous</i>	58,3	2,56	1,22	0,5
<i>Echinocardium cordatum</i>	41,7	25,79	12,85	5,5
<i>Epheria turrita</i>	8,3	0,00	0,00	0,0
<i>Felaniella usta</i>	8,3	0,05	0,05	0,0
<i>Glycera tridactyla</i>	16,7	4,50	4,00	1,0

Продолжение таблицы А.3

Таксон	<i>Fq</i>	<i>B</i> , г/м ²	$\pm SE$	<i>B</i> , %
<i>Glycinde armigera</i>	8,3	0,10	0,10	0,0
<i>Goniada maculata</i>	8,3	0,13	0,14	0,0
<i>Harpinia</i> sp.	41,7	0,03	0,02	0,0
<i>Homalopoma amussitata</i>	8,3	0,01	0,01	0,0
<i>Homalopoma sangarensense</i>	8,3	0,90	0,94	0,2
<i>Keenocardium californiensis</i>	16,7	0,80	0,56	0,2
<i>Litorina brevicula</i>	8,3	0,65	0,68	0,1
<i>Lumbrineris latreilli</i>	16,7	3,65	3,47	0,8
<i>Macoma incogrua</i>	8,3	0,08	0,09	0,0
<i>Macoma nipponica</i>	8,3	0,17	0,17	0,0
<i>Maetra chinensis</i>	83,3	94,66	33,68	20,1
<i>Mercenaria stimpsoni</i>	25,0	2,29	2,05	0,5
<i>Nephtys caeca</i>	8,3	1,29	1,35	0,3
<i>Nephtys californiensis</i>	8,3	0,03	0,03	0,0
<i>Olivella borealis</i>	58,3	1,50	0,58	0,3
<i>Onuphis shirikishinaensis</i>	50,0	3,32	1,51	0,7
<i>Orchestoidea trinitatis</i>	8,3	0,03	0,03	0,0
<i>Peronidia zyonensis</i>	8,3	2,83	2,96	0,6
<i>Pillicina pisidium</i>	25,0	0,45	0,25	0,1
<i>Grandifoxus longirostris</i>	58,3	1,42	0,65	0,3
<i>Grandifoxus robusta</i>	16,7	0,08	0,06	0,0
<i>Grandifoxus simplex</i>	25,0	0,01	0,01	0,0
<i>Pontogeneia rostrata</i>	16,7	0,01	0,00	0,0
<i>Pontorpinus</i> sp.	8,3	0,02	0,02	0,0
<i>Pugettia quadridens</i>	8,3	0,50	0,52	0,1
<i>Ruditapes philippinarum</i>	8,3	0,20	0,20	0,0
<i>Scaphechinus griseus</i>	58,3	5,10	1,71	1,1
<i>Scaphechinus mirabilis</i>	33,3	22,36	11,06	4,8
<i>Scoloplos armiger</i>	83,3	1,07	0,29	0,2
<i>Solen krusensterni</i>	16,7	0,61	0,46	0,1
<i>Spio borealis</i>	33,3	0,10	0,07	0,0
<i>Spisula sachalinensis</i>	91,7	272,28	86,01	57,9
<i>Strongylocentrotus intermedius</i>	16,7	13,75	12,10	2,9
Talitroidea gen. sp.	25,0	0,02	0,01	0,0
<i>Thracia kakumana</i>	8,3	0,05	0,05	0,0
II. <i>Callista brevisiphonata</i> + <i>Echinocardium cordatum</i> + <i>Asterina pectinifera</i>				
<i>Amphiodia periercta</i>	14,3	1,26	1,18	0,07
<i>Amphipholis kochii</i>	7,1	1,14	1,19	0,07
<i>Amphitoe japonica</i>	21,4	0,06	0,03	0,00
<i>Aonides oxycephala</i>	42,9	0,09	0,03	0,01
<i>Asterias amurensis</i>	14,3	0,59	0,44	0,03

Продолжение таблицы А.3

Таксон	<i>Fq</i>	<i>B</i> , г/м ²	$\pm SE$	<i>B</i> , %
<i>Asterina pectinifera</i>	92,9	101,29	28,12	5,96
<i>Boreotrophon candelabrum</i>	7,1	0,06	0,07	0,00
<i>Cadella lubrica</i>	14,3	0,02	0,02	0,00
<i>Callista brevisiphonata</i>	92,9	795,17	208,79	46,77
<i>Callithaca adamsi</i>	35,7	3,02	3,03	0,18
<i>Cancer amphioetus</i>	21,4	1,96	1,24	0,12
<i>Nereimyra sp.</i>	14,3	0,01	0,01	0,00
<i>Chaetozone setosa</i>	7,1	0,03	0,03	0,00
<i>Chone magna</i>	7,1	0,69	0,71	0,04
<i>Collisella patina</i>	14,3	0,08	0,06	0,00
<i>Monocorophium acherusicum</i>	35,7	0,17	0,12	0,01
<i>Monocorophium steinegeri</i>	21,4	0,11	0,08	0,01
<i>Crenomytilus grayanus</i>	28,6	21,02	18,77	1,24
<i>Cryptobranchus kuragiensis</i>	14,3	0,52	0,38	0,03
<i>Cryptonatica janthostoma</i>	28,6	10,94	5,47	0,64
<i>Dorvillea sp.</i>	28,6	0,19	0,13	0,01
<i>Echinocardium cordatum</i>	92,9	258,68	112,32	15,21
<i>Echinarachnius parma</i>	7,1	7,14	7,41	0,42
<i>Lacuna turrita</i>	14,3	0,03	0,03	0,00
<i>Eteone longa</i>	7,1	0,01	0,01	0,00
<i>Felaniella usta</i>	71,4	1,99	0,99	0,12
<i>Gari kazusensis</i>	7,1	0,40	0,42	0,02
<i>Glycera capitata</i>	21,4	0,49	0,33	0,03
<i>Glycera onomichiensis</i>	7,1	0,22	0,23	0,01
<i>Glycinde armigera</i>	14,3	0,08	0,07	0,00
<i>Goniada maculata</i>	14,3	0,31	0,23	0,02
<i>Harmothoe imbricata</i>	57,1	0,42	0,24	0,02
<i>Homalopoma amussitatum</i>	21,4	4,29	2,93	0,25
<i>Homalopoma sangarensense</i>	42,9	3,93	1,99	0,23
<i>Keenocardium californiensis</i>	50,0	10,50	4,81	0,62
<i>Laonice cirrata</i>	21,4	0,25	0,16	0,01
<i>Limalepeta lima</i>	7,1	0,01	0,01	0,00
<i>Littorina squalida</i>	28,6	3,48	2,95	0,20
<i>Lumbrineris japonica</i>	14,3	0,80	0,74	0,05
<i>Lumbrineris latreilli</i>	7,1	0,27	0,28	0,02
<i>Lunatia pila</i>	7,1	0,12	0,12	0,01
<i>Macoma incogrua</i>	14,3	0,10	0,08	0,01
<i>Macoma nipponica</i>	42,9	1,74	0,91	0,10
<i>Mactra chinensis</i>	42,9	13,56	4,81	0,80
<i>Malmgrenia uschakovi</i>	14,3	0,39	0,34	0,02
<i>Mediomastus californiensis</i>	14,3	0,01	0,01	0,00
<i>Minolia picturata</i>	35,7	0,11	0,05	0,01

Продолжение таблицы А.3

Таксон	<i>Fq</i>	<i>B</i> , г/м ²	$\pm SE$	<i>B</i> , %
<i>Modiolus kurilensis</i>	28,6	71,75	39,80	4,22
<i>Mya japonica</i>	28,6	48,86	28,62	2,87
<i>Mya priapus</i>	42,9	122,67	56,07	7,21
<i>Mytilus trossulus</i>	7,1	0,01	0,01	0,00
<i>Nephtys californiensis</i>	21,4	0,22	0,13	0,01
<i>Nereis sp.</i>	21,4	0,08	0,05	0,00
<i>Notomastus latericeus</i>	28,6	0,97	0,56	0,06
<i>Nuttallia ezonis</i>	21,4	0,92	0,67	0,05
<i>Onuphis shirikishinaensis</i>	71,4	11,45	3,45	0,67
<i>Ophiura sarsi</i>	7,1	0,29	0,30	0,02
<i>Pagurus brachiomastus</i>	14,3	2,39	1,70	0,14
<i>Panomya norvegica</i>	21,4	7,54	5,16	0,44
<i>Phyllodoce maculata</i>	21,4	0,06	0,04	0,00
<i>Pillicina pisidium</i>	35,7	0,74	0,35	0,04
<i>Grandifoxus longirostris</i>	21,4	0,22	0,19	0,01
<i>Grandifoxus robusta</i>	14,3	0,11	0,08	0,01
<i>Grandifoxus simplex</i>	21,4	0,02	0,01	0,00
<i>Pontorpinus sp.</i>	7,1	0,00	0,00	0,00
<i>Protothaca euglipta</i>	21,4	1,52	1,21	0,09
<i>Pugettia quadridens</i>	21,4	3,39	2,54	0,20
<i>Ruditapes philippinarum</i>	14,3	2,16	1,71	0,13
<i>Scalibregma inflatum</i>	21,4	2,93	2,37	0,17
<i>Scoloplos armiger</i>	71,4	3,18	1,12	0,19
<i>Spio borealis</i>	57,1	0,26	0,10	0,02
<i>Spiophanes bombyx</i>	7,1	0,03	0,03	0,00
<i>Spisula sachalinensis</i>	35,7	114,80	64,27	6,75
<i>Spisula voyi</i>	7,1	4,00	4,15	0,24
<i>Strongylocentrotus intermedius</i>	85,7	37,48	9,36	2,20
<i>Mesocentrotus nudus</i>	21,4	14,14	9,14	0,83
<i>Talitroidea sp.</i>	7,1	0,03	0,03	0,00
<i>Thapsiella plicosa</i>	14,3	0,01	0,01	0,00
<i>Tritia acutidentata</i>	7,1	0,02	0,02	0,00
<i>Urothoe orientalis</i>	57,1	0,21	0,08	0,01
III. <i>Callista brevisiphonata</i> + <i>Spisula voyi</i> + <i>Echinocardium cordatum</i>				
<i>Niveotectura pallida</i>	9,1	0,79	0,83	0,03
<i>Amphiodia periercta</i>	9,1	0,01	0,02	0,00
<i>Amphipholis kochii</i>	9,1	1,82	1,91	0,08
<i>Amphitoe tarasovi</i>	18,2	0,09	0,08	0,00
<i>Aonides oxycephala</i>	9,1	0,00	0,00	0,00
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	9,1	0,15	0,15	0,01
<i>Asterias amurensis</i>	27,3	0,63	0,37	0,03

Продолжение таблицы А.3

Таксон	<i>Fq</i>	<i>B</i> , г/м ²	$\pm SE$	<i>B</i> , %
<i>Asterina pectinifera</i>	63,6	58,38	34,50	2,56
<i>Byblis normalis</i>	9,1	0,03	0,03	0,00
<i>Cadella lubrica</i>	72,7	0,64	0,20	0,03
<i>Callista brevisiphonata</i>	100,0	1169,42	149,45	51,37
<i>Callithaca adamsi</i>	9,1	0,04	0,04	0,00
<i>Cancer amphioetus</i>	9,1	0,48	0,51	0,02
<i>Nereimyra sp.</i>	9,1	0,01	0,01	0,00
<i>Collisella patina</i>	36,4	0,45	0,28	0,02
<i>Corophium acherusicum</i>	72,7	2,97	1,81	0,13
<i>Corophium steinegeri</i>	72,7	1,70	0,87	0,07
<i>Crenomytilus grayanus</i>	9,1	0,27	0,29	0,01
<i>Cryptobranchia kuragiensis</i>	9,1	0,52	0,54	0,02
<i>Cryptonatica janthostoma</i>	9,1	4,52	4,74	0,20
<i>Chaetozone setosa</i>	9,1	0,04	0,04	0,00
<i>Dorvillea sp.</i>	54,5	0,30	0,15	0,01
<i>Echinocardium cordatum</i>	100,0	215,59	30,39	9,47
<i>Echinarachnius parma</i>	90,9	92,22	19,24	4,05
<i>Eulalia viridis</i>	9,1	0,00	0,00	0,00
<i>Felaniella usta</i>	100,0	9,56	2,64	0,42
<i>Glycera capitata</i>	45,5	1,44	0,92	0,06
<i>Harmothoe imbricata</i>	36,4	0,38	0,30	0,02
<i>Homalopoma sangarensense</i>	63,6	3,36	1,55	0,15
<i>Keenocardium californiensis</i>	27,3	12,52	9,48	0,55
<i>Laonice cirrata</i>	27,3	0,31	0,28	0,01
<i>Lepidonotus squamatus</i>	9,1	0,08	0,08	0,00
<i>Litorina squalida</i>	90,9	8,10	3,93	0,36
<i>Lumbrineris japonica</i>	9,1	0,29	0,31	0,01
<i>Lunatia pila</i>	18,2	2,32	1,98	0,10
<i>Macoma incogrua</i>	9,1	4,45	4,67	0,20
<i>Macoma nipponica</i>	63,6	1,05	0,40	0,05
<i>Mediomastus californiensis</i>	9,1	0,03	0,03	0,00
<i>Mizuhopecten yessoensis</i>	54,5	35,45	16,42	1,56
<i>Minolia picturata</i>	54,5	0,15	0,05	0,01
<i>Modiolus kurilensis</i>	18,2	1,75	1,38	0,08
<i>Mya priapus</i>	36,4	126,69	84,91	5,57
<i>Nereis sp.</i>	54,5	0,28	0,12	0,01
<i>Notomastus latericeus</i>	90,9	1,36	0,51	0,06
<i>Nucella heyseana</i>	9,1	1,27	1,33	0,06
<i>Nuttallia ezonis</i>	18,2	5,22	3,69	0,23
<i>Onuphis shirikishinaensis</i>	9,1	0,07	0,08	0,00
<i>Ophiura sarsi</i>	9,1	0,12	0,12	0,01
<i>Pagurus brachiomastus</i>	9,1	0,45	0,48	0,02

Продолжение таблицы А.3

Таксон	<i>Fq</i>	<i>B</i> , г/м ²	$\pm SE$	<i>B</i> , %
<i>Pillicina pisidium</i>	9,1	0,05	0,06	0,00
<i>Oxydromus pugettensis</i>	9,1	0,01	0,01	0,00
<i>Polychaeta sp.</i>	9,1	0,02	0,02	0,00
<i>Polydora sp.</i>	9,1	0,04	0,04	0,00
<i>Ruditapes philippinarum</i>	9,1	0,67	0,71	0,03
<i>Pharyngocirrus gabriellae</i>	9,1	0,00	0,00	0,00
<i>Saxidomus purpuratus</i>	9,1	1,06	1,12	0,05
<i>Scoloplos armiger</i>	54,5	0,59	0,19	0,03
<i>Spio borealis</i>	9,1	0,01	0,01	0,00
<i>Spisula voyi</i>	100,0	330,86	81,98	14,53
<i>Apostichopus japonicus</i>	63,6	66,45	22,46	2,92
<i>Strongylocentrotus intermedius</i>	100,0	84,41	20,79	3,71
<i>Strongylocentrotus nudus</i>	45,5	24,19	13,30	1,06
<i>Americhelidium gurjanovae</i>	9,1	0,00	0,00	0,00
<i>Thapsiella plicosa</i>	9,1	0,03	0,03	0,00
<i>Syllis hyalina</i>	9,1	0,07	0,08	0,00
<i>Urothoe orientalis</i>	54,5	0,11	0,05	0,00
IV. <i>Callista brevisiphonata</i> + <i>Asterina pectinifera</i>				
<i>Acila insignis</i>	35,3	2,77	1,45	0,13
<i>Acmaea pallida</i>	5,9	5,18	5,34	0,25
<i>Amphiodia periercta</i>	23,5	4,35	2,54	0,21
<i>Amphipholis kochii</i>	29,4	10,75	6,93	0,52
<i>Amphipholis pugetana</i>	82,4	7,47	2,73	0,36
<i>Amphitoe tarasovi</i>	5,9	0,06	0,06	0,00
<i>Aphelasterias japonica</i>	35,3	16,24	7,29	0,79
<i>Aphelochaeta pacifica</i>	82,4	0,44	0,10	0,02
<i>Arctonoe vittata</i>	11,8	0,51	0,37	0,02
<i>Asterias amurensis</i>	41,2	49,10	28,12	2,38
<i>Asterina pectinifera</i>	100,0	104,72	10,71	5,08
<i>Axinopsida orbiculata</i>	5,9	0,01	0,01	0,00
<i>Boreotrophon candelabrum</i>	11,8	0,56	0,53	0,03
<i>Callista brevisiphonata</i>	94,1	968,35	308,54	46,94
<i>Paradialychone ecaudata</i>	11,8	0,73	0,73	0,04
<i>Chone magna</i>	5,9	0,18	0,19	0,01
<i>Collisella patina</i>	17,6	0,26	0,20	0,01
<i>Corophium acherusicum</i>	5,9	0,00	0,00	0,00
<i>Crenomytilus grayanus</i>	70,6	415,34	127,84	20,13
<i>Cryptobranchia kuragiensis</i>	47,1	0,73	0,32	0,04
<i>Dodecaceria concharum</i>	5,9	0,00	0,00	0,00
<i>Dorvillea sp.</i>	82,4	0,39	0,10	0,02
<i>Echinarachnius parma</i>	5,9	5,41	5,58	0,26

Продолжение таблицы А.3

Таксон	<i>Fq</i>	<i>B</i> , г/м ²	$\pm SE$	<i>B</i> , %
<i>Echinocardium cordatum</i>	29,4	9,51	5,53	0,46
<i>Ennucula ovatotruncata</i>	5,9	0,08	0,08	0,00
<i>Epheria turrita</i>	5,9	0,00	0,00	0,00
<i>Eteone longa</i>	17,6	0,13	0,09	0,01
<i>Eulalia bilineata</i>	76,5	3,60	1,27	0,17
<i>Eulalia viridis</i>	11,8	0,04	0,03	0,00
<i>Eumida sanguinea</i>	23,5	0,09	0,04	0,00
<i>Felaniella usta</i>	5,9	0,24	0,24	0,01
<i>Flabelligera affinis</i>	5,9	0,09	0,09	0,00
<i>Glycera capitata</i>	88,2	2,70	0,55	0,13
<i>Glycinde armigera</i>	35,3	0,24	0,12	0,01
<i>Goniada maculata</i>	58,8	2,37	0,71	0,11
<i>Harmothoe imbricata</i>	70,6	0,39	0,11	0,02
<i>Homalopoma amussitata</i>	47,1	10,84	3,84	0,53
<i>Homalopoma sangarense</i>	52,9	13,07	6,42	0,63
<i>Keenocardium californiensis</i>	29,4	9,02	4,19	0,44
<i>Laonice cirrata</i>	100,0	5,50	1,30	0,27
<i>Lethasterias fusca</i>	17,6	4,00	2,59	0,19
<i>Limalepeta lima</i>	41,2	3,83	1,96	0,19
<i>Litorina squalida</i>	5,9	0,03	0,03	0,00
<i>Lumbrineris japonica</i>	88,2	6,52	1,71	0,32
<i>Lumbrineris latreilli</i>	70,6	14,29	4,02	0,69
<i>Lunatia pila</i>	11,8	1,32	1,31	0,06
<i>Lysastrosoma anthosticta</i>	11,8	1,46	1,33	0,07
<i>Macoma incogrua</i>	5,9	2,54	2,62	0,12
<i>Macoma nipponica</i>	5,9	0,04	0,04	0,00
<i>Malmgrenia uschakovi</i>	64,7	3,10	1,21	0,15
<i>Mediomastus californiensis</i>	64,7	0,20	0,06	0,01
<i>Melinna elisabethae</i>	82,4	3,24	0,80	0,16
<i>Mizuhopecten yessoensis</i>	17,6	3,97	3,06	0,19
<i>Minolia picturata</i>	5,9	0,01	0,01	0,00
<i>Modiolus kurilensis</i>	5,9	0,04	0,04	0,00
<i>Mya japonica</i>	5,9	2,26	2,33	0,11
<i>Mya priapus</i>	70,6	47,42	12,52	2,30
<i>Nephtys caeca</i>	5,9	0,56	0,57	0,03
<i>Nereis sp.</i>	76,5	2,70	0,85	0,13
<i>Nereis tigrina</i>	29,4	0,22	0,11	0,01
<i>Nicomache minor</i>	52,9	2,41	1,22	0,12
<i>Nuttallia ezonis</i>	5,9	0,88	0,91	0,04
<i>Onuphis shirikishinaensis</i>	41,2	2,34	0,94	0,11
<i>Ophelina acuminata</i>	11,8	0,13	0,09	0,01
<i>Ophiura sarsi</i>	17,6	0,76	0,45	0,04

Продолжение таблицы А.3

Таксон	<i>Fq</i>	<i>B</i> , г/м ²	$\pm SE$	<i>B</i> , %
<i>Owenia fusiformis</i>	41,2	1,59	0,67	0,08
<i>Pagurus brachiomastus</i>	29,4	1,61	0,69	0,08
<i>Panomya arctica</i>	29,4	16,16	13,97	0,78
<i>Pectinaria sp.</i>	82,4	13,12	4,49	0,64
<i>Pherusa plumosa</i>	64,7	11,92	6,55	0,58
<i>Phyllodoce maculata</i>	88,2	0,73	0,14	0,04
<i>Pilargis berkeleyae</i>	5,9	0,03	0,03	0,00
<i>Pista corrientis</i>	29,4	2,98	1,89	0,14
<i>Polychaeta sp.</i>	11,8	0,15	0,11	0,01
<i>Polycirrus sp.</i>	17,6	0,17	0,13	0,01
<i>Polydora sp.</i>	94,1	12,93	3,57	0,63
<i>Praxillella praetermissa</i>	70,6	1,03	0,39	0,05
<i>Pugettia quadridens</i>	11,8	0,79	0,57	0,04
<i>Pharyngocirrus gabriellae</i>	5,9	0,01	0,01	0,00
<i>Scalibregma inflatum</i>	47,1	8,65	6,37	0,42
<i>Scoloplos armiger</i>	100,0	4,79	1,08	0,23
<i>Sigambra bassi</i>	41,2	0,08	0,03	0,00
<i>Spio borealis</i>	5,9	0,02	0,02	0,00
<i>Spiophanes bombyx</i>	11,8	0,07	0,06	0,00
<i>Apostichopus japonicus</i>	17,6	165,42	103,88	8,02
<i>Strongylocentrotus intermedius</i>	47,1	40,96	20,30	1,99
<i>Strongylocentrotus nudus</i>	29,4	21,77	13,96	1,06
<i>Thapsiella plicosa</i>	5,9	0,00	0,00	0,00
<i>Thracia kakumana</i>	29,4	2,03	0,96	0,10
<i>Tritia acutidentata</i>	5,9	0,01	0,01	0,00
<i>Syllis hyalina</i>	5,9	0,03	0,03	0,00
<i>Yoldia keppeliana</i>	11,8	0,34	0,34	0,02